

بائیولوجی

پریکٹیکل نوٹ بُک

گریڈ IX

Web Version of PCTB Textbook



giz

پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بُک بورڈ، لاہور

جملہ حقوق پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور محفوظ ہیں۔

اس کتاب کا کوئی حصہ نقل یا ترجمہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اسے ٹیپرز، گائیڈ بکس، خلاصہ جات، نوٹس یا امدادی کتب کی تیاری میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مصنفین

- 1- ایم ندیم اصغر ڈپٹی سیکرٹری، ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ۔
- 2- مسز ریحانہ جوہر سینیئر سبجیکٹ سپیشلسٹ (بائیولوجی)، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور
- 3- مسز روبیلہ شبیر سبجیکٹ سپیشلسٹ (بائیولوجی)، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور
- 4- مس خمیرہ صدیقی سینیئر سبجیکٹ سپیشلسٹ (بائیولوجی)، ڈائریکٹوریٹ آف سٹاف ڈویلپمنٹ، لاہور
- 5- مسز فرحت ظہرہ لیکچرار (بائیولوجی)، کونین میری کالج، لاہور
- 6- مسز ارم حبیب سائنس ٹیچر، بیکن ہاؤس سکول، جوہر ٹاؤن، لاہور
- 7- مسز شائلہ سائنس ٹیچر، امریکن انٹرنیشنل سکول، لاہور کینٹ
- 8- محمد فرحان لیکچرار (بائیولوجی)، ایف سی کالج (چارٹرڈ یونیورسٹی)، لاہور

مترجم

کمپوزنگ، لے آؤٹ
اینڈ اسٹریٹنگز:
محمد اعظم

ایم ندیم اصغر

نگران طباعت

روبیلا شبیر

ایڈیٹر

- 1- ایم ندیم اصغر
- 2- مسز ریحانہ جوہر
- 3- ڈاکٹر ذوالفقار علی ثاقب
- 4- غفران احمد آصف



سرٹیفکیٹ

تصدیق کی جاتی ہے کہ:

طالب علم

کلاس

سکول

نے بائیولوجی 9 کے پریکٹیکل سیشن مکمل کر لیے ہیں۔

دستخط ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ

دستخط سائنس ٹیچر

Web Version of PCTB Textbook

فہرستِ تجربات

1		عمومی ہدایات
3		عمومی حفاظتی تدابیر
4		بائیولوجی کی ڈرائنگ کی ہدایات
5		ڈائی سیکٹنگ باکس
7		مائیکروسکوپ کا استعمال

باب 1: بائیولوجی کا تعارف: Introduction of Biology

9	حصہ اول: تیار شدہ سلائڈز کی مدد سے بیکیٹریا کی مختلف اقسام کا مطالعہ	تجربہ 1.1
11	حصہ دوم: تیار شدہ سلائڈز / تازہ کلچر / چارٹس کی مدد سے امیبا، پیرامیسیم اور وولوکس کا مطالعہ	
17	حصہ اول: سرسوں کے پودے (براسیکا کمپیسٹریس: <i>Brassica campestris</i>) کی بیرونی ساخت کا مطالعہ	تجربہ 1.2
19	حصہ دوم: براسیکا کی جڑ، تنہ اور پتے کا خوردبینی معائنہ	
24	حصہ سوم: براسیکا کے پھول، پھل اور بیج کا مطالعہ	
27	ڈائی سیکٹ کیے گئے مینڈک میں بڑے آرگن اور آرگن سسٹمز کی شناخت (استاد یا معلم عملی demonstrator ڈائی سیکشن کریں گے)	تجربہ 1.3

باب 3: بائیو ڈائیورسٹی: Biodiversity

33	دکھائی دینے والی امتیازی ٹیکسٹونومک (taxonomic) خصوصیات کی بنیاد پر تازہ اور محفوظ کیے گئے نمونوں سے مختلف جانوروں اور پودوں کی شناخت	تجربہ 3.1
41	حشرات کی ایک پاپولیشن کا گراف بنانا اور ان کا تجزیہ کرنا (حشرات کش ادویات: insecticides کے زیادہ استعمال کی وجہ سے حشرہ اینڈنجرڈ: endangered ہے) اور ان کے اینڈینجرڈ ہونے کی وجوہات کی وضاحت کرنا	تجربہ 3.2

باب 4: سیلز اور ٹشوز: Cells and Tissues

43	چھوٹی اشیاء کی حرکت کے مشاہدہ کے لیے مائیکروسکوپ کا استعمال	تجربہ 4.1
45	جانور کے سیل (مثلاً مینڈک کے خون سے) اور پودے کے سیل (مثلاً پیاز کی اپی ڈرمس سے) کا خوردبینی مشاہدہ	تجربہ 4.2
49	تیار کیے گئے نمونوں (fresh preparations) سے سیل کے مختلف حصوں کی شناخت	تجربہ 4.3
51	پھول دار پودوں کے ٹشوز کے خوردبینی نمونوں (wet mounts) کی تیاری، اور چارٹس اور تیار شدہ سلائڈز سے پودے اور جانور کے ٹشوز کا مطالعہ	تجربہ 4.4
56	پودے کے سیلز یا بلڈ سیلز میں پلازمولائسز (plasmolysis) اور ڈی پلازمولائسز (deplasmolysis) پر ٹانسیسٹی (tonicity) کے اثر کا تعین	تجربہ 4.5
59	نمی کی مختلف مقداروں والے علاقوں میں اُگنے والے پودوں کے پتوں میں فی اکائی رقبہ (unit area) سٹومیٹا کی تعداد کا ڈیٹا (data) اکٹھا کرنا اور متغیرات (variables) کے درمیان تعلق کا تعین کرنا اور گراف بنانا	تجربہ 4.6

باب 5: سیل سائیکل: Cell Cycle

- 62 تجربہ 5.1 سلائڈز، ماڈلز اور چارٹس کے ذریعہ مائی ٹوسس اور می اوسس کے مختلف مراحل کا مشاہدہ
- 67 تجربہ 5.2 جڑ کے سرور کو مسل کر یعنی سکواشرز (squashes) بنا کر مائی ٹوسس کے مراحل کا مطالعہ

باب 6: اینزائمز: Enzymes

- 70 تجربہ 6.1 ایک اینزائم کا ان-وٹرو (in vitro) فعل دکھانا؛ مثلاً ٹیسٹ ٹیوب میں گوشت / البیومن (albumin) پر پپسن (pepsin) کا فعل دکھانا
- 73 تجربہ 6.2 سٹارج پرائیزائم (ڈائاسٹیز: diastase) کا عمل دکھانے کے لیے تجربہ

باب 7: بائیوانرجیٹکس: Bioenergetics

- 75 تجربہ 7.1 ایک آبی پودے ہائیڈریلا (Hydrilla) کو استعمال کرتے ہوئے فوٹوسنتھی سیز کا عمل دکھانا
- 78 تجربہ 7.2 مائیکروسکوپ سے مشاہدہ کر کے ایک پتے کے عمودی تراشہ (Cross Section) میں سیل اور نشوونما کی ساخت کی شناخت کرنا اور انہیں لیبل کرنا
- 80 تجربہ 7.3 فوٹوسنتھی سیز کے لیے کلوروفل، سورج کی روشنی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ضروری ہونے کی تحقیق کرنا
- 88 تجربہ 7.4 چونے کے پانی (lime water) کو استعمال کر کے اُگتے ہوئے بیجوں میں ریسپیریشن کا عمل دکھانا
- 91 تجربہ 7.5 اُگتے ہوئے بیجوں میں ریسپیریشن کے دوران حرارت کے اخراج کی تحقیق کرنا

باب 8: نیوٹریشن: Nutrition

- 93 تجربہ 8.1 خوراک کا تجزیہ (Food Tests):
- گلوکوز (ریڈیوسنگ شوگر) کے لیے بنی ڈکٹ ٹیسٹ (Benedict's Test)
- سٹارج (نان-ریڈیوسنگ شوگر) کے لیے آیوڈین ٹیسٹ (Iodine Test)
- فیٹس کے لیے سپاٹ ٹیسٹ (Spot Test) اور ایمولشن ٹیسٹ (Emulsion Test)
- پروٹینز کیلئے بائی یورٹ ٹیسٹ (Biuret Test)
- 96 تجربہ 8.2 ولانی (villi) دکھانے کے لیے سہل انڈکشن کے عرضی تراشہ کا مائیکروسکوپک معائنہ

باب 9: ٹرانسپورٹ: Transport

- 98 تجربہ 9.1 سالٹ سولوشن (salt solution) اور پانی میں آلو کے ٹکڑوں کی لمبائی اور وزن میں فرق کی پیمائش کرنا
- 100 تجربہ 9.2 نشوونما کرتی جڑوں پر روٹ ہیئرز (root hairs) کا مشاہدہ
- 102 تجربہ 9.3 پتے کی اپی ڈرمس میں سٹومیٹا کی ساخت اور تعداد کا مائیکروسکوپک مشاہدہ
- 104 تجربہ 9.4 کوبالٹ کلورائیڈ (Cobalt chloride) پیپر استعمال کر کے پتے کی دونوں سطحوں سے پانی کے ضیاع کی شرح معلوم کرنا
- 106 تجربہ 9.5 نیل جار کے نیچے، گملے میں لگے ایک پودے میں ٹرانسپائریشن (transpiration) کی تحقیق کرنا
- 108 تجربہ 9.6 جڑ، تناور پتے کی تیار شدہ سلائڈز میں زائیم اور فلوئم ٹشوز کی شناخت کرنا
- 110 تجربہ 9.7 مناسب سٹین (stain) استعمال کرتے ہوئے پودے کے حصوں میں پانی کا راستہ معلوم کرنا اور مختلف طرح کے سیلز کے سائز کا موازنہ کرنا
- 112 تجربہ 9.8 مائیکروسکوپ کے نیچے تیار شدہ سلائڈز اور فوٹو مائیکروگرافس سے ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز کی شناخت کرنا
- 115 تجربہ 9.9 نبض کی رفتار پر جسمانی سرگرمی کا اثر معلوم کرنا
- 117 تجربہ 9.10 مچھلی کی دم یا فین (fin) یا مینڈک کے پاؤں کی انگلیوں کے جال میں موجود کپریز میں خون کے بہاؤ کا مشاہدہ کرنا

عمومی ہدایات

عملی کام کے حاصلاتِ تعلّم

طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کورس کا ایک لازمی حصہ سمجھتے ہوئے عملی کام سرانجام دیں۔ ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ باقاعدہ ایک لیبارٹری ریکارڈ بک رکھیں جس میں وہ اپنے تمام پریکٹیکلز کے لیے تجربات میں استعمال کیے گئے طریقے، کیے گئے مشاہدات اور ان مشاہدات سے اخذ کیے گئے نتائج درج کریں۔ طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عملی کام کے ذریعے مندرجہ ذیل مہارتیں پیدا کریں۔

1- طریقہ کار Techniques

- i پودے کے عمودی اور طولی تراشے (Cross and Longitudinal sections) کاٹنا
- ii تازہ کلچرز (fresh cultures) سے سلائڈز تیار کرنا (سٹین / گلسرین)
- iii ڈائی سیکٹ (disect) کیے ہوئے جانور میں مختلف سسٹمز کی نشاندہی کرنا

2- معلومات کا استعمال Information Handling

- i مختلف ذرائع سے معلومات تلاش کرنا، منتخب کرنا اور ان کی وضاحت کرنا
- ii نتائج کو ٹیبل اور گراف کی شکل میں ظاہر کرنا
- iii مختلف نوعیت کی معلومات (جن میں تجربات کے نتائج بھی شامل ہیں) کا تجزیہ کرنا، ان کی وضاحت کرنا اور ان سے مزید معلومات اخذ کرنا
- iv بائیولوجیکل معلومات (facts) اور اصول، عملی طریقہ کار اور حفاظتی احتیاطوں کے علم اور سمجھ کا مظاہرہ کرنا

3- عملی اور تحقیقی مہارتیں Expeimental and Investigative Skills

- i بائیولوجی میں درست تحقیقات کے لیے مائیکروسکوپ اور دوسرے آلات استعمال کرنا
- ii مجموعی خصوصیات اور باریک وضاحتوں کا مشاہدہ کرنا اور مشابہتیں اور فرق معلوم کرنا
- iii سائنسی آلات اور سامان کے استعمال سے واقفیت حاصل کرنا

4- اندازِ فکر Attitudes

- i تحقیقی کاموں کے دوران شہادتوں، معقولیت (rationality) اور دانشورانہ دیانت داری کے لیے عزت و احترام کا اظہار کرنا
- ii معاون سرگرمیوں، تحقیقات، مسائل حل کرنا اور فیصلہ سازی کی حمایت کرنا
- iii جدید معاشرہ میں بائیولوجی کے ذاتی، معاشرتی، معاشی اور تکنیکی اطلاق کے علم اور فہم کا مظاہرہ کرنا

جائچ کے لیے تیار کردہ فہرست Assessment Checklist

- 1 طریقہ کار پر احتیاط سے عمل کیا گیا اور سوالات اطمینان سے حل کیے گئے۔
- 2 مائیکروسکوپ کو مناسب طریقہ سے استعمال کیا گیا۔
- 3 صاف اور بڑی ڈایا گرامز بنائی گئیں۔
- 4 بنائی گئی ڈایا گرامز میں ساختوں کو درست لیبل کیا گیا۔
- 5 سامان، میٹریلز اور کیمیکلز کو احتیاط سے استعمال کیا گیا۔
- 6 مشاہدات کو مکمل طور پر اور احتیاط کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا۔
- 7 شناخت کی گئی ساختوں کی وضاحت کی گئی: ساختوں اور افعال کا تعلق بنانے کی قابلیت کی دلیل۔

عمومی حفاظتی تدابیر

پیشتر کہ آپ شروع کریں.....

- 1- اپنے کام کرنے کی میز صاف ستھری رکھیں۔ یقین کر لیں کہ اس پر کوئی غیر ضروری اشیاء مثلاً اسکول بیگ، فائلیں، کپڑے اور کتابیں وغیرہ نہ پڑی ہوں۔
- 2- کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنی پریکٹیکل مینٹل / بک میں درج ہدایات کو اچھی طرح پڑھ لیں۔
- 3- مکمل طور پر حفاظتی احتیاطیں پیش نظر رکھیں۔
- 4- یقینی بنائیں کہ استعمال سے پہلے تمام آلات اور شیشے کا سامان صاف کر لیا گیا ہے۔

جب آپ تجربہ کر رہے ہوں.....

- 1- پریکٹیکل مینٹل / بک میں دی گئی ہدایات پر درست طور پر عمل کریں۔
- 2- نہ ادھر ادھر گھومیں اور نہ ہی اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے پریشانی پیدا کریں۔
- 3- آپ کو جو حفاظتی اشیاء مہیا کی گئی ہیں، انہیں پہنیں یا استعمال کریں۔ ان حفاظتی اشیاء میں جیسے، دستانے، اپرن اور محفوظ چمٹیاں شامل ہیں۔
- 4- اشیاء کو گرم کرتے وقت جالی یا سینڈ باتھ (Sand bath) کا استعمال کریں۔ گرم کرنے والے سامان کبھی خالی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نے اپنے کام کی میز کو چند لمحوں کے لیے بھی چھوڑنا ہو یا جب آپ اپنا تجربہ ختم کر لیں تو بئسن برڈ یا سپرٹ لیپ کو بند کر دیں۔
- 5- اپریٹس اور دوسرے آلات خصوصاً تیز دھارا اشیاء کو بہت احتیاط سے استعمال کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی ضرر یا نقصان نہ پہنچے۔
- 6- اگر آپ سے شیشے کی کوئی چیز (بیکرز، ٹیسٹ ٹیوبز اور تھرمامیٹرز وغیرہ) ٹوٹ جائے یا کوئی چیز گر جائے تو فوراً اپنے ٹیچر کو رپورٹ کریں۔ آپ کو شاید صفائی کرنے میں بھی مدد کرنا پڑے۔
- 7- آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آگ بجھانے والے آلات، آگ پر قابو پانے والے کمبل اور فرسٹ ایڈ کس، لیبارٹری میں کہاں پڑے ہوئے ہیں۔
- 8- لیبارٹری میں کوئی چیز مت کھائیں پیئیں۔

جب آپ کام ختم کر لیں.....

- 1- پانی اور گیس بند کر دیں، بجلی کے کنکشنز نکال دیں اور اپنا سامان لیبارٹری سٹاف کو واپس کر دیں۔
 - 2- اپنے آلات، شیشے کا سامان اور کام کرنے والی میز کو صاف کر دیں۔
 - 3- کوئی چیز ضائع کرنے کے لیے سنک میں نہ پھینکیں تا وقتیکہ آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہا جائے۔
 - 4- اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دھو لیں۔
- سب سے بہترین حفاظتی اقدام یہ ہے کہ ہمیشہ محتاط اور چوکس رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کام کرنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔

بائیولوجی کی ڈرائینگ کی ہدایات

- 1- آپ کی ڈرائینگ اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ یہ اُن تمام وضاحتوں کو دکھائے جو آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔
- 2- صرف اسی کو بنائیں جو آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ ٹیکسٹ بک کی ڈایا گرام سے گریز کریں۔
- 3- ایک نمونہ (specimen) کے مختلف حصے درست تناسب کے ساتھ بنانے چاہئیں۔
- 4- تمام ڈرائینگ اور لیبلنگ (بڑے حروف میں) کا کام پینسل (pencil) کے ساتھ کرنا چاہیے۔ صاف لائنیں (lines) بنانے کے لیے تیز 2B لیڈ پینسل (lead pencil) استعمال کریں۔ دھندلی اور ٹوٹی ہوئی لائنیں نہ بنائیں کیونکہ اس سے ممتحن کے لیے ڈرائینگ کا جائزہ لینا مشکل ہو جاتا ہے۔
- 5- اپنی پینسل کی سائیڈ سے سایہ (shade) نہ بنائیں۔ کریوز (crayons) اور رنگدار پینسلز کا استعمال نہ کریں۔
- 6- لیبلز کے لیے ڈرائینگ کی دونوں جانب مناسب جگہ چھوڑیں۔
- 7- صاف اور درست لیبلنگ کریں۔ افقی رخ پر لکھیں اور لیبلز کے مابین مناسب جگہ چھوڑیں۔
- 8- واحد اور جمع کا خیال رکھیں: مثال کے طور پر ایک بیج کی طرف اشارہ کرتی لائن کا لیبل 'بیجوں' نہیں کرنا چاہیے۔
- 9- لیبلنگ کی لائنیں ایک دوسرے کو قطع نہ کریں۔ لیبلنگ کے لیے ایسی لمبی لائنیں سے اجتناب کریں جو تمام ڈرائینگ کو کاٹ رہی ہوں۔

ڈائی سیکنگ باکس

لیبارٹری میں جانوروں اور پودوں کی ڈائی سیکشن کے لیے ڈائی سیکنگ باکس استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر مندرجہ ذیل اوزار ہوتے ہیں۔



ڈائی سیکنگ باکس

نمبر	آرٹیکل کا نام	ڈائی سیکنگ باکس میں تعداد
1	چاقو (scalpel)	دو
2	فورسپس (forceps)	دو
3	ہکس (hooks)	تین
4	ڈراپر (dropper)	ایک
5	پھونکنی (blow pipe)	ایک
6	استرا (razor)	ایک
7	مڑے ہوئے منہ والی سوئی (seeker)	ایک
8	قیچیاں (pair of scissors)	دو
9	عضلات اٹھانے والی سلاخ (retractor)	ایک
10	سوئی (needle)	ایک
11	نشر (lancet)	ایک

ان اوزاروں کے استعمال مندرجہ ذیل ہیں۔

- چاقو:** یہ جانور اور پودوں کے مختلف حصوں کو کاٹنے کے کام آتا ہے۔
- فورسپس:** اس کے ذریعہ چھوٹے چھوٹے ٹشوز یا جانور کی جلد کے ٹکڑوں کو پکڑا جاتا ہے۔
- ہکس:** ڈائی سیکشن کے دوران جانوروں کے ٹشوز کو کھینچنے کیلئے تین ہکس پر مشتمل ایک سیٹ استعمال کیا جاتا ہے۔
- قیچیاں:** کاٹنے کیلئے چھوٹی اور بڑی قیچیاں استعمال کی جاتی ہیں۔
- عضلات اٹھانے والی سلاخ:** اسے ٹشوز اور دوسرے میٹیریلز کو اٹھانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- نشر:** اسے ممبرینز کو ہٹانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- سوئیاں:** جانوروں اور پودوں کے کچھ حصوں میں سوراخ کرنے کیلئے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے کھنچے ہوئے ٹشوز اور بلڈ ویسلز کو علیحدہ کرنے کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
- مڑے ہوئے منہ والی سوئی:** اسے ڈائی سیکنگ کیے ہوئے چھپے ہوئے حصوں کو تلاش کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- استرا:** پودوں کے مختلف کراس سیکشنز اور سلائڈز تیار کرنے کے دوران کاٹنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- پھونکنی:** یہ ایک کھوکھلی اور خم دار پائپ ہے۔ اسے پھونک مارنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- ڈراپر:** اسے مائع میٹیریلز کے قطرے رکھنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔



چاقو



فورسپس



ہکس



قیچیاں




عضلات اٹھانے والی سلاخ



نشر




سونیاں



مڑے ہوئے منہ والی سون



اسٹرا



پھونکی



ڈراپ




میگنی فائینگ گلاس



سلائیڈز

Use of Microscope مائیکروسکوپ کا استعمال



1. مائیکروسکوپ ایک مہنگا آلہ ہے جس کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے پہلے درج ذیل چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
اگر آپ اسے ایک جگہ سے دور کسی جگہ اٹھا کر لیجانا چاہیں تو اس کو ہمیشہ سیدھا پکڑیں اور ٹیڑھا میڑھا نہ کریں۔ اسے ایک ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑیں اور اس کے بیس (base) کو بازوؤں سے اپنے ساتھ لگائے رکھیں۔ لیجائے دوران اسے مت اچھالیں۔ مائیکروسکوپ کو میز کے کنارے پر مت رکھیں۔
2. استعمال سے پہلے اوکولر (ocular) اور اوپیکولر (objective) لینز کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان گلاس لینز پر آسانی سے لائنز لگ سکتی ہیں اور انہیں صرف لینز پیپر سے ہی صاف کرنا چاہیے۔
3. فائن فوکس نوب (fine focus knob) پر ہاتھ رکھنا اور دیے گئے آدجیکٹ کے مطالعہ دوران اسے فوکس کرنا سیکھیں۔

4. کسی بھی طرح کی سلائڈ کے مشاہدہ کے دوران مائیکروسکوپ کو مت ہلائیں۔ جب مائیکروسکوپ عمودی پوزیشن میں ہوا تو اس کے میز سے گرنے کے مواقع کم ہی ہوں گے۔
5. آئینہ (اگر موجود ہے) اور آئرس ڈایا فرام کو ایڈجسٹ کریں تاکہ آئی پیس (eye piece) سے واضح اور صاف منظر کشی ہو (لیکن زیادہ روشن نہیں)۔
6. نمونے کی سلائڈ کو سٹیج پر رکھیں اور کلیپس (clips) کی مدد سے اسے فکس کر دیں۔
- کورس ایڈجسٹمنٹ (coarse adjustment) کو استعمال کرتے ہوئے، باڈی ٹیوب (body tube) کو اتنا نیچا کریں کہ اوہجیکٹو لینز سلائڈ کے قریب ہو جائے لیکن اسے چھوئیں نہ۔
7. اب آئی پیس کے ذریعہ دیکھیں اور فائن ایڈجسٹمنٹ استعمال کر کے باڈی ٹیوب کو اتنا اوپر کریں کہ سلائڈ فوکس میں آجائے۔
8. نمونے کے حصوں کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ کم پاور کے اوہجیکٹو لینز سے شروع کریں اور مزید مشاہدہ کے لیے زیادہ پاور کے اوہجیکٹو لینز تک جائیں۔
9. تیار شدہ خرد بینی نمونوں (wet mount preparations) کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ان کے اوپر کور سلپ رکھیں۔
10. مائیکروسکوپ کے کسی حصہ کو بھی علیحدہ نہ کریں۔
11. استعمال کے بعد مائیکروسکوپ کو صاف کریں اور اسے اسکی جگہ پر رکھیں اور یقین کر لیں کہ کم پاور کے اوہجیکٹو لینز کو اس کی جگہ پر کر دیا گیا ہے، باڈی ٹیوب کو نیچے کر دیا گیا ہے، مائیکروسکوپ کو اس کی سیدھی پوزیشن میں کر دیا گیا ہے اور اس کے کلیپس سٹیج سے باہر نہیں نکلے ہوئے۔
12. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا آلہ درست کام نہیں کر رہا تو اپنے استاد کو بتائیں۔



ڈائی سیکنگ مائیکروسکوپ

بائیولوجی کا تعارف



حصہ اول: تیار شدہ سلائیڈز کی مدد سے بیکٹیریا کی مختلف اقسام کا مطالعہ

تاریخ:


بیکٹیریا پروکاریوٹس ہیں۔ جسامت اور شکل کے لحاظ سے یہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا کی لمبائی 1 سے 10 مائیکرو میٹر جبکہ چوڑائی 0.2 سے 1 مائیکرو میٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک بیکٹیریم کے گرد سیل وال اور سیل ممبرین ہوتی ہے۔ ان میں واضح نیوکلیس موجود نہیں ہوتا۔ ان کا جینیٹک میٹیریل ایک بڑے اور بل کھائے ہوئے کروموسوم کی شکل میں ہوتا ہے۔ شکل کے لحاظ سے بیکٹیریا کی چار اقسام ہیں۔



کیا آپ جانتے ہیں؟

ہمارے جسم میں بیکٹیریا اور دوسرے مائیکرو بڑی تعداد ان سیلز سے زیادہ ہے جو ہمارا جسم بناتے ہیں۔

- ☆ کوکائی (Cocci): واحد کوکس (Coccus)، گول ہوتے ہیں۔
- ☆ بیسی لائی (Bacilli): واحد بیسی لس (Bacillus)، سلاخ نما ہوتے ہیں۔
- ☆ ویریوز (Vibrios): واحد ویریو (Vibrio)، کومہ شکل (comma-like) ہوتے ہیں۔
- ☆ سپائریلا (Spirilla): واحد سپائریلیم (Spirillum)، بلداری ہوتے ہیں۔



شکل 1.1.1: مختلف اقسام کے بیکٹیریا

بیکٹیریا کی مختلف اقسام کی تیار شدہ سلائیڈز، مائیکروسکوپ



احتیاطیں!

☆ تیار شدہ سلائڈز کو پکڑتے اور
مائیکروسکوپ پر رکھتے وقت احتیاط برتیں۔
☆ مشاہدہ کرنے سے پہلے سلائڈز اور
مائیکروسکوپ کے آؤٹ لائنز اور اوپننگز کو صاف
کریں۔

1- مائیکروسکوپ کی کم اور زیادہ پاور کے نیچے بیکٹیریا کی تیار شدہ
سلائڈز کا مشاہدہ کریں۔ اپنے مشاہدات کو ریکارڈ کریں۔




نمبر شمار	بیکٹیریا کی شکل	بیکٹیریا کی قسم کا نام



حیران کن حقیقت

اگر بیکٹیریا کے ایک سیل کو اس کی تمام خوراک مہیا کی جائے، تو وہ تقسیم ہو کر 24 گھنٹوں
میں سبز کا ایک گیند بنادے گا، جس کا سائز زمین کے برابر ہوگا۔






تجربہ 1.1: تیار شدہ سلائیدز / تازہ کلچر / چارٹس کی مدد سے امیبا، پیرامیسیم اور وولوکس کا مطالعہ

تاریخ:

(a) امیبا کا مطالعہ



امیبا ایک یونی سیلولر یوکیریوٹ ہے۔ یہ ایک بے قاعدہ شکل رکھتا ہے، جو اس کی باریک اور چمک دار ممبرین کی وجہ سے مستقل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس کے پاس انگلی نما ابھار ہوتے ہیں جنہیں سوڈوپوڈیا (pseudopodia)؛ واحد سوڈوپوڈیم (pseudopodium) کہتے ہیں۔ امیبا اپنے سوڈوپوڈیا کی مدد سے حرکت کرتا ہے اور خوراک جسم میں لے جاتا ہے۔ سائٹوپلازم دو حصوں میں تقسیم شدہ ہوتا ہے؛ باہر والا ایکٹوپلازم (غیر دانے دار) اور اندر والا اینڈوپلازم (دانے دار)۔ اینڈوپلازم کے اندر ایک واضح نیوکلیس موجود ہوتا ہے۔ اینڈوپلازم میں ہی بہت سے کنٹریکٹائل (contractile) ویکیلز اور مختلف جسامتوں کے فوٹو ویکیلز موجود ہوتے ہیں۔ کنٹریکٹائل ویکیلز کا کام ایکسکریشن کا فعل سرانجام دینا ہے۔



شکل 1.1.2: امیبا کی ساخت

تیار شدہ سلائیدز / چارٹس، مائیکروسکوپ، گلاس سلائیدز، کورسلپس، ڈراپر، پیٹری ڈش، بلاٹنگ پیپر، بیکر، تازہ کلچر



احتیاطیں!

☆ تیار شدہ سلائیدز کو زور سے نہ دبا کیں۔
اس طرح کرنے سے مینیریل ٹوٹ
پھوٹ سکتا ہے

☆ بالائیک ہتھی کی مدد سے کورسلپ کے ارد گرد
کا پانی خشک کریں۔

-A چارٹ اور مائیکروسکوپ کے نیچے تیار شدہ سلائیدز کا مشاہدہ کریں۔
-B تازہ کلچر سے؛


- 1- تازہ کلچر سے پانی کا ایک قطرہ گلاس سلائید پر ڈالیں۔
- 2 اس کے اوپر ایک کورسلپ رکھ دیں۔
- 3- مائیکروسکوپ کی کم اور زیادہ پاور میں دیکھیں۔



(b) - پیرامیسیم کا مطالعہ



پیرامیسیم ایک یونی سیلر یوکیریوٹ ہے۔ اس کی شکل جوتے جیسی (slipper shaped) ہے یعنی یہ لمبوتر ہے اور اس کا اگلا کنارہ گول جبکہ پچھلا کنارہ نوکیلا ہوتا ہے۔ یہ بال نما ساختوں یعنی سیلیا (cilia) واحد سکیم (cilium) کی مدد سے حرکت کرتا ہے۔ سیلیا اس کے جسم کی تمام سطح پر پائے جاتے ہیں۔ اس کے پاس دو نیوکلیائی ہوتے ہیں؛ بڑے والے کو میکرو نیوکلیس (macronucleus) جبکہ چھوٹے والے کو مائیکرو نیوکلیس (micronucleus) کہتے ہیں۔ اس کے اندر دو کنٹریکٹائل ویکیلز اور بہت سے فوڈ ویکیلز پائے جاتے ہیں۔ اس کے منہ کا نالی نما خانہ یعنی اوول گروو (oral groove) ایک چھوٹے سوراخ کے ذریعہ ایک تنگ نلی میں کھلتا ہے جسے گلٹ (gullet) کہتے ہیں۔



شکل 1.1.3: پیرامیسیم کی ساخت

پیرامیسیم کی تیار شدہ سلائیڈز / چارٹس / تازہ کلچر، مائیکروسکوپ، گلاس سلائیڈز، کورسلس، ڈراپر، پیٹری ڈش، بلائنگ پیپر، گلسرین، پیکر



A- مائیکروسکوپ کے نیچے تیار شدہ سلائیڈز کا مشاہدہ کریں۔

B- تازہ کلچر سے؛

1- ایک گلاس سلائیڈ پر گلسرین کا ایک قطرہ ڈالیں۔

2- تازہ کلچر سے پانی کا ایک قطرہ اس پر ڈالیں۔

3- اس کے اوپر ایک کورسلس رکھ دیں۔

4- سلائیڈ کو مائیکروسکوپ کی کم اور زیادہ پاور کے نیچے دیکھیں۔




سوچئے

پیرامیسیم کی سطح پر اتنے زیادہ سیلیا کیوں ہوتے ہیں؟



(c) - وولووکس کا مطالعہ

وولووکس (Volvox) تالابوں، جوہڑوں، نالیوں اور جھیلوں میں نمو پاتا ہے۔ وولووکس ایک فرد نہیں بلکہ بہت سے ایک جیسے سیلز کی کالونی ہے۔ وولووکس کی کالونی کے اندر بہت سی ڈاٹر کالونیاں (daughter colonies) ہوتی ہیں۔ کالونی کے ہر سیل کے پاس، اگلے کنارے پر، فلے جیلا کا ایک جوڑا ہوتا ہے جو کالونی کو پانی میں حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے۔



شکل 1.1.4: وولووکس کے ایک سیل کی ساخت اور وولووکس کالونی

دولوکس کی تیار شدہ سلائڈز / چارٹس / تازہ کلچر، مائیکروسکوپ، گلاس سلائڈز، کورسلپس، ڈراپر، پیٹری ڈش، بلائنگ پیپر، بیکر گلسرین



-A مائیکروسکوپ کے نیچے تیار شدہ سلائڈز کا مشاہدہ کریں۔

-B تازہ کلچر سے؛

1- ایک گلاس سلائڈ پر گلسرین کا ایک قطرہ ڈالیں۔

2- تازہ کلچر سے پانی کا ایک قطرہ اس پر ڈالیں۔

3- اس کے اوپر ایک کورسلپ رکھ دیں۔

4- سلائڈ کو مائیکروسکوپ کی کم اور زیادہ پاور کے نیچے دیکھیں۔





-1

ایک سنگترے یا کسی اور ترنجی (citrus) پھل کو ٹکڑوں میں کاٹیں اور ایک ٹکڑے کو پیٹری ڈش میں رکھ دیں۔ اسے A لیبل کر دیں اور میز پر رکھ چھوڑیں۔ ایک اور ٹکڑے کو دوسری پیٹری ڈش میں رکھیں۔ اسے B لیبل کریں اور ریفریجریٹر میں رکھ دیں۔ تین دن بعد دونوں ٹکڑوں کا مشاہدہ کریں۔ (اسی طرح کی سرگرمی دودھ کے ساتھ بھی کی جاسکتی ہے)۔

i- وضاحت کریں کہ آپ نے پیٹری ڈش A اور B میں کیا مشاہدہ کیا؟

.....

.....

.....

ii- سر حالات کا مائیکرو آرگنزمز پر کیا اثر ہوتا ہے؟

.....

.....

-2 مائیکروسکوپ کے نیچے تالاب، بارش اور نلکے کے پانی کا مشاہدہ کریں۔

i- آپ نے کون سے مائیکرو آرگنزمز دیکھے؟


.....

ii- کون سے نمونہ (sample) میں آپ نے سب سے زیادہ مائیکرو آرگنزمز دیکھے؟

.....

.....

حصہ اول: مرسوں کے پودے (براسیکا کمپیسٹریس *Brassica campestris*)



کی بیرونی ساخت کا مطالعہ

تاریخ:

براسیکا کمپیسٹریس (مرسوں کا پودا) ایک ڈائی کاٹ ایجنٹ سپرم ہے۔ پودے کے جسم کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں۔

☆ ویکٹیو (vegetative) حصہ جڑ، تار اور پتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

☆ تولیدی حصہ پھولوں پر مشتمل ہے۔ بیج اور پھل پھول سے ہی بنتے ہیں۔



براسیکا کا تازہ پودا، ڈائی سیکنگ باکس،

میکیفائنگ لینز (magnifying lens)،


گلاس سلائڈ یا پیپری ڈش



1- براسیکا کا ایک تازہ پودا لیں اور اس کی جڑ، تنے، پتوں اور پھولوں کا مشاہدہ کریں۔

2- فورسپس (forceps) کی مدد سے پودے کے حصوں کو علیحدہ کریں اور ان کا مشاہدہ

بڑے میکیفائنگ لینز کے نیچے کریں۔



شکل 1.2.1: براسیکا کی بیرونی ساخت

جڑ، تنا اور پتے کی بیرونی ساخت کا مطالعہ کریں۔




☆ پودے کے ہر حصے کی ڈایا گرام بنائیں اور لیبل کریں۔

حصہ دوم: براسیکا کی جڑ، تنا اور پتے کا خورد بینی معائنہ

تاریخ:

(الف)۔ جڑ کا خورد بینی معائنہ

جڑ پودے کو مٹی میں گاڑتی ہے۔ یہ مٹی سے پانی اور معدنی نمکیات جذب کرتی ہے۔ اس کی اندرونی ساخت اپی ڈرمس (epidermis)، کارٹیکس (cortex)، اینڈوڈرمس (endodermis)، پیری سائیکل (pericycle)، کیمیم (cambium)، پتھ (pith) اور ویکسولر بنڈل (vascular bundle) زائلم اور فلوئم پر مشتمل ہے۔ اپی ڈرمس کے چند سیلز سے باریک حصے آگے کو بڑھے ہوتے ہیں، جنہیں روٹ ہیئرز (root hairs) کہتے ہیں۔



شکل 1.2.2: ایک ڈائی کٹ جڑ کا عرضی تراشا

براسیکا کی جڑ کے عرضی تراشہ کی تیار شدہ سلائیڈز، مائیکروسکوپ





سوچئے

آپ کیسے شناخت کرتے ہیں
کہ پیایک جڑ ہے؟

مائیکروسکوپ کی کم اور زیادہ پاور کے نیچے جڑ کے عرضی
تراشا کی تیار شدہ سلائڈز کا مشاہدہ کریں۔



Blank area for writing observations, with horizontal dashed lines for text entry.


☆ آپ نے مائیکروسکوپ کے نیچے جو کچھ بھی دیکھا، اس کی ڈایا گرام بنائیں اور لیبل کریں۔

Blank area for drawing a diagram of the root cross-section and labeling the parts.

(ب)۔ تنے کا خرد بینی معائنہ



تفامٹی سے اوپر کی طرف ممو پاتا ہے۔ اس پر پتے، پھول اور شاخیں بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کی اندرونی ساخت اپنی ڈرس، کارٹکس، اینڈوڈرس، وئسکولر ٹشوز، کیمیم، میڈولری ریز (medullary rays) اور پتھ پر مشتمل ہے۔



شکل 1.2.3: ایک ڈائی کٹ تنے کا عرضی تراشا

براسیکا کے تنے کے عرضی تراشا کی تیار شدہ سلائیڈز، مائیکروسکوپ



1-

مائیکروسکوپ کی کم اور زیادہ پاور سے نیچے تنے کے عرضی تراشا کی تیار شدہ سلائیڈز کا مشاہدہ کریں۔

سوچئے

آپ کیسے شناخت کرتے ہیں کہ یہ ایک تنہ ہے؟




☆ آپ نے مائیکروسکوپ کے نیچے جو کچھ بھی دیکھا، اس کی ڈایا گرام بنائیں اور لیبل کریں۔



(ج)۔ پتے کا خوردبینی معائنہ

پتے کے کچھ حصے ہوتے ہیں یعنی پتیول (petiole) اور لمبنا (lamina)۔ پتے کی اندرونی ساخت کیونگیل (cuticle)، بالائی اپی ڈرمس، میزوفیل ٹشو (mesophyll tissue)، ویسکولر ٹشو اور زیریں اپی ڈرمس (جس کے اندر گارڈ سیلز کے ساتھ سٹومیٹا ہوتے ہیں) مشتمل ہے۔



شکل 1.2.4: ایک ڈائی کاسٹ پتے کا عرضی تراشا

براسیکا کے پتے کے عرضی تراشا کی تیار شدہ سلائیڈز، مائیکروسکوپ



سوچئے

آپ کیسے شناخت کرتے ہیں کہ یہ ایک پتا ہے؟

1- مائیکروسکوپ کی کم اور زیادہ پاور کے نیچے پتے کے عرضی تراشا کی تیار شدہ سلائیڈز کا مشاہدہ کریں۔



Blank writing area with horizontal lines.



☆ آپ نے مائیکروسکوپ کے نیچے جو کچھ بھی دیکھا، اس کی ڈایا گرام بنائیں اور لیبل کریں۔

Blank writing area with horizontal lines.

Web version of PCTB Textbook

Blank writing area with horizontal lines.



حصہ سوم: براسیکا کے پھول، پھل اور بیج کا مطالعہ


تاریخ:

پھول پودے کا تولیدی حصہ ہوتا ہے۔ ایک پھول چار طرح کے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: کیلکس (calyx)، کرولا (corolla)، اینڈروشیئم (androecium) اور گائی نیشیم (gynoecium)۔ یہ حصے گھروں (whorls) کی شکل میں ایک خاص ترتیب سے پائے جاتے ہیں۔



☆ کیلکس سب سے بیرونی گھیرا ہے اور یہ چار سپلز (sepals) پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ سپلز عموماً سبز ہوتے ہیں۔
سپلز کا کام اس وقت پھول کے اندرونی حصوں کی حفاظت کرنا ہے جب وہ بڈ (bud) کی شکل میں ہوتے ہیں۔
☆ کرولا دوسرا گھیرا ہے اور یہ چار آزاد زرد سپلز (petals) پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کا کام پھول کی پولی نیشن میں مدد کرنا ہے۔


☆ اینڈروشیئم پھول کا تولیدی حصہ ہوتا ہے۔ اس میں چھ آزاد سیٹمنز (stamens) شامل ہیں۔ ہر سیٹمن کے دو حصے ہیں: فلامنٹ (filament) اور اینتھر (anther)۔ ہر اینتھر میں پولن سیکس (pollen sacs) ہوتے ہیں جن کے اندر بے شمار پولن گریبز بنتے ہیں۔



شکل 1.2.5: پھول کی ساخت

☆ گائی نیشیم مادہ تولیدی حصہ ہے اور دو کارپلز (carpels) کے ملنے سے بنتا ہے۔ ہر کارپل کے تین حصے ہیں یعنی سٹگما (stigma)، سٹائل (style) اور اووری (ovary)۔

بالغ اور پکی ہوئی اووری کو پھل کہتے ہیں۔ براسیکا میں پھلی (legume: لیگیوم) کی شکل میں پھل ہوتے ہیں۔ اس کے پھل کو سیلی کیوا (siliqua) یعنی ڈوڈا (pod) کہتے ہیں۔ لیگیوم کے اندر بہت سے بیج ہوتے ہیں۔ یہ بیج چھوٹے، وزن میں ہلکے، گول اور سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ براسیکا کے بیج ہوا کے ذریعہ منتشر ہوتے ہیں۔



شکل 1.2.6: براسیکا کا پھل (لیگیوم) اور بیج

- 1- ایک تازہ پھول لیں اور میگنیفائنگ لینز کی مدد سے اس کے حصوں کا مشاہدہ کریں۔
- 2- اس کے حصوں کو الگ الگ کریں۔ ان حصوں کو گلاس سلائیڈ پر رکھ کر تفصیلی مشاہدہ کریں۔
- 3- ایک لیگیوم کو کھول کر اس کے اندر بیجوں کا مشاہدہ کریں۔



☆ پھول، پھل اور بیج کی ڈایا گرامز بنائیں اور لیبل کریں۔

پھول	
پھل	بیج



.....

.....

.....

.....

.....

1- ایسے تنوں، پتوں اور پھولوں کی کم از کم دو دو مثالیں دیں، جنہیں ہم بطور سبزی استعمال کرتے ہیں۔



.....

.....

.....

.....

2- اپنی روزمرہ کی زندگی میں سرسوں کے بیج کے استعمالات کی فہرست بنائیں۔

.....

.....

.....

3- پتے سبز ہوتے ہیں اور وہ فوٹوسنتھی سبز کرتے ہیں۔ تربوز کا بیرونی غلاف بھی سبز ہوتا ہے۔ کیا تربوز کے بیرونی سبز غلاف میں بھی فوٹوسنتھی سبز ہوتی ہے؟

.....


.....

.....

.....

ڈائی سیٹ کیے گئے مینڈک میں بڑے آرگنز اور آرگن سسٹمز کی شناخت

(استاد یا معلم عملی demonstrator: ڈائی سیشن کریں گے)



تاریخ:





کیا آپ جانتے ہیں؟

- ☆ دنیا میں سب سے بڑا مینڈک مغربی افریقا میں پایا جانے والا The Goliath Frog of Gabon ہے۔ یہ 33 سنی میٹر تک لمبا اور 3 کلوگرام وزنی ہو سکتا ہے۔
- ☆ دنیا میں سب سے چھوٹا مینڈک The Little Grass Frog ہے۔ یہ عام کبھی سے بڑا نہیں ہوتا۔


☆ مینڈک کے سر پر دو بیرونی نتھنے یعنی ناسٹریلز (nostrils)، دو ایئر ڈرمز اور دو آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہر آنکھ پر تین پپوٹے ہوتے ہیں۔ تیسرا پپوٹا شفاف ہوتا ہے اور اسے کئی ٹیننگ (nictitating) ممبرین کہتے ہیں۔ مینڈک کی چھبلی ٹانگوں کی انگلیوں کے درمیان پانی جانے والی جھلی کو ویب (web) کہتے ہیں جو اسے پانی میں تیرنے میں مدد دیتی ہے۔ مینڈک کی بکل کیوٹی کے فرش پر دونوں طرف دو بکل سیس (vocal sacs) کے سوراخ بھی ہوتے ہیں۔



زمینڈک کا انگوٹھے کا پیڈ (pad)




شکل 1.3.1: مینڈک



زمینڈک کا دو بکل سیس (vocal sac)

شکل 1.3.2: زمینڈک کی امتیازی خصوصیات



شکل 1.3.3: مینڈک کی اوّل کیوٹی میں موجود ساختیں


☆ منہ کی اطراف پر بالائی اور زریں جڑے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں بکل کیوٹی (منہ کا خلا) ہوتی ہے۔ منہ کے اندر دو اندرونی نتھنے ہیں۔ منہ کی چھت کے درمیان میں دو وومرائن دانت (vomerine teeth) اور بالائی جڑے کے ساتھ لگے میگزیلری دانت (maxillary teeth) کی ایک قطار ہوتی ہے۔ مینڈک کی زبان لیس دار ہے اور بکل کیوٹی کے اگلے سرے سے جڑی ہوتی ہے۔



کیا آپ جانتے ہیں؟

- ☆ مینڈک کی زبان سے ایک چھپچھا مادہ نکلتا ہے جس سے یہ اپنے شکار کو پکڑتا ہے۔
- ☆ زمینڈک تولید کے لیے مادہ مینڈک کو ٹرٹر (croaking) کی آوازیں نکال کر متوجہ کرتا ہے۔

☆ ڈائجسٹو (digestive) سسٹم ایلیمینٹری کینال (alimentary canal) اور ڈائجسٹو گلینڈز پر مشتمل ہے۔ منہ کے خلا کو اورل کیویٹی کہتے ہیں اور اس کے پیچھے فینکس موجود ہے۔ فینکس میں کئی سوراخ ہوتے ہیں: ایک ایسوفیگس میں، ایک لیرکس میں، اور دو یوسٹیشین ٹیوبز میں کھلتے ہیں۔



شکل 1.3.4: مینڈک میں مختلف آرگنز

- ☆ ایسوفیگس سے آگے معدہ اور پھر بیلڈار چھوٹی آنت ہے۔ معدہ کے قریب ہی جگر اور پنکتر یا ز بھی موجود ہیں۔
- ☆ ریسپیریٹری (respiratory) سسٹم میں ناسٹرلز، لیرکس اور ایک ٹریکیا ہے، جو دو پھیپھڑوں میں کھلتی ہے۔
- ☆ سرکولیٹری (circulatory) سسٹم میں دل، بلڈ ویسلز اور خون شامل ہیں۔ دل میں دو ایٹریا (atria) اور ایک وینٹریکل (ventricle) ہیں۔ جسم کے مختلف حصوں سے وینز دائیں ایٹریم میں داخل ہوتی ہیں، جبکہ پھیپھڑوں سے وینز بائیں ایٹریم میں داخل ہوتی ہیں۔ وینٹریکل آرٹریز کے ذریعہ خون کو دل سے باہر پمپ کرتا ہے۔
- ☆ یورینری یا ایکسکریٹری (urinary or excretory) سسٹم دو گردوں، دو پوریٹرز، ایک مثانہ اور ایک کلوائیکا پر مشتمل ہے۔
- ☆ نریریٹو ڈکٹو (reproductive) سسٹم کے آرگنز ٹیسٹیز (testes)، سپرم ڈکٹس اور کلوائیکا ہیں۔ مادہ ریپروڈکٹو سسٹم میں اووریز (ovaries)، اووڈکٹس (oviducts)، یوٹرائی (uteri) اور کلوائیکا شامل ہیں۔
- ☆ مینڈک کے سینٹرل نروس (central nervous) سسٹم میں دماغ (جو کہ کھوپڑی میں بند ہوتا ہے) اور سپائنل کارڈ (جو کہ ورٹیبائل کالم میں بند ہے) شامل ہیں۔ دماغ اور سپائنل کارڈ سے نروس (nerves) نکلتی ہیں۔
- ☆ مینڈک کا سکلیٹل (skeletal) اور مسکولر (muscular) سسٹم ہڈیوں کے فریم ورک (framework) پر مشتمل ہے جس کے ساتھ سارے جسم کے سکلیٹل مسلز جڑے ہوتے ہیں۔


بے ہوش کیا گیا (pithed or anaesthetized) مینڈک، ڈائی سیکنگ ٹری (tray)، کاٹن یا پیپر ٹاولز
(dissecting kit)، ڈائی سیکنگ کٹ (paper towels)



احتیاطیں!

☆ ڈائی سیکنگ کیے گئے مینڈک
کے آرگنز کو بلاہش نہ کاٹیں۔
☆ چھپی ہوئی ساختوں کو ہاتھوں
سے ٹٹولنے کے لیے دستانے
استعمال کریں۔

- 1- مینڈک کے بیرونی اعضاء کی شناخت کریں۔
- 2- ڈائی سیکنگ کیے گئے مینڈک میں ڈائجیسٹو، سرکولیٹری، ریپیریٹری،
یورینی اور ریپروڈکٹو سسٹمز کے آرگنز کے مقامات کی نشاندہی کریں۔



شکل 1.3.5: ڈائی سیکنگ کیے گئے مینڈک کے اندرونی اعضاء

☆ اپنے مشاہدات کی تصاویر بنائیں۔



ڈائجیسٹو سسٹم

ریسپیریٹری سسٹم

ایکسکریٹری سسٹم

Web Version of PCB Textbook

☆ مینڈک میں دیکھے گئے مختلف آرگنز کی ظاہری شکل صورت بیان کریں۔

.....


.....


.....

.....

.....

☆ مندرجہ ذیل ڈایا گرام کو لیبل کریں۔





1- اس رستہ کی نشان دہی کریں جس پر آکسیجن کا ایک مالیکیول فضا سے پلمونری وین کے خون تک جاتا ہے۔ اس عمل کے ذمہ دار آرگنز کون سے ہیں جس کے ذریعہ جسم کے اندر ہوا حرکت کرتی ہے؟

2- انسان صرف پھیپھڑوں کے ذریعہ سانس لیتا ہے جبکہ مینڈک پھیپھڑوں اور جلد دونوں کے ذریعہ سانس لیتا ہے۔ کیا اس بات کا مینڈک کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ کس طرح؟


3- مینڈک کا دل انسانی دل سے کیسے مختلف ہے؟

4- ایک ٹیبل بنائیں اور اس میں ان آرگنز کے نام لکھیں جو مینڈک کے ڈائجسٹو، سرکولیٹری، ریسپیریٹری، یوریزی (ایکسکریٹری) اور ریپروڈکٹو سسٹمز بناتے ہیں۔

آرگن سسٹم	آرگنز			
ڈائجسٹو سسٹم				
ریسپیریٹری سسٹم				
ایکسکریٹری سسٹم				
ریپروڈکٹو سسٹم				
مادہ ریپروڈکٹو سسٹم				
نروس سسٹم				
سرکولیٹری سسٹم				

بائیو ڈائیورسٹی

دکھائی دینے والی امتیازی ٹیکسٹونومک (taxonomic) خصوصیات کی بنیاد پر تازہ اور محفوظ کیے گئے نمونوں سے مختلف جانوروں اور پودوں کی شناخت



تاریخ:

کیا آپ جانتے ہیں؟



☆ جنے لوگ تمام زمین پر پائے جاتے ہیں، ان سے زیادہ تعداد میں حشرات زرخیز مٹی کے ایک مربع میل میں موجود ہوتے ہیں۔

کنگڈم اینیملیا Kingdom Animalia

کنگڈم اینیملیا کو مزید دو گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے یعنی ان-ورٹبرٹس (جن میں ورٹبرل کالم نہیں ہوتی) اور ورٹبرٹس (جن میں ورٹبرل کالم ہوتی ہے)۔
چند اہم ان-ورٹبرٹس کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔



جیلی فش Jellyfish

☆ جسم دو تہوں (germ layers) یعنی ایکٹو ڈرم (ectoderm) اور اینڈو ڈرم (endoderm) کا بنا ہوتا ہے۔

☆ ڈائجسٹو کیوٹی کا ایک ہی سوراخ ہے۔

☆ جسم میں ریسپیٹری اور سرکولیٹری سسٹم موجود نہیں ہیں۔

☆ سینٹرل نروس سسٹم موجود نہیں ہے۔

☆ جیلی فش سمندروں میں پائی جاتی ہیں (کچھ پسی شیر تازہ پانیوں میں بھی پائی جاتی ہیں)۔



جیلی فش (Jellyfish)



پلینیرین (Planarian)

پلینیریا Planaria

☆ جسم تین تہوں یعنی ایکٹو ڈرم (ectoderm)، میزو ڈرم (mesoderm) اور اینڈو ڈرم (endoderm) کا بنا ہوتا ہے۔

☆ ڈائجسٹو کیوٹی کا ایک ہی سوراخ ہے۔

☆ جسم میں ریسپیٹری اور سرکولیٹری سسٹم موجود نہیں ہیں۔

☆ ان کے پاس ایک واضح سر (head) ہے جس پر سینس

آرگنز (sense organs) موجود ہوتے ہیں۔

☆ پلینیریا سمندروں اور تازہ پانیوں میں پائے جاتے ہیں۔



اسکیرس (Ascaris)

اسکیرس Ascaris

☆ یہ انسان کا پیرواسائٹ ہے اور اس کا جسم نالی نما (tubular) ہے۔



کینچوا (Earthworm)

☆ ڈائجسٹو نالی کے دو سوراخ ہیں یعنی منہ اور اینس (anus)۔

☆ جسم تین تہوں یعنی ایکٹوڈرم (ectoderm)، میزوڈرم (mesoderm) اور اینڈوڈرم (endoderm) کا بنا ہوتا ہے۔

کینچوا Earthworm

☆ اس کا جسم قطعہ دار (segmented) ہوتا ہے۔

☆ یہ آزادانہ زندگی گزارتا ہے اور مٹی میں پایا جاتا ہے۔

☆ اس کے جسم میں کلوزڈ بلڈ سرکولیٹری (closed blood circulatory) سسٹم پایا جاتا ہے۔ یہ اپنی جلد کے ذریعہ سانس لیتا ہے۔

گھونگا Snail

☆ اس کے جسم کے ساتھ ایک عضلاتی پاؤں ہوتا ہے۔

☆ اس کا جسم ایک بلدار شیل (shell) میں بند ہوتا ہے۔

☆ اس کے سر پر دو ٹینیکلز (tentacles) ہوتے ہیں۔



گھونگا (Snail)

ایڈیز اےجیپٹی Aedes aegypti

☆ اس کا تعلق ان-ورٹیبریٹس کے ایک بڑے گروپ یعنی حشرات سے ہے۔

☆ اس کے جسم کے تین حصے ہوتے ہیں یعنی سر، تھوریکس (thorax) اور ابڈامن (abdomen)۔

☆ یہ اپنے پروں (wings) کی مدد سے اڑتا ہے۔

☆ ان کے پاس بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اور یہ ہوا کی خاص نالیوں یعنی ٹریکیئل ٹیوبز (tracheal tubes) کی مدد سے سانس لیتے ہیں۔

☆ ان کے نر جانور آزادانہ زندگی گزارتے ہیں لیکن مادہ جانور ڈینگی (dengue) بخار کے وائرس کو ایک انسان سے دوسرے میں منتقل کرتے ہیں۔

☆ اس مچھر کا ارتقا افریقہ میں ہو گا مگر اب یہ تمام دنیا میں پایا جاتا ہے۔



ایڈیز اےجیپٹی (Aedes aegypti)

سٹار فش (سی سٹار) Starfish (Sea star)

☆ اس کا جسم ستارے جیسا ہے اور ایک مرکزی ڈسک (central disc) اور پانچ بازوؤں پر مشتمل ہے۔

☆ بازوؤں کی چٹکی جانب بہت سے ٹیوب فیٹ (tube feet) ہوتے ہیں۔



سٹار فش (Starfish)

☆ سٹار فش صرف سمندروں میں پائے جاتے ہیں۔

☆ وریبرٹس کو پانچ کلاسوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

1. کلاس پائسمز (مچھلیاں) Class Pisces (Fishes)

مچھلیاں پانی میں پائی جاتی ہیں اور کولڈ بلڈڈ (cold blooded) ہوتی ہیں (اپنے جسم کے درجہ

حرارت کو برقرار نہیں رکھ سکتیں)۔ مچھلیوں کے تین بڑے گروپس ہیں۔

a. بغیر جڑوں کے مچھلیاں Jawless Fishes

(i) ان کے پاس جڑے نہیں ہوتے۔

(ii) ان کا جسم لمبا اور ایل (eel) کی طرح کا ہوتا ہے۔ جسم پر جوڑوں کی شکل میں فنز (paired fins) نہیں ہوتے۔



(iii) ان کا سکیلیٹن کارٹیج کا بنا ہوتا ہے۔

(iv) ان کے پاس سوّم بلیڈر (swim bladder) نہیں ہوتا۔

مثالیں: لیپرے (lamprey) اور ہیگ فش (hagfish)

بغیر جڑوں کے مچھلی (Jawless fish)

b. کارٹیج کے سکیلیٹن والی مچھلیاں Cartilaginous Fishes

(i) ان کا سکیلیٹن کارٹیج کا بنا ہوتا ہے۔

(ii) منہ پیچے (وینٹرل) کی طرف ہوتا ہے، جس کے ساتھ بالائی اور زریں جڑے ہوتے ہیں۔



(iii) ان کے پاس سوّم بلیڈر نہیں ہوتا۔

(iv) ان کے گلز (gills) اپرکولم (operculum) سے نہیں ڈھکے ہوتے۔

(v) ان کی جلد سخت ہوتی ہے۔

مثالیں: شارک (shark)، رے (ray) اور سکیٹ (skate)

c. ہڈی دار سکیلیٹن والی مچھلیاں Bony Fishes

(i) ان کا سکیلیٹن ہڈیوں کا بنا ہوتا ہے۔

(ii) ان کا منہ ابتدائی سرے پر ہوتا ہے۔

(iii) ان کے پاس سوّم بلیڈر ہوتا ہے۔

(iv) ان کے گلز اپرکولم سے ڈھکے ہوتے ہیں۔

(v) جلد پر عموماً سکیلز (scales) موجود ہوتے ہیں (ماسوائے چند مثلاً ٹراؤٹ)۔

مثالیں: ٹراؤٹ (trout)، پرچ (perch) اور ٹیونا (tuna)



2. کلاس امفی بیا Class Amphibia

(i) یہ دونوں طرح کے مساکن یعنی پانی اور خشکی پر رہتے ہیں۔

(ii) ان کی جلد میں گلیٹنڈز (glands) ہوتے ہیں اور سکیلز (scales) نہیں ہوتے۔



مینڈک

(iii) ان کے پاس ہڈیوں کا بنا سکیلیٹن ہوتا ہے۔

(iv) بالغ ممبران کے پاس پھیپھڑے ہوتے ہیں۔ نمو کے دوران ان کے پاس گلز ہوتے ہیں (چند بالغوں میں بھی گلز ساری زندگی کے لیے رہتے ہیں)۔

(v) یہ پھیپھڑوں، گلز اور جلد کے ذریعہ سانس لیتے ہیں۔

(vi) ان کے پاس ٹانگوں کے دو جوڑے ہوتے ہیں۔

(vii) یہ پانی میں تولید کرتے ہیں۔

(viii) یہ کولڈ بلڈڈ جانور ہیں۔

مثالیں: مینڈک، ٹوڈ (toad)، سلیمنڈر (salamander) اور نیوٹ (newt)

حیران کن حقیقت



مگر مچھ کی زبان اس کے منہ کی
چھت کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔

3. کلاس ریپٹیلیا Class Reptilia

(i) اس گروپ کے زیادہ تر جانور خشکی پر جبکہ چند پانی میں رہتے ہیں۔

(ii) ان کی جلد سخت ہے اور اس پر سکیلز، ڈھال یعنی سکیوٹس (scutes) اور ہڈی دار پلیٹیں ہوتی ہیں۔

(iii) ان کا سکیلیٹن ہڈیوں کا بنا ہوتا ہے۔

(iv) ان کے پاس ٹانگوں کے دو جوڑے ہوتے ہیں (سانپ میں ٹانگیں نہیں ہوتیں)۔

(v) یہ جانور انڈے دیتے ہیں جن پر سخت شیل (shell) لگا ہوتا ہے۔

(vi) ریسپریشن پھیپھڑوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔

(vii) یہ کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں۔

مثالیں: چھپکلی، سانپ، کچھوا، مگرچھ اور اے لی گیٹر (alligator)

4. کلاس اے ویز (پرندے) Class Aves

(i) ان کی جلد پر وں (feathers) سے ڈھکی ہوتی ہے۔

(ii) ان کی اگلی ٹانگیں تبدیل ہو کر ونگز (wings) بن چکی ہوتی ہیں۔


(iii) تمام پرندوں کے پاس سخت چوچ (beak) ہوتی ہے اور تمام پرندے انڈے دیتے ہیں۔

(iv) ان کی ہڈیاں کھلی ہوتی ہیں۔

(v) ان کے اندر ایئر سیکس (air sacs) ہوتے ہیں، جو سانس لینے میں پھیپھڑوں کی مدد کرتے ہیں۔

(vi) یہ وارم بلڈڈ (warm blooded) ہوتے ہیں (اپنے جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھ سکتے ہیں)۔

مثالیں: کوا، چڑیا، کبوتر، طوطا



طوطا

5. کلاس میملیا Class Mammalia

- (i) ان کی جلد پر بال ہوتے ہیں۔
- (ii) ان کی جلد میں پسینہ بنانے والے گلینڈز، سینٹ (scent) گلینڈز، سی بیٹینس (sebaceous) گلینڈز اور میمری (mammary) گلینڈز ہوتے ہیں۔
- (iii) تمام میملز کے پاس بیرونی کان اور آنکھ کا قابل حرکت پوٹا ہوتا ہے۔
- (iv) ان کے پاس میمری گلینڈز ہوتے ہیں جن سے بچے کو پلانے کے لیے دودھ نکلتا ہے۔
- (v) یہ وارم بلڈڈ ہوتے ہیں۔



بلی

مثالیں: بلی، گائے، بکری، چوہا، انسان

Kingdom Plantae کنگڈم پلانٹی

کنگڈم پلانٹی کو دو بڑے گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

1. نان-ویسکولر پودے Non-vascular Plants

- (i) ان کے اندر ویسکولر بنڈلز نہیں ہوتے۔

مثالیں: موسز (mosses)

کیا آپ جانتے ہیں؟

زرافہ خاموش ترین جانور ہے۔ اس کے پاس کوئی وکیل کارڈز نہیں ہوتے جن سے آواز پیدا کی جائے۔



موسز (Mosses)

2. ویسکولر پودے Vascular Plants

- (i) ان کے پاس ویسکولر بنڈلز یعنی زائلم اور فلوئم موجود ہوتے ہیں۔

- (ii) ان کو مزید دو گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

a- بغیر بیج کے پودے (seedless plants): ان کے پاس

ویسکولر بنڈلز تو ہوتے ہیں مگر یہ پودے اپنے لائف سائیکل

کے دوران بیج پیدا نہیں کرتے۔ ٹیرس (Pteris) اور ایڈی

انٹم (Adiantum) ان پودوں کی عام مثالیں ہیں۔

b- بیج والے پودے (seed plants): یہ پودے اپنے لائف

سائیکل میں بیج پیدا کرتے ہیں۔ بیج بنانے والے کچھ پودوں

میں پھول نہیں ہوتے اور ان کے بیج ننگے (پھل سے نہیں


ڈھکے ہوتے) ہوتے ہیں۔ بیج والے ایسے پودوں کو پھول نہ

رکھنے والے یا جنوسپرمز (gymnosperms) کہتے



ایڈی انٹم (Adiantum)

ہیں (مثلاً سائی کیس: *Cycas*، پائینس: *Pinus* وغیرہ)۔ بیج والے دوسرے پودوں میں پھول بنتے ہیں اور ان کے بیج پھلوں سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ ایسے پودوں کو پھولدار پودے یا اسٹیو سپرمز (angiosperms) کہتے ہیں (مثلاً گلاب،



پائینس (*Pinus*)


آم، گندم، براسیکا وغیرہ)۔ اسٹیو سپرمز دو طرح کے ہوتے ہیں۔ مونو کاش (monocots) کے بیج میں ایک کٹی لیڈن (cotyledon) ہوتی ہے، مثلاً لہسن، پیاز، چاول، گندم، گھاس۔ جبکہ ڈائی کاش (dicots) کے بیج میں دو کٹی لیڈنز ہوتی ہیں، مثلاً آلو، ٹماٹر، بینز (beans)، سیب، براسیکا۔



چاول (Rice)



گندم (Wheat)



پیاز (Onion)

مونو کاش (Monocots)



آلو (Potato)



سیب (Apple)

ڈائی کاش (Dicots)



سویا بینز (Soybeans)

چارٹس، فوٹو گرافس، حقیقی جانور اور پودے اور ان کے محفوظ نمونے، ہینڈ لینز (hand lens)



	C
	D
	E
	F




سوچے

- ☆ جانداروں کی گروہ بندی کرنے کا ایک اور ممکن طریقہ انہیں یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر میں تقسیم کر دینا ہے۔ وضاحت کریں کہ کلاسیفیکیشن کا یہ سسٹم اتنا کارآمد کیوں نہیں ہے۔
- ☆ ایف بی ایس میں پیٹ کے ویسٹرل مسلز مچھلیوں کی نسبت زیادہ طاقتور کیوں ہوتے ہیں؟



1- پرندوں میں اڑنے کے لیے کیا موافقتیں پائی جاتی ہیں؟



2- مچھلیوں، ایف بی ایس، ریپٹائلز، پرندوں اور میملز میں کس قسم کا سکیلپٹن پایا جاتا ہے؟

3- اپنے ارد گرد موجود کوئی سے دو بغیر پھولوں والے اور پھولدار پودوں کی نشان دہی کریں۔

4- ورٹبرٹس کے گروپس کے مابین فرق دکھانے کے لیے ایک ٹیبل بنائیں۔

Web Version of PCTB Textbook

حشرات کی ایک پاپولیشن کا گراف بنانا اور ان کا تجزیہ کرنا

(حشرات گش ادویات: insecticides کے زیادہ استعمال کی وجہ سے حشرہ اینڈینجرڈ: endangered ہے)

اور ان کے اینڈینجرڈ ہونے کی وجوہات کی وضاحت کرنا



تاریخ:

حشرات گش ادویات نقصان دہ حشرات یعنی پستس (pests) کی پسی شیز کے ساتھ ساتھ فائدہ مند حشرات کو بھی مارتی ہیں۔ اینڈینجرڈ پسی شیز سے مراد جانداروں کی ایسی پاپولیشن ہے جس کو مستقبل قریب میں ہی ناپید (ایکسٹنٹ: extinct) ہو جانے کا خطرہ ہو۔




سائنسی طریقہ کار (scientific method) میں اعداد و شمار (data) اکٹھے کر کے ٹیبلز (tables) کی شکل میں ترتیب دیے جاتے ہیں۔ ان اعداد و شمار کو گراف بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سائنسدان ان سے نتائج اخذ کر سکیں۔



1- درج ذیل اعداد و شمار کی مدد سے گراف بنائیں، جس سے حشرات گش کی مقدار اور حشرات کی تعداد ظاہر ہو۔

حشرات گش ادویات کے چھڑکاؤ کا سال	حشرات گش ادویات کی مقدار (مائیکروگرام فی مربع میٹر)	حشرات (تملیاں) کی تعداد فی مربع میٹر
1999	200	150
2000	220	120
2001	250	100
2002	260	90
2003	280	85
2004	310	70
2005	325	65
2006	330	60
2007	365	45
2008	375	40
2009	390	20
2010	410	10

گراف



☆ اس گراف سے کیا نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں؟

.....

.....

.....



1- حشرات گش ادویات کا زیادہ استعمال انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟

.....

.....

2- ایسے مزید عوامل کی فہرست بنائیں جو حشرات کے اینڈینجرڈ ہونے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔

.....

.....

3- کیا ہمیں حشرات گش ادویات کا چھڑکاؤ جاری رکھنا چاہیے یا اسے ختم کر دینا چاہیے؟

.....

.....



سوچئے



جو حشرات زمین پر رہتے ہیں ان کے جسم کی سطح پروٹیکس (wax) کا ایک غلاف ہوتا ہے۔ ان جانوروں کے لیے ویکس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟

سیلز اور ٹشوز



چھوٹی اشیاء کی حرکت کے مشاہدہ کے لیے مائیکروسکوپ کا استعمال

تاریخ:

مائیکروسکوپ ایک ایسا آلہ ہے جسے چھوٹی اشیاء کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔



تالاب کا پانی، گلاس سلائڈز، مائیکروسکوپ، ڈراپر، سیاہی پوس کاغذ (بلاٹنگ پیپر)



احتیاطیں



- ☆ سلائڈز کو احتیاط کے ساتھ پکڑیں۔
- ☆ مشاہدہ سے پہلے سلائڈز اور مائیکروسکوپ کے آئینے اور آئینے کو صاف کریں۔

1- گلاس سلائڈ پر پانی کا ایک قطرہ ڈالیں اور کورسپ رکھے بغیر، مائیکروسکوپ کے نیچے اس کا مشاہدہ کریں۔

-1



☆ ان جانداروں کی ڈایا گرامز بنائیں جنہیں آپ نے مائیکروسکوپ کے نیچے دیکھا۔





.....

.....

.....

.....


.....

1- کیا تمام جاندار ایک ہی طریقہ سے حرکت کرتے ہیں؟

.....

2- عموماً جانور حرکت کرتے ہیں لیکن عموماً پودے حرکت نہیں کرتے۔ کیا آپ ایسے چند جانوروں کے نام بتا سکتے ہیں جو حرکت نہیں کرتے؟

.....



Web Version of PCTB Textbook

جانور کے سیل (مثلاً مینڈک کے خون سے) اور پودے کے سیل (مثلاً پیاز کی اپی۔
ڈر مس سے) کا خرد بینی مشاہدہ




تاریخ:

ایک سیل عموماً سیل ممبرین، سائٹوپلازم اور نیوکلیئس پر مشتمل ہوتا ہے۔ سیلز کی اشکال اور جسامتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ریڈ بلڈ سیلز گول اور دونوں جانب سے محدب (biconvex) ہوتے ہیں۔ ان میں نیوکلیئس بھی پایا جاتا ہے (میسلز کے ریڈ بلڈ سیلز میں نیوکلیئس نہیں پایا جاتا)۔ جانور کے سیل کے برعکس، پودے کے سیل پر سیل وال موجود ہوتی ہے اور اس میں ایک بڑا ویکول اور پلاسٹڈز پائے جاتے ہیں۔



شکل 4.2.1: مینڈک کے خون کے سیلز



شکل 4.2.2: پیاز کی اپی ڈر مس، جیسی کہ مائیکروسکوپ کے نیچے دکھائی دیتی ہے

حصہ اول: جانور کے سیل کا مطالعہ

مینڈک، مائیکروسکوپ، گلاس سلائیڈز، کورسلیپس، ڈراپر، جار، میتھلین بلیو (methylene blue)،
ایتھائل الکحل (ethyl alcohol)، ڈائی سیلینگ باکس، کاٹن کے ٹکڑے، سپرٹ، سرنج



احتیاطیں

- ☆ کیمیکلز کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔
- ☆ مشاہدہ سے پہلے سلائڈ اور مائیکروسکوپ کے آکولر لینز اور آنٹیکو کو صاف کریں۔

1- مینڈک کے خون کا سمیر (smear) تیار کریں۔ اس مقصد کے لیے:

- ☆ مینڈک کے خون کا ایک چھوٹا سا قطرہ ایک صاف گلاس سلائڈ پر رکھیں۔
- ☆ دوسری سلائڈ کا کنارہ خون کے قطرہ پر 45 ڈگری پر رکھیں۔ خون کا قطرہ دوسری سلائڈ کے کنارے کے ساتھ پھیل جائے گا۔

☆ دوسری سلائڈ کو پہلی سلائڈ کی مخالف سمت میں ایک ہموار طریقہ سے

اس طرح کھینچیں کہ خون کا قطرہ سلائڈ پر پھیل جائے گا۔


اس طرح ایک باریک سمیر بن جائے گی۔

2- خون کے سمیر کو ہوا میں خشک کریں۔

3- سلائڈ کو خالص الکحل میں ڈبوئیں تاکہ سمیر فکس (fix) ہو جائے۔

4- سمیر پر میٹھلین بلیوشین (stain) کے چند قطرے ڈالیں اور اسے

3 سے 4 منٹ تک رکھیں۔



شکل 3، 2، 4: خون کا سمیر بنانے کا طریقہ



سوچیے

- ☆ سلائڈ پر کورسپ رکھنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟
- ☆ جسم سے نکالنے کے فوراً بعد خون میں اینٹی کو-یکولنٹ (anti-coagulant) کیوں کس کیا جاتا ہے؟

5- ڈسٹلڈ پانی کے چند قطرے سٹین پر ڈالیں اور سلائڈ کو آہستہ آہستہ

ہلائیں تاکہ پانی مکمل طور پر سٹین میں کس ہو جائے۔ پھر اسے 10

منٹ تک رکھیں۔

6- سلائڈ کو پانی کی ہلکی دھار کے نیچے دھوئیں۔

7- اضافی مائع کو بلائنگ پیپر کی مدد سے نکال لیں اور سلائڈ کو ہوا میں خشک کریں۔

8- اب سلائڈ کو مائیکروسکوپ کی کم اور زیادہ پاورز میں دیکھیں۔

☆ جو کچھ بھی آپ مائیکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں، اس کی ڈایا گرام بنائیں اور لیبل کریں۔





حصہ دوم: پودے کے سیل کا مطالعہ

مائیکروسکوپ، گلاس سلائیڈز، فورسپس، کورسپلس، ریزر بلیڈ (razor blade)، چھوٹا چاقو (scalpel)،

سوئی، ڈراپر، ڈائلیوٹ آئیوڈین یا میتھلین بلیو، پیاز، بلائنگ پیپر، واچ گلاس (watch glass)

احتیاطیں




☆ سوئی کی مدد سے تختیوں کا لیں۔

☆ کورسپ کو آہستہ آہستہ رکھنا

چاہیے تاکہ اس کے نیچے ہوا

کے بلبل نہ آئیں۔



شکل 4.2.4: پیاز کی اپنی ڈمس کی سلائیڈ

بنانے کا طریقہ


- 1- ایک پیاز کو عموداً چار ٹکڑوں میں کاٹیں۔
- 2- ٹیکسل لیف (scale leaf) کو ایک ہاتھ کی انگلی اور دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس طرح پکڑیں کہ اس کی کٹھن (concave) سائیڈ آپ کی جانب ہو۔
- 3- انگلیوں یا فورسپس کی مدد سے سکیل لیف کی اندرونی سطح سے باریک شفاف ممبرین یعنی اپنی ڈمس آہستہ آہستہ چھیل کر علیحدہ کریں۔
- 4- اپنی ڈمس کو پانی والے ایک واچ گلاس میں رکھیں اور اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا کاٹیں۔
- 5- ایک صاف گلاس سلائیڈ کے درمیان پانی کا ایک قطرہ رکھیں اور پھر اس پر اپنی ڈمس کا ٹکڑا رکھ دیں۔
- 6- سوئی کی مدد سے اس ممبریل کو اس طرح پھیلائیں کہ اس کی پر تہیں دھری نہ ہوں۔
- 7- ممبریل کو کورسپ سے ڈھانپ دیں اور کورسپ کے اطراف میں موجود زائد پانی کو بلائنگ پیپر سے نکالیں۔
- 8- مائیکروسکوپ کے نیچے سلائیڈ کا مشاہدہ کریں۔
- 9- کورسپ کے ایک طرف ڈائلیوٹ آئیوڈین (یا میتھلین بلیو) کا ایک قطرہ رکھیں اور کورسپ کے دوسری طرف بلائنگ پیپر رکھ دیں۔
- 10- سلائیڈ کا مشاہدہ پہلے مائیکروسکوپ کی کم پاور اور پھر زیادہ پاور میں کریں۔

☆ جو کچھ بھی آپ مائیکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں، اس کی ڈایا گرام بنائیں اور لیبل کریں۔



1- ان دونوں نمونوں کا موازنہ کریں جو آپ نے مائیکروسکوپ کے نیچے دیکھے۔



-1



2- ریڈ بلڈ سیل اور جانور کے ایک عام سیل میں دو فرق بیان کریں۔

-2

تیار کیے گئے نمونوں (fresh preparations) سے سیل کے مختلف حصوں کی شناخت



گال کے سیلز

پودے کے سیل میں سیل وال، پلاسٹڈز اور ایک بڑا مرکزی ویکول ہوتا ہے اور یہ ساختیں جانور کے سیل میں نہیں ہوتیں۔



احتیاطیں


- ☆ گال کے سیلز نیچر کی نگرانی میں لیں۔
- ☆ سیلز لینے کی خاطر اپنی جلد کے کسی اور حصے کو مت نہ لیں۔

1- پودے کے سیل کا مطالعہ

☆ تجربہ 4.2 میں بیان کیے گئے طریقے کے مطابق پیاز کی اپنی ڈرمس کی سلائڈ چٹائیں اور مائیکروسکوپ کے نیچے اس کا مشاہدہ کریں۔

2- جانور کے سیل کا مطالعہ

- i گلاس سلائڈ پر پانی کا ایک قطرہ ڈالیں۔
- ii ٹوتھ پک کا گند کنارہ استعمال کر کے اپنی گال کی اندرونی دیوار کو آہستہ آہستہ گھر چھیں۔
- iii اس میٹیریل کو سلائڈ پر موجود پانی کے قطرے میں مکس کر دیں۔
- iv میٹیریل پر احتیاط کے ساتھ کورسلپ رکھیں (ہوا کے بلبلے آنے سے بچائیں)۔
- v کورسلپ کے ایک کنارے پر میتھلین بلیو کا ایک قطرہ ڈالیں۔ کورسلپ کے دوسرے کنارے کو بلائیٹک پیپر کے ایک ٹکڑے کے ساتھ چھوئیں۔ اس سے سین میٹیریل کے اوپر پھیل جائے گا اور زائد پانی بھی نکل جائے گا۔
- vi سلائڈ کو مائیکروسکوپ کی کم اور زیادہ پاورز میں دیکھیں۔



فصل 4.3.1: گال کے سیلز لینا اور ان کی سلائڈ بنانا

☆ پیاز کی اہی ڈرس اور انسانی گال کی اہی تھلیم کی سلائڈز میں آپ نے جو کچھ دیکھا، اس کی ڈیاگرامز بنائیں۔



☆ مائیکروسکوپ کے نیچے دکھائی دینے والے پودے اور جانور کے سیلز کی ڈیاگرامز بنائیں اور لیبل کریں۔



1- ایک آرگنلہ کی غیر موجودگی کی وجہ سے جانور ہیٹروٹرافس ہوتے ہیں۔ یہ کون سا آرگنلہ ہے؟

.....

2- جانوروں میں سب سے بڑا سیل کون سا ہوتا ہے؟

.....

.....





پھول دار پودوں کے ٹشوز کے خرد بینی نمونوں (wet mounts) کی تیاری، اور چارٹس اور تیار شدہ سلائیڈز سے پودے اور جانور کے ٹشوز کا مطالعہ



تاریخ:

حصہ اول: پھول دار پودوں کے ٹشوز کے خرد بینی نمونوں کی تیاری
ایک جیسے سلائیڈ پر ایک ٹشویا تے ہیں۔ ڈائی کوٹ تار اور ڈائی کوٹ جڑ اپنی ڈرمل ٹشو، گراؤنڈ ٹشو اور ویکسولر ٹشو پر مشتمل ہوتے ہیں۔



شکل 4.4.1: ڈائی کاٹ تار اور ڈائی کاٹ جڑ کی اعمدہ کی ساخت

مائیکروسکوپ، گلاس سلائیڈ، کورسلپ، فورسپس، ڈائی کاٹ (براسیکا) کا تار اور جڑ، پیٹری ڈش، کشید شدہ پانی، تیز بلینڈ، آئیوڈین سولیوشن، بلائنگ پیپر، ٹشو پیپر



احتیاطیں!

☆ سلائیڈ کی تیاری کے لیے باریک تراشی منتخب کریں۔
☆ تراشے کو کورسلپ سے ڈھانپتے وقت احتیاطاً برقی اور ہوا کے بلبلوں سے بچائیں۔
☆ سلائیڈ میں سے زائد شین بلائنگ پیپر کی مدد سے نکال دیں۔

- 1- گلاس سلائیڈ پر پانی کا ایک قطرہ ڈالیں۔
- 2- تیز بلینڈ کی مدد سے پھول دار پودے کی جڑ کا باریک عرضی تراشہ کاٹیں۔
- 3- اس تراشے کو سلائیڈ پر رکھیں اور اس پر آئیوڈین سولیوشن کے دو قطرے ڈال دیں۔
- 4- میٹیریل کو کورسلپ سے ڈھانپ دیں اور سلائیڈ کو پہلے مائیکروسکوپ کی کم اور پھر زیادہ پاور میں دیکھیں۔
- 5- اسی طریقہ کو دہراتے ہوئے تار کے تراشے کی سلائیڈ تیار کریں۔



☆ تنے میں ٹشوز کی ترتیب دکھانے کے لیے ڈایا گرام بنائیں۔



☆ جڑ میں ٹشوز کی ترتیب دکھانے کے لیے ڈایا گرام بنائیں۔

Web Version of PCTB Textbook

1- ان دونوں تراشوں میں فرق بیان کریں۔



.....

.....

.....

.....

.....

حصہ دوم: چارٹس اور تیار شدہ سلائڈز سے پودے اور جانور کے ٹشوز کا مطالعہ

جانور اور پودے کے ٹشوز کے چارٹس اور تیار شدہ سلائڈز



1- جانور اور پودے کے ٹشوز کے چارٹس اور تیار شدہ سلائڈز کا مشاہدہ کریں۔

جانور کے ٹشوز



اہم خصوصیات	ڈایا گرام	عمومہ
		کٹیکلوٹشو
		مسکولرٹشو
		نروسٹشو
		اپنی تھیلیل ٹشو

پودے کے ٹشوز


نمونہ	ڈایا گرام	اہم خصوصیات
اپنی ڈرل ٹشو		
سپورٹنگ ٹشو		
ویسکولر ٹشو		
میری سٹیمیک ٹشو		

☆ دیکھئے گئے تمام ٹشوز کے سیلز کی خصوصیات اور ان کے افعال لکھیں۔



1- جانوروں میں تین طرح کے مسکولرٹشوز کون سے ہوتے ہیں؟

-1



2- جانوروں کے ایسے تین ٹشوز کے نام بتائیں جو انفعال کے لحاظ سے پودوں کے اپی ڈرمل ٹشو، سپورٹ ٹشو اور ویسکولر ٹشو کے مساوی ہیں۔

-2

Web Version of PCTB Textbook

پودے کے سیلز یا بلڈ سیلز میں پلازمولائسز (plasmolysis) اور ڈی پلازمولائسز (deplasmolysis) پر ٹائیسٹی (tonicity) کے اثر کا تعین




4.5

تاریخ:



ٹائیسٹی وہ اصطلاح ہے جو کسی سولیوشن کے 'ارتکاز' کی وضاحت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر ایک سولیوشن موازنہ کیے جانے والے دوسرے سولیوشن سے زیادہ مرکب ہو تو اسے ہائپرٹانک (hypertonic) کہتے ہیں۔ ہائپرٹانک (hypotonic) سولیوشن دوسرے سے کم مرکب ہوتا ہے۔ ایسے دو سولیوشنز جن کا ارتکاز ایک جیسا ہو، آئسوٹانک (isotonic) کہلاتے ہیں۔ جب ایک سیل کو ہائپرٹانک (کنسنٹر ایٹڈ) سولیوشن میں رکھا جائے تو سیل میں سے پانی باہر آتا ہے یعنی پانی کی ایکس-اوسموس (exomosis) ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں سیل سکڑ جاتا ہے اور اس مظہر کو پلازمولائسز کہتے ہیں۔ اگر ایک پلازمولائسز ہوا سیل ہائپرٹانک (ڈائلوٹڈ) سولیوشن میں رکھا جائے، مثلاً کشید شدہ (distilled) پانی، تو گرد و پیش سے پانی سیل میں داخل ہوتا ہے اور سیل اپنی ابتدائی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس مظہر کو ڈی-پلازمولائسز کہتے ہیں۔ ایک آئسوٹانک سولیوشن میں سیل کے اندر پانی داخل ہونے کی شرح، اس میں سے پانی باہر نکلنے کی شرح کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے سیل کی شکل اور جسامت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔



شکل 4.5.1: پلازمولائسز اور ڈی-پلازمولائسز

مائیکروسکوپ، گلاس سلائیڈ، کورسپ، فورسپس، ٹشو پیپر / فلٹر پیپر، 1% اور 4% شوگر سولیوشنز، کشید شدہ پانی



احتیاطیں!

☆ مخصوص جسامت کے پیاز

ہی منتخب کریں۔

☆ تراشے کو کورسپ سے

ڈھانچتے وقت احتیاط برتیں

☆ اور ہوا کے بلبوں سے بچائیں۔

☆ سولیوشنز کے مختلف ارتکازوں

کے لیے ایک ہی ڈراپرٹ

استعمال کریں۔

1- ایک پیاز کو عموداً چار ٹکڑوں میں کاٹیں۔

2- سکیل لیف (scale leaf) کو ایک ہاتھ کی انگلی اور دوسرے ہاتھ کے

انگوٹھے سے اس طرح پکڑیں کہ اس کی کنکریو سائیڈ آپ کی جانب ہو۔

3- انگلیوں یا فورسپس کی مدد سے سکیل لیو کی اندرونی سطح سے باریک

شفاف ممبرین یعنی اپی ڈرمس کو آہستہ آہستہ چھیل کر علیحدہ کریں۔



- 4- اپی ڈرس کے دو ٹکڑے (برابر جسامت کے) ایک صاف سلائڈ پر رکھیں اور سیلز کی جسامت دیکھنے کے لیے مائیکروسکوپ استعمال کریں۔ سیلز کی اشکال اور جسامتوں کی ڈایا گرامز بنائیں۔
- 5- اپی ڈرس کے ایک ٹکڑے کو پیٹری ڈش A میں رکھیں، جس میں 1% شوگر سولوشن موجود ہے۔ دوسرے ٹکڑے کو پیٹری ڈش B میں رکھیں، جس میں 4% شوگر سولوشن موجود ہے۔ پیٹری ڈشز کو 15 منٹ کے لیے رکھیں۔
- 6- اپی ڈرس کے ٹکڑوں کو پیٹری ڈشز سے نکال کر سلائڈز پر انہی سولوشنز کے قطروں کے ساتھ رکھیں۔
- 7- سلائڈز پر کورسپلس رکھیں اور مائیکروسکوپ کے نیچے ان کا مشاہدہ کریں۔
- 8- اپنے مشاہدات (سیلز کی اشکال اور جسامتوں کے متعلق) کو ریکارڈ کریں۔
- 9- اپی ڈرس کے اس ٹکڑے پر کشید شدہ پانی ڈالیں جو پہلے پیٹری ڈش B میں رکھا گیا تھا۔ اس ٹکڑے کو بھی مائیکروسکوپ کے نیچے دیکھیں۔

☆ پیاز کی اپی ڈرس کے سیلز میں دکھائی دینے والی تبدیلیوں کو ریکارڈ کریں۔



کشیڈ شدہ پانی (4% شوگر سولوشن میں رکھنے کے بعد)	4% شوگر سولوشن	1% شوگر سولوشن	سیلز میں ہونے والی تبدیلیاں


☆ اپنے مشاہدات کی ڈایا گرامز بنائیں۔

1% شوگر سولوشن میں رکھی گئی اپی ڈرس	4% شوگر سولوشن میں رکھی گئی اپی ڈرس	4% شوگر سولوشن اور پھر کشید شدہ پانی میں رکھی گئی اپی ڈرس
-------------------------------------	-------------------------------------	---



Blank lined area for writing results.

1- اگر ہم ایک مرتکز گلوکوز سولوشن میں ریڈ بلڈ سیلز رکھیں تو کیا ہوگا؟



Blank lined area for writing the answer to question 1.

2- بارشوں کے موسم میں بچے کینچوے (earthworm) پر نمک چھڑکتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے۔ نمک زہریلا نہیں ہوتا (ہم اسے روزانہ استعمال کرتے ہیں)۔ وضاحت کریں کہ کینچوے کیوں مر جاتا ہے۔


Blank lined area for writing the answer to question 2.

نہی کی مختلف مقداروں والے علاقوں میں اُگنے والے پودوں کے پتوں میں فی اکائی
رقبہ (unit area) سٹومیٹا کی تعداد کا ڈیٹا (data) اکٹھا کرنا اور متغیرات (variables)
کے درمیان تعلق کا تعین کرنا اور گراف بنانا



تاریخ:

پتوں کی بالائی اور زیریں اپنی ڈرس میں بے شمار سوراخ ہوتے ہیں جنہیں سٹومیٹا کہتے ہیں۔ سٹومیٹا کے ذریعہ پتوں اور
ماحول کے درمیان گیسوں (کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن) اور پانی کے بخارات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ تبادلہ فوٹو سنتھی
میں ریسیپیشن اور ٹرانسپائریشن کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر سٹوما (stoma) کے گرد گارڈ سیلز کا ایک جوڑا ہوتا ہے۔ مختلف
مساکن کے پودوں میں سٹومیٹا کی تعداد (پتوں کے فی اکائی رقبہ) مختلف ہوتی ہے۔



شکل 4.6.1: ایک میزوفائٹ (mesophyte) کے پتے میں سٹومیٹا

مختلف پودوں (میزوفائٹ، ہائیڈروفائٹ، زیروقائٹ) کے پتے، مائیکروسکوپ، گلاس سلائیڈ، کورسلپ، فورسپس



احتیاطیں



☆ اپنی ڈرس ہموار ہونی چاہیے۔ اس
میں تھیں نہیں لگی ہونی چاہئیں۔

- 1- میزوفائٹ پودے کا ایک پتہ لیں اور اس کے لمبے (lamina) کوٹم
دیں حتیٰ کہ یہ ٹوٹ جائے۔
- 2- ٹوٹے ہوئے کنارے کو فورسپس سے پکڑیں اور زیریں اپنی ڈرس کو
چھیلیں۔
- 3- گلاس سلائیڈ پر پانی کا ایک قطرہ ڈالیں۔
- 4- اپنی ڈرس کو سلائیڈ پر موجود پانی کے قطرے میں رکھیں۔



- 5 اپنی ڈرس پر کورسلپس رکھیں (ہوا کے بلبلے بننے سے بچائیں) اور زائد پانی کو نکال دیں۔
- 6 سلائڈ کا مشاہدہ مائیکروسکوپ کی کم پاور میں کریں اور سٹومیٹا کی تعداد معلوم کریں۔
- 7 ہائیڈروفائٹ (hydrophyte) اور زیروفائٹ (xerophyte) کے پتوں کے ساتھ بھی تجربہ دوہرائیں۔

پودے کی قسم	مائیکروسکوپ کی ایک ہی پاور میں دکھائی دینے والے سٹومیٹا کی تعداد
1 ہائیڈروفائٹ	
2 میزوفائٹ	
3 زیروفائٹ	




مشاہدہ کریں اور بتائیں

کیا تمام سٹومیٹا / گارڈ سیلز کی اشکال اور جسامتیں ایک جیسی ہیں یا مختلف ہیں؟

☆ سٹومیٹا کی تعداد اور پودوں کے مساکن کے درمیان تعلق دکھانے کے لیے گراف بنائیں۔

گراف




☆ گراف سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ نمی اور سٹومیٹا کی تعداد کے درمیان کس طرح کا تعلق ہوتا ہے؟



کون سے اعمال میں سٹومیٹا اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟

-1



.....

.....

.....

.....

.....

2- ایک پودا سڑک کے کنارے اُگا ہوا ہے اور اس کے پتوں پر گرد پڑی ہوئی ہے۔ فوٹو سنتھی سیز کی رفتار پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ وضاحت کریں۔

-2

.....

.....

.....

.....

3- کون سے دوسرے عوامل سٹومیٹا کی تعداد کا تعین کرتے ہیں؟

-3

.....

.....

.....

.....

.....

4- زیریں اپی ڈرمس کی بجائے اگر ہم بالائی اپی ڈرمس استعمال کریں تو نتائج کیا ہوں گے اور کیوں؟

-4

.....

.....

.....

.....

سوچیے



☆ پتے کے اندر موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ارتکاز میں تبدیلیوں کے رد عمل میں سٹومیٹا کھل سکتے ہیں اور بند ہو سکتے ہیں۔

جب کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ارتکاز کم ہوتا ہے تو آیا سٹومیٹا کھلتے ہیں یا بند ہوتے ہیں؟

☆ کیا آپ کو پیاز کے چھلکے میں سٹومیٹا دکھائی دیں گے؟ کیوں؟

سیل سائیکل



سلائیدز، ماڈلز اور چارٹس کے ذریعہ مائی ٹوس اور می اوس کے مختلف مراحل کا مشاہدہ

تاریخ:

حصہ اول: مائی ٹوس کا مطالعہ

مائی ٹوس ایسی سیل ڈویژن ہے جس میں بننے والے ڈائریکٹرز (daughter cells) میں کروموسومز کی تعداد اتنی ہی رہتی ہے جتنی کہ آبائی سیل میں ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جس میں ہونے والے واقعات کا سلسلہ دو بڑے مراحل میں تقسیم ہوا ہوتا ہے: کیریو کائی میسز (karyokinesis) میں نیوکلئس جبکہ سائٹو کائی میسز (cytokinesis) میں سائٹوپلازم تقسیم ہوتا ہے۔ کیریو کائی میسز کو مزید چار مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے یعنی پروفیز، میتافیز، اینافیز اور ٹیلوفیز۔



شکل 5.1.1: مائی ٹوس کے مختلف مراحل

احتیاطیں

- ☆ سلائیدز کو احتیاط کے ساتھ پکڑیں۔
- ☆ مشاہدہ سے پہلے سلائیدز اور مائیکروسکوپ کے آکلر لینز اور آئینکلو کو صاف کریں۔

مائی ٹوس کے ماڈلز، چارٹس اور تیار شدہ سلائیدز، مائیکروسکوپ



- 1- مائیکروسکوپ کے نیچے سیل ڈویژن (مائی ٹوس) کے مختلف مراحل کی تیار شدہ سلائیدز کا مشاہدہ کریں۔
- 2- مائیکروسکوپ کے نیچے آپ جو بھی دیکھتے ہیں، اس کی ڈایا گرام بنائیں۔
- 3- چارٹس اور ماڈلز کے ساتھ سلائیدز کا موازنہ کریں۔

سوچیں

کس قسم کے سیل میں مائی ٹوس ہوتی ہے؟

☆ سلائیڈز کے مشاہدہ کے بعد یہ ٹیبل مکمل کریں۔



سلائیڈ	ہر مرحلہ کی خصوصیات	ڈایا گرام

☆ چارٹس اور ماڈلز سے سلائیڈز کا موازنہ کریں اور کروموسومز کے مقام کی بنیاد پر مائی ٹوسس کے مراحل کی شناخت کریں۔




سلائیڈ / چارٹ / ماڈل	کروموسوم کا مقام	مائی ٹوسس کا مرحلہ



حصہ دوم: می اوسس کا مطالعہ

می اوسس میں ایک ڈیپلائیڈ (diploid) سیل تقسیم ہو کر چار ہپلائیڈ (haploid) ڈائریکٹریٹا بناتا ہے۔ می اوسس میں دو سب-ڈویژن (sub-divisions) ہوتی ہیں یعنی می اوسس I اور می اوسس II۔ ہر سب-ڈویژن مزید مراحل یعنی پروئیٹیر، میٹافیز، اینٹافیز اور ٹیلوفیز پر مشتمل ہوتی ہے۔



شکل 5.1.2: می اوسس کے مختلف مراحل

می اوسس کے ماڈلز، چارٹس اور تیار شدہ سلائیڈز، مائیکروسکوپ



- 1- مائیکروسکوپ کے نیچے سیل ڈویژن (می اوسس) کے مختلف مراحل کی تیار شدہ سلائیڈز کا مشاہدہ کریں۔
- 2- مائیکروسکوپ کے نیچے آپ جو بھی دیکھتے ہیں، اس کی ڈایا گرام بنائیں۔
- 3- چارٹس اور ماڈلز کے ساتھ سلائیڈز کا موازنہ کریں۔

سوچئے

- ☆ می اوسس کو جنسی تقسیم یعنی ریڈکشن ڈویژن کیوں کہتے ہیں؟
- ☆ خواتین، مردوں اور پودوں کے اجسام میں می اوسس کہاں ہوتی ہے؟

☆ سلائیڈز کے مشاہدہ کے بعد درج ذیل ٹیبل مکمل کریں۔



سلائیڈ	ہر مرحلہ کی خصوصیات	ڈایا گرام

Web Version of PCTB Textbook

☆ چارٹس اور ماڈلز سے سلائیڈز کا موازنہ کریں اور کروموسومز کے مقام کی بنیاد پر می اوسس کے مراحل کی شناخت کریں۔




سلائیڈ / چارٹ / ماڈل	کروموسوم کا مقام	می اوسس کا مرحلہ

1- اگر تخفیفی تقسیم نہ ہو تو کیا نتائج ہوں گے؟

.....

.....



2- زخموں کے مُندل ہونے کے دوران کون سی سیل ڈویژن ہوتی ہے؟

.....

.....

سوچیے



☆ اگر ایک سیل اپنے سیل سائیکل کے دوران G1 مرحلہ سے نہ گزرے، تو اسے کیا ہوگا؟ واضح کریں۔


☆ کینسر کی وجوہات اور علاج پر ہونے والی تحقیق کا مرکز سیل سائیکل کو کنٹرول کرنے والے جینز ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟

جڑ کے سروں کو مسل کر یعنی سکواشز (squashes) بنا کر مائی ٹوسس کے مراحل کا مطالعہ



تاریخ:

جاندار میں سیلز کی تعداد میں اضافہ مائی ٹوسس سے ہوتا ہے اور یہ مٹی سیلولر جانداروں میں نشوونما کی بنیاد ہے۔ پودوں کی جڑوں میں بڑھوتری (گروتھ) جاری رہتی ہے۔ جڑوں کے سرے مائی ٹوسس کے مراحل کے مطالعہ کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔



مائیکروسکوپ، سلائڈز، جڑوں کے سرے (ٹیچر مہیا کریں گے)، ڈائی سیکنگ نیڈل، اوسٹو اور سین (oceto-orcin)، ٹشو پیپر



احتیاطیں

☆ سلائڈز پر بہت زیادہ میپیریل مت رکھیں۔

1- آہستہ سے جڑ کے سرے کو ایک صاف سلائڈ پر رکھیں

جس میں پانی کا قطرہ موجود ہو۔

2- اسے ایک نرم ٹشو پیپر کے ٹکڑے سے خشک کریں۔ ممکن حد

تک پانی نکال دینا بہت اہم ہے۔

3- ڈائی سیکنگ نیڈل استعمال کر کے، جڑ کے سرے کو کاٹیں اور اسے سلائڈ پر پھیلا دیں۔

4- اوسٹو اور سین شین کا ایک قطرہ میپیریل پر ڈالیں اور تین منٹ تک رکھیں

5- فلٹر پیپر سے زائد شین نکال دیں۔

6- ہوا کے بلبلے بچاتے ہوئے آہستہ سے میپیریل پر کورسپ رکھیں۔

7- سلائڈ کا مشاہدہ مائیکروسکوپ کی کم اور زیادہ پاورز میں کریں۔



☆ سلائیڈ کے مشاہدہ کے بعد درج ذیل ٹیبل مکمل کریں۔



سلائیڈ	ہر مرحلہ کی خصوصیات	ڈایا گرام

Web Version of PCTB Textbook



1- مائی ٹوسس کے مطالعہ کے لیے جڑوں کے سروں کے علاوہ پودے کا اور کون سا حصہ استعمال کیا جاسکتا ہے؟

.....

.....

.....



2- کیا انسانی جسم کے تمام سیلز مائی ٹوسس کرتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

.....

.....

.....

.....

Web Version of PCTB Textbook

اینزائمز



ایک اینزائم کا ان-وٹرو (in vitro) فعل دکھانا؛ مثلاً ٹیسٹ ٹیوب
میں گوشت / ایلبو من (albumin) پر پیپسن (pepsin) کا فعل دکھانا

تاریخ:.....



کیا آپ جانتے ہیں؟

ایک سیل میں ہزاروں اینزائمز پائے جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا اپنا ایک مخصوص کام ہوتا ہے۔

اینزائمز جانداروں کے اندر پائے جاتے ہیں اور مخصوص بائیو کیمیکل ری ایکشنز کی رفتار بڑھاتے ہیں۔ پیپسن ایک اینزائم ہے، جو زیادہ تر جانوروں کے معدہ میں خارج ہوتا ہے اور پروٹینز کو توڑنے میں مدد دیتا ہے۔ تمام بائیو کیمیکل ری ایکشنز جسم کے اندر یعنی ان-ویوو (in vivo) ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ری ایکشنز جسم سے باہر یعنی ان-وٹرو بھی ممکن ہوتے ہیں، مثلاً لیبارٹری میں۔



ٹیسٹ ٹیوب، پیپٹ (pipette)، پیکر، ٹرائی پوڈ سٹینڈ (tripod stand)، بنسن برنر (bunsen burner)، گوشت کے ٹکڑے یا ایلبو من، پیپسن سولوشن، 10% ہائیڈروکلورک ایسڈ، بائی یورٹ سولوشن (Biuret solution)، واٹر باٹھ (water bath)



احتیاطیں



☆ کیمیکلز کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔
☆ پیپسن سولوشن یا کسی اور کیمیکل کا ذائقہ چکھنے کی کوشش مت کریں۔

- 1- چار ٹیسٹ ٹیوبز ایس اور ان پر A، B، C اور D لکھیں۔
- 2- ہر ٹیسٹ ٹیوب میں گوشت کے برابر ٹکڑے یا ایلبو من ڈالیں۔
- 3- ٹیسٹ ٹیوب A میں 2 ملی لیٹر ہائیڈروکلورک ایسڈ ڈالیں۔
- 4- ٹیسٹ ٹیوب B میں 2 ملی لیٹر پیپسن سولوشن ڈالیں۔



- 5- ٹیسٹ ٹیوب C میں 2 ملی لیٹر ہائیڈروکلورک ایسڈ اور 2 ملی لیٹر پپسن سولوشن ڈالیں۔
- 6- ٹیسٹ ٹیوب D میں 2 ملی لیٹر ہائیڈروکلورک ایسڈ اور مہیا کردہ 2 ملی لیٹر ابلا ہوا پپسن سولوشن ڈالیں۔
- 7- ٹیسٹ ٹیوبز کو واٹر باتھ میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھ دیں۔
- 8- ہر ٹیسٹ ٹیوب میں بائی پورٹ سولوشن کے تین قطرے ڈالیں اور رونما ہونے والی تبدیلی کا مشاہدہ کریں۔ ارغوانی یا گلابی رنگ پروٹینز کی موجودگی ظاہر کرتا ہے۔

ٹیسٹ ٹیوب	تبدیلی	پروٹین موجود ہے یا نہیں
A		
B		
C		
D		



1- ایسے چند ان-ویو بائیو کیمیکل ری ایکشنز کے نام بتائیں (ڈائجیشن کے علاوہ)، جن کو اینزائمز کیپلا لائز کرتے ہیں۔



2- کون سا جانور پیپسن کم مقدار میں بناتا ہے، ایک ہر بی وور یا ایک کارنی وور؟ ایسا کیوں ہے؟

-2

سوچے



☆ کیا ہائیڈروکلورک ایسڈ کی غیر موجودگی میں پیپسن نے اپنا فعل سرانجام دیا؟ ایسا کیوں ہے؟

☆ یہ تمام تجربہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر کیوں کیا جاتا ہے؟

Web Version of PCTB Textbook



6.2

شارچ پرائیز انم (ڈائاسٹیز: diastase) کا عمل دکھانے کے لیے تجربہ

تاریخ:



کیا آپ جانتے ہیں؟

ایک انسان ایک دن میں اوسطاً ایک کوارٹ (quart) یعنی تقریباً 900 ml سیلا پیاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تقریباً 10,000 گیلن (37850 لیٹرز) سیلا پیاتا ہے۔

ڈائاسٹیز اینزائمز کا ایک قدرتی گروپ ہے (جس میں ایمائی لیز: amylase بھی شامل ہے)۔ اس کے اندر شارچ کو سادہ شوگرز (مونوسیکرائیڈز) میں توڑ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ اینزائم سیلا پیو، پنکریاٹک جوس، پودوں کے نشوز اور بیجوں میں پایا جاتا ہے۔ آئیوڈین شارچ کے سولیوشن کو گہرا ارغوانی یا سیاہ کر دیتی ہے، جبکہ ڈائی سیکرائیڈز اور مونوسیکرائیڈز آئیوڈین کے ساتھ ری ایکشن نہیں کرتے۔



ایمائی لیز سولیوشن، شارچ سولیوشن، آئیوڈین سولیوشن، ٹیسٹ ٹیوبز، ٹیسٹ ٹیوب سٹینڈ

احتیاطیں

- ☆ کیمیکلز کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔
- ☆ اگلیویشن کے لیے مقررہ وقت پر سختی سے عمل کریں۔

سوچے

ٹیسٹ ٹیوبز کو 37 ڈگری پر اگلیو بیٹ کیوں کیا گیا؟

- 1- دو ٹیسٹ ٹیوبز میں 5 ملی لیٹر شارچ سولیوشن ڈالیں۔
- 2- ہر ٹیوب کے اندر آئیوڈین سولیوشن کے 2 قطرے ڈالیں۔
- 3- ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ایمائی لیز سولیوشن ڈالیں اور دوسری ٹیسٹ ٹیوب کو ایسے ہی رہنے دیں۔
- 4- دونوں ٹیسٹ ٹیوبز کو 15 منٹ کے لیے 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر اگلیو بیٹ (incubate) کریں۔
- 5- ٹیسٹ ٹیوبز میں رنگ کی تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں۔




رنگ میں تبدیلی	ٹیسٹ ٹیوب
	ایمائی لیز ڈالے بغیر ٹیسٹ ٹیوب
	ایمائی لیز والی ٹیسٹ ٹیوب





1- اگر اینزائم کی مقدار بڑھادی جائے تو ری ایکشن کی رفتار پر کیا اثر ہوگا؟



2- اگر سبسٹریٹ (سٹارچ) کی مقدار بڑھادی جائے تو ری ایکشن کی رفتار پر کیا اثر ہوگا؟

3- اگر ری ایکشن کا درجہ حرارت بڑھا دیا جائے تو ری ایکشن کی رفتار پر کیا اثر ہوگا؟

4- کپڑوں پر سے سٹارچ کے دھبے اتارنے کے لیے واشنگ پاؤڈر کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟

سوچیے

کھانے کی چینی (سکروز: sucrose) پانی کے ساتھ ری ایکشن کر کے دو کمپاؤنڈز یعنی گلوکوز اور فرکٹوز (fructose) بنا سکتی ہے۔ تاہم، جب آپ پانی کے گلاس میں چینی ڈالتے ہیں تو یہ ری ایکشن انتہائی سست رفتاری سے ہوتا ہے۔ ری ایکشن کو تیز کرنے کے لیے مزید کس چیز کی ضرورت ہے؟


بائیوانرجیٹکس

ایک آبی پودے ہائیڈریلا (Hydrilla) کو استعمال کرتے ہوئے فوٹوسنتھیسی سیز کا عمل دکھانا



تاریخ:

فوٹوسنتھیسی سیز وہ عمل ہے جس کے دوران سبز پودے، الچی اور کچھ بیکیٹریا کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی سے، سورج کی روشنی اور کلوروفل کی موجودگی میں، اپنی خوراک (کاربوہائیڈریٹس) تیار کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔



شکل 7.1.1: ایک آبی پودے میں فوٹوسنتھیسی سیز دکھانے کے لیے تجربہ کا سیٹ اپ

بیکر، فٹل، ٹیمپٹ ٹیوب، سوڈیم بائی کاربونیٹ، ہائیڈریلا (Hydrilla) یا کسی اور آبی پودے کی شاخیں، ماچس کی ڈبیا



احتیاطیں

☆ جب آپ ٹیمپٹ ٹیوب کو فٹل کے اوپر لٹائیں، تو اس میں ہوا داخل نہیں ہونی چاہیے۔

- 1- 500 ملی لیٹر کے ایک بیکر میں پانی بھریں۔
- 2- پانی میں سوڈیم بائی کاربونیٹ کی تھوڑی سی مقدار ڈالیں، جو کہ پودے کو کاربن ڈائی آکسائیڈ دیتا ہے۔
- 3- ہائیڈریلا کی کچھ شاخیں بیکر میں رکھیں اور ان کے اوپر ایک فٹل لٹا کر انہیں ڈھانپ دیں۔



- 4- فنل کی گردن پر پانی سے بھری ایک ٹیسٹ ٹیوب الٹی رکھ دیں۔
- 5- فوٹو سنتھی سیز کے لیے تمام سامان کو چند گھنٹے سورج کی روشنی میں رکھ دیں۔
- 6- فنل کے منہ پر انگوٹھا رکھ کر اسے ٹیسٹ ٹیوب سے علیحدہ کریں۔
- 7- ایک جلتی دیاسلانی استعمال کر کے اس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر آکسیجن کی موجودگی چیک کریں۔

☆ تجربہ کے بعد اپنے مشاہدات کو ریکارڈ کریں۔

سیریل نمبر	الٹی رکھی گئی ٹیسٹ ٹیوب میں تبدیلیاں
1	
2	
3	
4	





1- آپ نے اس تجربہ میں کنٹرول سیٹ اپ استعمال نہیں کیا۔ اگر آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہا جائے، تو آپ کے خیال میں مناسب کنٹرول کیا ہو سکتا ہے؟

.....

.....

2- فوٹوسنتھی سیز کی رفتار پر کلوروفل کی مقدار کا کیا اثر ہوتا ہے؟

.....

.....

3- تجویز کریں کہ پانی یا کاربن ڈائی آکسائیڈ کی غیر موجودگی میں فوٹوسنتھی سیز کی رفتار کیا ہوگی؟

.....


.....

سوچیے



- ☆ پودے اپنی خوراک، فوٹوسنتھی سیز کے ذریعہ خود بناتے ہیں۔ پودوں کے بیجوں میں خوراک کا ذخیرہ موجود ہونا کیوں ضروری ہوتا ہے؟
- ☆ لائٹ ری ایکشنز میں کام کرنے والے اینزائمز کلوروپلاسٹس کی تھائی لیکووائیڈ (thylakoid) ممبرین کے اندر ہی محدود ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ سٹروما (stroma) میں حل ہوئے ہوں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟
- ☆ ٹیسٹ ٹیوب میں ہوا کیوں نہیں داخل ہونی چاہیے؟

مائیکروسکوپ سے مشاہدہ کر کے ایک پتے کے عمودی تراشہ (Cross Section) میں سیل اور ٹشو کی ساختوں کی شناخت کرنا اور انہیں لیبل کرنا



تاریخ:

ایک پتے کے عمودی تراشہ میں پہلی تہہ بالائی اپی ڈرمس ہے، جس کے اوپر کیوٹیکل کا غلاف بھی ہوتا ہے۔ بالائی اپی ڈرمس کے نیچے میزوفل ٹشو ہوتا ہے، جو پالیسیڈ (palisade) اور سپونجی (spongy) ٹشوز پر مشتمل ہے۔ سپونجی ٹشو کے اندر ہی ویکسولر بنڈز موجود ہوتے ہیں۔ سب سے چلی تہہ زیریں اپی ڈرمس ہے، جس میں زیادہ تر سٹومیٹا پائے جاتے ہیں۔



پتے کے عمودی تراشہ کی تیار شدہ سلائڈز، مائیکروسکوپ



1- پتے کے عمودی تراشہ کی تیار شدہ سلائڈز کا مشاہدہ مائیکروسکوپ کی کم اور زیادہ پاورز میں کریں۔



☆ مشاہدہ کیے جانے والی سلائڈز کی تصویر بنائیں۔



احتیاطیں



- ☆ سلائڈز کو احتیاط کے ساتھ پکڑیں۔
- ☆ استعمال سے پہلے سلائڈز اور مائیکروسکوپ کے آکولر لینز اور آئینہ کو صاف کر لیں۔



.....

.....

.....


.....

.....

1- مائیکروسکوپ کے نیچے آپ سپونجی سیلز اور پیلی سیڈ سیلز میں کس طرح تمیز کریں گے؟

.....

.....



2- پتے کی ساخت کس طرح بیرونی ہوا اور فوٹو سنتھیسیز کرنے والے سیلز کے درمیان گیہوں کو آسانی سے نفوذ ہو جانے کی اجازت دیتی ہے؟

.....


.....

مشاہدہ کر کے بتائیں



- ☆ سپونجی ٹشو کو یہ نام کیوں دیا جاتا ہے؟
- ☆ پتے کی کون سی تہہ میں سلنڈر کی شکل کے سیل ہوتے ہیں؟

فونٹوسنتھی سیز کے لیے کلوروفل، سورج کی روشنی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ضروری ہونے کی تحقیق کرنا




تاریخ:

فونٹوسنتھی سیز کے دوران کاربن ڈائی آکسائیڈ پانی کے ساتھ مل کر گلوکوز بناتی ہے اور آکسیجن خارج ہوتی ہے۔ کلوروفل سورج کی روشنی حاصل کر کے اسے کیمیکل انرجی میں تبدیل کرتا ہے، جسے خوراک کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ پتوں (مثلاً آئی وی پلانٹ (ivy plant)، منی پلانٹ (money plant) اور ہبسکس پلانٹ (hibiscus plant) کے پتے) میں کلوروفل کی غیر موجودگی کی وجہ سے زرد حصے ہوتے ہیں۔ ایسے دھبے دار پتوں کو ویری گیٹڈ (variegated) پتے کہا جاتا ہے۔



حصہ اول: کلوروفل کے ضروری ہونے کی تحقیق



شکل 7.3.1: ایک ویری گیٹڈ پتا

ویری گیٹڈ پتوں والا پودا، آئینہ سولیشن، ڈراپر، پیٹری ڈش، بیکر، ٹیسٹ ٹیوب، برنز، واٹر باتھ، ٹرائی پوڈسٹینڈ، ماچس کی ڈبیا





- 1- گملے میں لگا ویری گھنڈ پتوں والا ایک پودا لیں۔
- 2- پودے کو تین سے چار دن تک سورج کی تیز روشنی میں رکھیں۔
- 3- پودے سے ایک پتا علیحدہ کریں۔ اس کی بالائی سطح کی تصویر بنائیں، جس میں سبز اور غیر سبز حصوں میں واضح فرق دکھائی دے۔
- 4- تمام پتے پر شارچ ٹیسٹ کریں۔




شارچ ٹیسٹ

- 1- پودے سے علیحدہ کیے گئے ایک پتے کو آدھے منٹ کے لیے ایلٹے پانی میں رکھیں، تاکہ اس کا پروٹوپلازم مردہ ہو جائے۔
- 2- ایلٹے کے بعد پتے کو آتھنول سے بھری ایک ٹیسٹ ٹیوب میں رکھیں، تاکہ اس میں سے کلوروفل نکل جائے۔
- 3- ان ٹیسٹ ٹیوب کو پانی کے بیکر میں رکھیں اور اسے 10 منٹ تک ایلٹیں، حتیٰ کہ پتا بے رنگ ہو جائے۔
- 4- پتے کو علیحدہ کریں اور اسے پانی میں دھوئیں۔ اس سے پتا نرم پڑ جائے گا۔
- 5- پتے کو پیٹری ڈش میں رکھیں اور اس پر آئیوڈین سولیوشن کے چند قطرے ڈالیں۔
- 6- پتے کی بالائی سطح میں رونما ہونے والی رنگ کی تبدیلیاں دیکھیں اور تصویر بنائیں۔




سوچیے

- ☆ ہم نے ویری گھنڈ پتے کیوں استعمال کیے؟
- ☆ شارچ ٹیسٹ کیوں کیا گیا؟



پتے کو دھویا جا رہا ہے ایلٹے ہوئے آتھنول میں پتا ایلٹے ہوئے پانی میں پتا



آئیوڈین سولیوشن کے ساتھ شارچ ٹیسٹ

شکل 7.3.2: فوٹو سنتھی سیز میں کلوروفل کے ضروری ہونے کی تحقیق کے لیے تجربہ کا سیٹ اپ

☆ پتے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو ریکارڈ کریں۔



☆ شارچ ٹیسٹ سے پہلے اور اس کے بعد کے پتے کی تصاویر بنائیں۔

شارچ ٹیسٹ کے بعد کی تصویر

شارچ ٹیسٹ سے پہلے کی تصویر

☆ دونوں تصاویر کا موازنہ کریں۔




حصہ دوم: سورج کی روشنی کے ضروری ہونے کی تحقیق

گملے میں لگا سحت مند پتوں والا پودا، سیاہ کاغذ، پیپر کلپس (clips)، ہیکر، فورسپس، ٹیسٹ ٹیوب، استھنول، آئیوڈین سولیوشن، ڈراپر، برز



- 1- گملے میں لگے پودے میں سے پہلے موجود شارچ کو ختم کریں۔ اس کے لیے پودے کو دو سے تین دن تک اندھیرے میں رکھیں۔
- 2- ڈایا گرام کے مطابق پتا "A" پر سیاہ کاغذ لپیٹ دیں۔
- 3- ایک اور سیاہ کاغذ پر کوئی خاص ڈیزائن کاٹیں۔ ڈایا گرام کے مطابق، پتا "B" پر یہ کاغذ لپیٹ دیں (سیاہ کاغذ کو اپنی جگہ رکھنے کے لیے پیپر کلپس استعمال کریں)۔
- 4- پودے کو 4 سے 6 گھنٹوں کے لیے تیز روشنی میں رکھیں۔
- 5- دونوں پتوں کو پودے سے علیحدہ کریں اور ان پر شارچ ٹیسٹ کریں۔



شکل 7.3.3: فوٹوسنتھی میں روشنی کے ضروری ہونے کی تحقیق کے لیے تجربہ کا سیٹ اپ

سوچیے

- ☆ پودے میں پہلے سے موجود شارچ ختم کرنا کیوں ضروری ہے؟
- ☆ پتے کو سیاہ کاغذ میں لپیٹنے کا کیا مقصد ہے؟

☆ سچے پرسٹارچ ٹیسٹ کرنے کے بعد اپنے مشاہدات ریکارڈ کریں۔



پتہ "B"	پتہ "A"


☆ نتیجہ دکھانے کے لیے پتوں کی تصاویر بنائیں۔

Web Version of PCTB Textbook



حصہ سوم: کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ضروری ہونے کی تحقیق

گملے میں لگا پودا، سپلٹ کارک (split cork)، چوڑے منہ والی بوتل / فلاسک، پوناشیم ہائیڈروآکسائیڈ (KOH) سولوشن، پیکر، ٹیسٹ ٹیوب، آئینوڈین سولوشن، ڈراپر، پریٹری ڈش، پانی، ویزلین (vaseline)



شکل 7.3.4: فوٹوسنتھی سیز میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ضروری ہونے کی تحقیق کے لیے تجربہ کا سیٹ اپ

1- گملے میں لگے پودے میں سے پہلے موجود شارچ کو ختم کریں۔ اس کے لیے پودے کو دو سے تین دن تک اندھیرے میں رکھیں۔



2- کھلے منہ والی ایک بوتل میں پوناشیم ہائیڈروآکسائیڈ سولوشن ڈالیں (پوناشیم ہائیڈروآکسائیڈ بوتل میں موجود تمام کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کر لے گا)۔

3- ایک کارک کو لمبائی کے رخ، دو میں کاٹیں۔

4- پودے کے پتے کو (علحدہ کیے بغیر) کارک کے کٹے ہوئے حصوں کے درمیان سے اس طرح گزاریں کہ پتے کا آدھا حصہ بوتل کے باہر رہے۔

5- کارک کے کٹے گئے حصوں پر ویزلین لگا کر سامان کو منہ بند (air tight) کر دیں۔

6- سامان کو فوٹوسنتھی سیز کے لیے چند گھنٹوں تک تیز روشنی میں رکھیں۔

7- پتے کو پودے سے علیحدہ کریں۔

8- پتے پر شارچ ٹیسٹ کریں۔

احتیاطیں



☆ کارک کے ٹکڑوں اور پتے کے درمیان خالی جگہ مت چھوڑیں۔

☆ پتے پر سٹارچ ٹیسٹ کرنے کے بعد اپنے مشاہدات ریکارڈ کریں۔



پتے کا وہ حصہ جو بوتل کے اندر تھا	پتے کا وہ حصہ جو بوتل سے باہر تھا

☆ اپنے مشاہدات دکھانے کے لیے پتے کی تصویر بنائیں۔




.....

.....

.....

.....

.....



-1

روشنی کی ضرورت ثابت کرنے والے تجربہ میں آپ نے پتے کے گرد ایک سیاہ کاغذ لپیٹا تھا۔ پتے کے ایک حصے پر پڑنے والی روشنی میں رکاوٹ ڈالنے کے علاوہ، یہ کاغذ پتے پر اور کون سا اثر ڈال سکتا ہے جس سے کہ نتائج متاثر ہو سکتے ہیں؟

.....

.....

.....

-2

ویری گیٹڈ پتے کی مختلف حصوں میں کلوروفل کے پھیلاؤ اور سٹارچ کے پھیلاؤ (جو آئیوڈین سے معلوم کیا گیا) کے آپس میں کیا تعلق ہے؟

.....

.....

.....

-3

یہ فرض کرتے ہوئے کہ پتے میں سٹارچ کا موجود ہونا فوٹوسنتھی سیز کی شہادت ہے، فوٹوسنتھی سیز اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے متعلق ایک عمومی بیان بنائیں۔

.....


.....

.....

سوچیے

☆ مٹی میں زیادہ مقداروں میں
فریلا نرزیکیوں نہیں ڈالنے
چاہئیں؟

چونے کے پانی (lime water) کو استعمال کر کے اُگتے ہوئے بیجوں میں ریسپریشن کا عمل دکھانا



تاریخ:

جرمینیشن کے دوران بیج توانائی کے لیے ریسپریشن کرتے ہیں۔ ریسپریشن میں بننے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ فاضل مادہ ہوتی ہے اور اسے خارج کر دیا جاتا ہے۔ جب چونے کا پانی کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ساتھ ملتا ہے تو دووہیا ہو جاتا ہے۔



کوئیک فلاسک، ٹیمپٹ ٹیوبز، ایک سوراخ والا کارک، مٹر کے اگتے ہوئے بیج، U شکل کی گلاس ٹیوب، چونے کا پانی، ویکس (wax)، بیکر




احتیاطیں

☆ زیادہ دیر تک بھگوئے ہوئے
بیجوں کو مت استعمال کریں۔



☆ دوسرے بیجوں کا نام بتائیں جنہیں
ہم اس تجربے میں استعمال کر سکتے ہیں۔

- 1- چننا گئے ہوئے بیج حاصل کریں اور انہیں ایک کوئیک فلاسک میں رکھیں۔
- 2- فلاسک کے منہ پر ایک کارک رکھیں جس کے مرکز میں سوراخ ہو۔
- 3- کارک کے سوراخ میں U شکل کی گلاس ٹیوب کا ایک کنارہ داخل کریں اور اسے ویکس سے بند کر دیں۔
- 4- U شکل ٹیوب کا دوسرا کنارہ ایک بیکر میں موجود چونے کے پانی میں ڈبو دیں۔
- 5- اس سامان کو "A" لیبل کر دیں۔
- 6- کنٹرول کے طور پر اسی طرح کا سامان سیٹ کریں، جس میں رکھے گئے بیج جرمینیشن نہ کر رہے ہوں۔ اس سامان کو "B" لیبل کر دیں۔
- 7- دونوں سامان 24 گھنٹوں کے لیے رکھ چھوڑیں۔




شکل 7.4.1: اگتے ہوئے بیجوں میں ریسپریشن دکھانے کے لیے تجربہ کا سیٹ اپ



سامان	چونے کے پانی میں تبدیلیاں
A	
B	

[illegible]

-]



2- اس تجربہ میں چونے کا پانی دودھیا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس عمل کے دوران کون سا پراڈکٹ بننا ہے؟

اگر ہم اس تمام سامان کو گرم کریں، تو آپ کیا نتائج توقع کرتے ہیں؟

-3

.....

.....

.....

سوچیے



- ☆ ماسٹو کانڈریا کی اندرونی ممبرین کا تہوں کی شکل میں ہونا کس طرح اے روپک ریسپریشن میں فائدہ مند ہوتا ہے؟
- ☆ ریسپریری سبسٹریٹ کے طور پر جانداروں کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیجوں نے سبسٹریٹ کے طور پر کیا چیز استعمال کی؟
- ☆ آیا جانور ریسپریشن کے دوران کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ معلوم کرنے کے لیے ایک تجرباتی تحقیق کا منصوبہ بنائیں (عمل کیے بغیر)۔

Web Version of PCTB Textbook



اُگتے ہوئے بیجوں میں ریسپریشن کے دوران حرارت کے اخراج کی تحقیق کرنا

تاریخ:

اے روپک ریسپریشن میں آکسیجن گلوکوز کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ، پانی اور توانائی پیدا کرتی ہے۔ توانائی ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ (Adenosine Tri-Phosphate) یعنی اے ٹی پی (ATP) اور حرارت کی شکل میں خارج ہوتی ہے۔ یہ حرارت جرمینیشن کرتے بیجوں کا ٹمبر بچر بڑھادیتی ہے۔



مگر کے بیج، تھرموس (thermos) فلاسک، تھرمائیٹرز، کاٹن، آئرن سینیڈ



1- پیدا گئے ہوئے بیج حاصل کریں۔

2- چند بیجوں کو 10 منٹ تک ابالیں تاکہ وہ مر جائیں۔

3- دو تھرموس فلاسک لیں اور انہیں "A" اور "B" لیبل کر دیں۔


4- زندہ بیج (جنہیں ابالا نہیں گیا) فلاسک "A" میں جبکہ مردہ بیج (جنہیں ابالا گیا تھا) فلاسک "B" میں رکھ دیں۔

5- ہر فلاسک کے منہ سے ایک تھرمائیٹرز داخل کریں اور اس جگہ کو کاٹن سے بند کر دیں۔


6- فلاسکس کو الٹا دیں اور سامان کو ڈالیا گرام کے مطابق ترتیب دے دیں۔ فلاسک "A" تجرباتی سیٹ اپ ہوگا جبکہ فلاسک "B" تجربہ کا کنٹرول ہوگا۔

7- سامان کو 24-48 گھنٹوں کے لیے رکھ چھوڑیں۔

8- تجربہ کے آغاز سے پہلے اور اختتام پر تھرمائیٹرز کی ریڈنگ نوٹ کریں۔



شکل 7.5.1: اے روپک ریسپریشن کے دوران حرارت کا اخراج دکھانے کے لیے تجربہ کا سیٹ اپ



تھرموس فلاسک	ابتدائی ٹمپرچر	اختتامی ٹمپرچر	فرق
	$T_1 (^{\circ}\text{C})$	$T_2 (^{\circ}\text{C})$	$T_3 = T_2 - T_1 (^{\circ}\text{C})$
A			
B			



.....

.....

.....

1- جب آپ زیادہ ایکسپریمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا جسم گرم ہو جاتا ہے۔ ریسپریشن سے اس کا تعلق بتائیں۔

.....

.....


2- اس تجربہ کو دوسرے بیج استعمال کرتے ہوئے دوہرائیں۔

.....

.....

3- کیا یہ تجربہ ہم ایک ٹیسٹ ٹیوب میں کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو وجوہات بتائیں۔

.....



سوچیے

☆ ریسپریشن سے ٹمپرچر میں اضافہ کی ایک اور مثال دیں۔

نیوٹریشن

خوراک کا تجزیہ (Food Tests):

گلوکوز (ریڈیوسنگ شوگر) کے لیے بینی ڈکٹ ٹیسٹ (Benedict's Test)

شارج (نان-ریڈیوسنگ شوگر) کے لیے آئیوڈین ٹیسٹ (Iodine Test)

فیٹس کے لیے سپاٹ ٹیسٹ (Spot Test) اور ایمولشن ٹیسٹ (Emulsion Test)

پروٹینز کے لیے بائی یورٹ ٹیسٹ (Biuret Test)



تاریخ:

کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس خوراک کے بڑے اجزاء ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس میں موجود بڑے
ایمولشن کا پانی، ہائیڈروجن اور آکسیجن ہیں۔ پروٹینز میں نائٹروجن بھی پائی جاتی ہے۔



گلوکوز سولوشن، بینی ڈکٹ سولوشن، شارچ سولوشن، سپرٹ لیمپ، ماچس کی ڈیپا، پروٹین سولوشن، بائی یورٹ ری ایجنٹ، ویجی ٹیبل
آئل فیٹ، اتھنول، کشید کردہ پانی، ٹیسٹ ٹیوبز، ٹیسٹ ٹیوبز ریک (rack)، ٹیسٹ ٹیوبز ہولڈرز، ڈراپر، واٹر باتھ، پپٹ (pipette)



ریڈیوسنگ شوگرز کے لیے بینی ڈکٹ ٹیسٹ Benedict's Test for Reducing Sugars

- 1- ایک ٹیسٹ ٹیوب میں 3 ملی لیٹر گلوکوز سولوشن لیں، اس کے اندر اسی مقدار میں بینی ڈکٹ سولوشن ڈالیں۔
- 2- مکچر کو ہلائیں اور اسے اچلتے ہوئے پانی کے بکریں میں رکھ کر دو سے تین منٹ تک گرم کریں۔

شارچ کے لیے آئیوڈین ٹیسٹ Iodine Test for Starch

- 1- ایک ٹیسٹ ٹیوب میں 2 ملی لیٹر شارچ سولوشن لیں اور اس میں آئیوڈین سولوشن کے چند قطرے ڈالیں۔

فیٹس / آئلز کے لیے سپاٹ ٹیسٹ Spot Test of Fats / Oils

- 1- کاغذ کا ایک ٹکڑا لیں اور خوراک کے ایک نمونے کو اس پر گرڈیں۔ کاغذ کو خشک ہونے دیں۔
- 2- کاغذ کو روشنی کے کسی ذریعہ کے سامنے کریں تاکہ روشنی اس کے اندر سے گزرے۔

فیٹس / آئلز کے لیے ایمولشن ٹیسٹ Emulsion Test for Fats / Oils

- 1- ایک ٹیسٹ ٹیوب میں آئل کے دو یا تین قطرے لے کر ان پر 5 ملی لیٹر اتھنول ڈالیں۔ مکچر کو 5 منٹ تک اچھی طرح ہلائیں۔
- 2- اس مکچر میں 5 ملی لیٹر کشید کردہ پانی ملائیں۔



احتیاطیں



☆ مختلف ری ایجنٹس کی پیمائش کے لیے الگ الگ پیپٹس استعمال کریں۔

Biuret Test for Proteins ٹیسٹ کے لیے بائی یورٹ ٹیسٹ

- 1- ایک ٹیسٹ ٹیوب میں 3 ملی لیٹر پروٹین سولوشن لیں۔
- 2- اس کے اندر اسی مقدار میں بائی یورٹ ری ایجنٹ ڈالیں۔

All Tests for Unknown Specimen ٹیسٹس کے لیے تمام نامعلوم نمونے

- 1- مہیا کیے گئے نامعلوم نمونے پر تمام ٹیسٹس کریں۔

☆ ٹیسٹ ٹیوبز میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق اپنے مشاہدات ریکارڈ کریں۔




نمونہ سولوشنز	بنی ڈکٹ ٹیسٹ	بائی یورٹ ٹیسٹ	آئیوڈین ٹیسٹ	ایملشن ٹیسٹ / سپاٹ ٹیسٹ
A (گلوکوز)				
B (سٹارچ)				
C (آئلز / فیش)				
D (پروٹینز)				
E (نامعلوم)				



.....

.....

.....



-1

آپ کا ایک ٹیسٹ آئیوڈین کے ساتھ رنگ کی تبدیلی دکھاتا ہے۔ کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نمونے میں گلوکوز اور پروٹین موجود نہیں ہیں؟ اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو کون سے تجربات کرنا پڑیں گے۔

-2

ایسے نمونے جن میں لپڈز اور پانی دونوں پائے جاتے ہیں، ان کا آئل ٹیسٹ کرنے سے پہلے آپ کن مشکلات کی پیش بینی کر سکتے ہیں؟

-3

کیا آپ کے نتائج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی شوگر (مثلاً سکروز، فکٹوز اور مالٹوز) کا جب بنی ڈکٹ سولیشن کے ساتھ ٹیسٹ کیا جائے تو وہی رنگ ملے گا جیسا کہ گلوکوز کے ساتھ ملا؟






ولائی (villi) دکھانے کے لیے سال انٹسٹائن کے عرضی تراشہ کا مائیکروسکوپک معائنہ

تاریخ:

کیا آپ جانتے ہیں؟

شہر کو ولائی جیٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر کی کمی اسے پہلے ہی کافی ڈائی جیٹ کر چکی ہوتی ہے۔

سال انٹسٹائن کے تین حصے ہیں: ڈیوڈینم، جیجونم اور ایلیم (duodenum, jejunum and ileum)۔ ایلیم کی اندرونی دیوار میں بے شمار انگلی نما ابھار ہوتے ہیں جنہیں ولائی (واحد: ولس - villus) کہتے ہیں۔ ہر ولس ایک بیرونی اپی تھیلیئم (جس کی موٹائی ایک سیل کی ہے)، بلڈ کپریز اور لیفٹیل (لمفٹک ویسل) پر مشتمل ہوتا ہے۔



شکل 8.2.1: سال انٹسٹائن کے عرضی تراشہ کی سلائڈز اور ایک ولس کا بڑا کیا گیا منظر

سال انٹسٹائن (ایلیم) کے عرضی تراشہ کی تیار شدہ سلائڈز، مائیکروسکوپ



کیا آپ جانتے ہیں؟

سال انٹسٹائن کے ہر کعبہ بنی میٹر میں 5000 ولائی اور 3 بلین مائیکرو ولائی پائے جاتے ہیں۔

1- تیار شدہ سلائڈز کو مائیکروسکوپ کی کم اور زیادہ پاورز میں فوکس کریں اور ان کا مشاہدہ کریں۔





سوچئے

☆ سال انٹسٹائن اتنی زیادہ لمبی کیوں ہوتی ہے؟

1- ڈائی جیسٹ ہو چکی خوراک کی اہز ایشن کے لیے سال انٹسٹائن فعال کیوں ہے؟

2- ڈائی جیسٹ ہو چکی خوراک سال انٹسٹائن سے خون میں کیسے جاتی ہے؟

ٹرانسپورٹ

سالت سولیوشن (salt solution) اور پانی میں آلو کے ٹکڑوں کی لمبائی اور وزن میں فرق کی پیمائش کرنا



تجربہ

9.1

تاریخ:

اگر ہم ایک سیل کو ہائپوٹانک (hypotonic) سولیوشن میں رکھیں تو باہر سے پانی سیل کے اندر داخل ہوگا۔ سیل کے اندر پانی داخل ہونے سے سیل پھیل جاتا ہے اور ٹرجڈ (turgid) ہو جاتا ہے۔ اس طرح سیل کے وزن اور اس کی لمبائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ باہر ٹانک (hypertonic) سولیوشن میں پانی سیل سے باہر نکلتا ہے۔ اس سے سیل کے وزن اور اس کی لمبائی میں کمی ہوتی ہے۔ آئسوٹانک (isotonic) سولیوشن میں باہر نکلتے والے اور اندر داخل ہونے والے پانی کی مقدار برابر ہوتی ہے۔ اس طرح سیل کا وزن اور اس کی لمبائی مستقل رہتی ہے۔



آلو، کارک بورر (cork borer)، چاقو/بلیڈ، ٹیسٹ ٹیوبز، ٹیسٹ ٹیوبز سٹینڈ، 20% سالت سولیوشن، پانی، الیکٹرک بیلنس (electric balance)، پیمانہ پچٹ (pipette)

احتیاطیں

- ☆ آلو کے ٹکڑوں کے وزن کی پیمائش احتیاط سے کریں۔
- ☆ آلو کے ٹکڑوں کو برابر سائز میں کاٹیں۔
- ☆ مختلف سولیوشنز کی پیمائش کے لیے ایک ہی پچٹ استعمال نہ کریں۔


1- ایک بڑا آلو لیں اور اس کے اندر ایک کارک بورر داخل کریں۔

2- کارک بورر کے دوسرے کنارے سے آلو کے ٹکڑے کو کارک بورر میں سے باہر دھکیلیں۔ اسی طریقہ کو استعمال کر کے آلو کا ایک اور ٹکڑا کاٹیں۔


3- چاقو یا بلیڈ کی مدد سے آلو کے ٹکڑوں کی برابر لمبائیاں کاٹیں۔ ہر ٹکڑے کی لمبائی اور وزن مائیں (لمبائی 5 cm سے کم نہیں ہونی چاہیے)۔ دونوں ٹکڑوں کا سائز اور وزن برابر ہونا چاہیے۔



کارک بورر کو آلو میں دھکیلیں



آلو کے ٹکڑے کو کارک بورر میں سے باہر دھکیلیں



آلو کے ٹکڑے

شکل 9.1.1: آلو کے ٹکڑوں کو کاٹنا اور ان کی تراش خراش کرنا

4- ایک ٹکڑے کو صاف پانی والی ٹیسٹ ٹیوب میں اور دوسرے ٹکڑے کو 20% سالٹ سولوشن والی ٹیسٹ ٹیوب میں رکھ دیں۔

5- ایک دن کے لیے انتظار کریں اور پھر ٹکڑوں کو ٹیسٹ ٹیوبز میں سے نکال لیں۔

6- بلائنگ پیپر سے دونوں ٹکڑوں کو خشک کریں اور ان کے وزن اور لمبائی کی پیمائش کریں۔

☆ آلو کے ٹکڑوں کے وزن اور لمبائی میں فرق ریکارڈ کریں۔

نمونہ سولیوشنز	ابتدائی وزن	آخری وزن	وزن میں فرق	ابتدائی لمبائی	آخری لمبائی	لمبائی میں فرق
صاف پانی میں آلو کا ٹکڑا						
20% سالٹ سولوشن میں آلو کا ٹکڑا						



1- آلو کے ٹکڑے کی لمبائی میں اضافے کی کیا وجہ ہے؟





نشوونما کرتی جڑوں پر روٹ ہیئرز (root hairs) کا مشاہدہ

تاریخ:

پانی اور منرلز زیادہ مقدار میں اور زیادہ رفتار سے جذب کرنے کے لیے جڑیں روٹ ہیئرز بنا کر اپنا سطحی رقبہ بڑھا لیتی ہیں۔
روٹ ہیئرز جڑ کی اپنی ڈمس کے سیلز کے آگے بڑھے ہوئے حصے ہوتے ہیں۔



شکل 9.2.1: مختلف جڑوں پر موجود روٹ ہیئرز

روٹ ہیئرز والی مختلف جڑیں مثلاً مولیٰ، گاجر وغیرہ، ہینڈ لینز، سلائڈ، مائیکروسکوپ



- 1- ہینڈ لینز کی مدد سے مولیٰ، گاجر وغیرہ کی جڑوں کا مشاہدہ کریں۔
- 2- جڑوں کی سطحوں کا تفصیلی مطالعہ کریں۔
- 3- اپنی ڈمس کو روٹ ہیئرز کے ساتھ ہی علیحدہ کرنے کی کوشش کریں اور مائیکروسکوپ کے نیچے اس کا مطالعہ کریں۔




اپنے مشاہدات کی ڈایا گرام بنائیں۔



1- کیا ”روٹ ہیئر“ پودے کا ایک سیل ہے یا نہیں؟ اس کی ساخت بیان کریں۔

2- روٹ ہیئر کیا فعل سرانجام دیتا ہے؟







پتے کی اپی ڈرمس میں سٹومیٹا کی ساخت اور تعداد کا مائیکروسکوپک مشاہدہ

تاریخ:

گیسوں اور پانی کے بخارات کا ماحول سے تبادلہ کرنے کیلئے پتوں کی بالائی اور زیریں اپی ڈرمس میں سٹومیٹا ہوتے ہیں۔ ہر سٹوما کے گرد گارڈ سیلز کا ایک جوڑا ہوتا ہے، جو اس کے کھلنے اور بند ہونے کو کنٹرول کرتے ہیں۔



زیریں سطح پر سٹومیٹا



کھلا ہوا سٹوما

بند سٹوما

سٹومیٹا کا بند اور کھلنا

پیٹری ڈش، پانی، سلائڈز اور کورسلیس، میتھلین بلیو، مائیکروسکوپ مختلف پتے



احتیاطیں

- ☆ مشاہدہ کرنے سے پہلے سلائڈ، آکولر لینز اور آئیجیکٹو کو صاف کر لیں۔
- ☆ کیمیکلز کو پکڑتے ہوئے احتیاط کریں۔

- 1- ایک پتالیں اور اس کی سطح سے ایک باریک تہہ (زیریں اپی ڈرمس) چھیل کر اتاریں۔
- 2- باریک تہہ کو ایک پیٹری ڈش میں پانی کے اندر رکھیں۔
- 3- چھیلی گئی اپی ڈرمس کا ایک ٹکڑا کاٹیں اور اسے ایک سلائڈ پر موجود پانی کے قطرہ میں رکھیں۔
- 4- اس پر میتھلین بلیو کا ایک قطرہ گرائیں اور میپیر بلز کے اوپر کورسلیس رکھ دیں۔
- 5- سلائڈ کو مائیکروسکوپ کی کم اور زیادہ پاؤرز کے نیچے دیکھیں۔

اپنے مشاہدات کی ڈایا گرام بنائیں۔



--

سٹومیٹا کی تعداد معلوم کریں اور ان میں سے کھلے ہوئے سٹومیٹا کی تعداد گنیں۔

دکھائی دینے والے سٹومیٹا کی تعداد	بند سٹومیٹا کی تعداد	کھلے ہوئے سٹومیٹا کی تعداد

--




ذہنی آزمائش



پودوں میں سٹومیٹا گیٹس کے تبادلہ کے لیے ہوتے ہیں۔ جانور کے جسم میں کون سا آرگن یہی فعل سرانجام دیتا ہے؟

1- زیادہ تر پتوں میں زیریں اپی ڈرمس میں بالائی اپی ڈرمس کی نسبت بہت زیادہ سٹومیٹا ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔

-1



2- کاربن ڈائی آکسائیڈ کے علاوہ اور کون سی چیز سٹومیٹا کے ذریعہ پتے میں داخل ہو سکتی ہے اور یہاں سے باہر جاسکتی ہے؟

-2


3- کیا آپ کسی پودے کے تنے اور جڑ میں سٹومیٹا دیکھ سکتے ہیں؟ وجوہات بتائیں۔

-3

4- دن کے کون سے وقت میں آپ کو زیادہ تر سٹومیٹا کھلے ہوئے ملتے ہیں؟

-4

کوبالٹ کلورائیڈ (Cobalt chloride) پیپر استعمال کر کے پتے کی دونوں سطحوں سے پانی کے ضیاع کی شرح معلوم کرنا



تاریخ:

خشک کوبالٹ کلورائیڈ پیپر نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور جب پانی کے بخارات اس سے چھوتے ہیں تو یہ گلابی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ خشکی کے پودوں کے پتوں میں بالائی سطح کی نسبت زیریں سطح پر زیادہ سٹومیٹا ہوتے ہیں۔




گیلے میں لگا پودا، کوبالٹ کلورائیڈ پیپر ز، فورسپس، گلاس سلائیڈز، ربر بینڈز، فلٹر پیپر



احتیاطیں

- ☆ تجربہ سے پہلے، ہاتھ اور پتے خشک کر لیں۔
- ☆ احتیاط کریں کہ گلاس سلائیڈز تجرباتی پتے کی ساخت کو رگڑ کر خراب نہ کر دے۔
- ☆ کوبالٹ کلورائیڈ پیپر ز رکھنے سے پہلے پتوں کی سطح سے گرو صاف کریں۔

- 1- گیلے میں لگا ایک پودا لیں۔ پودے کو پانی دیں اور اسے ایک گھنٹہ کے لیے رکھ دیں۔
- 2- برابر سائز کے دو کوبالٹ کلورائیڈ پیپر ز لیں اور فورسپس کی مدد سے ایک کوبالٹ کلورائیڈ پیپر کو پتے کی بالائی سطح اور ایک کو زیریں سطح پر رکھ دیں۔
- 3- دو خشک گلاس سلائیڈز کو پتے پر لگے بالائی اور زیریں کوبالٹ کلورائیڈ پیپر ز کے اوپر رکھیں اور ربر بینڈز کی مدد سے انہیں فکس کر دیں۔
- 4- نوٹ کریں کہ کوبالٹ کلورائیڈ پیپر ز گلابی ہونے میں کتنا وقت لیتے ہیں۔



شکل 9.4.1: پتے کی دونوں سطحوں سے پانی کے ضیاع کی شرح معلوم کرنے کے لیے تجرباتی سیٹ اپ

رنگ تبدیل ہونے میں لگنے والا وقت	رنگت میں تبدیلی	
		بالائی جانب لگا کو بالٹ کلورائیڈ پیپر
		زیریں جانب لگا کو بالٹ کلورائیڈ پیپر



.....

.....

.....

1- عام طور پر پتے کی زیریں سطح پر سٹومیٹا کی تعداد بالائی سطح کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ سٹومیٹا کی اس تقسیم کی کیا اہمیت ہے؟



.....

.....

.....

.....

.....

2- کیا اس تجربہ سے آپ بتا سکتے ہیں کہ دونوں سطحوں پر موجود سٹومیٹا کھلے ہوئے تھے یا بند؟

.....


.....

3- اگر تمام سٹومیٹا بند ہوں لیکن کو بالٹ کلورائیڈ پیپر کے ساتھ نتیجہ آپ کے تجربہ جیسا ہی نکلے، اس کی وضاحت آپ کیسے کریں گے؟

.....

.....

تجربہ 9.5: پیل جارج کے نیچے، گملے میں لگے ایک پودے میں ٹرانسپائریشن (transpiration) کی تحقیق کرنا



ٹرانسپائریشن سے مراد پودے کی سطح سے پانی کا ضیاع ہے۔ ٹرانسپائریشنل پیل (transpirational pull) کی وجہ سے پانی اور معدنیات پودے کے اوپری حصوں تک آتے ہیں۔ درجہ حرارت زیادہ ہو جانے پر ٹرانسپائریشن پودے کے جسم کو ٹھنڈا کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔




گملے میں لگا پودا، دو پیل جارجز (bell jars)، پولی تھین بیگ (polythene bag)، کاپر سلفیٹ (Copper sulphate)



احتیاطیں

☆ تجربہ سے پہلے پیل جارج سے نمی نکال دیں (لشہرہ وغیرہ استعمال کر کے)۔

- 1- گملے میں لگا ایک پودا لیں۔ گملے اور تنے کے نچلے حصہ کو پولی تھین بیگ سے ڈھانپ دیں۔
- 2- گملے کو پودے سمیت ایک شیشے کی پلیٹ پر رکھیں اور اس کے اوپر ایک خشک پیل جارج لٹا رکھ دیں۔
- 3- تجربہ کا ایک کنٹرول (پودے کے بغیر) بھی تیار کریں۔
- 4- دونوں آپریٹس، کم از کم ایک گھنٹہ کے لیے، سوچ کی روشنی میں رکھ دیں۔



شکل 9.5.1: پیل جارج کے نیچے، گملے میں لگے پودے میں ٹرانسپائریشن کی تحقیق کا تجرباتی سیٹ اپ



تجربہ
9.6


جزء، تنا اور پتے کی تیار شدہ سلائڈز میں زائلم اور فلوئم ٹشوز کی شناخت کرنا

تاریخ:


زائلم ٹشو ٹریکیڈز (tracheids) اور ویسل ایلیمنٹس (vessel elements) پر مشتمل ہے۔ فلوئم ٹشو سیو ٹیوب سیلز (sieve tube cells) اور کمپینین سیلز (companion cells) پر مشتمل ہوتا ہے۔ سیو ٹیوب سیلز کی اختتامی دیواروں میں بہت سے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں۔ ان دیواروں کو سیو پلیٹس (sieve plates) کہتے ہیں۔



(ا): ارڈی (castor bean) کے تنے کا عرضی تراشہ



(ب): گنے کے پتے کا عرضی تراشہ



(ج): جُرکپ (buttercup) کی جڑ کا عرضی تراشہ

شکل 9.6.1: مختلف سلائڈز میں دکھائی دینے والے زائلم اور فلوئم ٹشوز

زائلم اور فلوئم کی تیار شدہ سلائڈز / چارٹس / مائیکروگرافس، مائیکروسکوپ



1- زائلم اور فلوئم کی تیار شدہ سلائڈز / چارٹس / مائیکروگرافس کا مشاہدہ کریں۔

2- زائلم اور فلوئم کی شناخت کریں۔



جڑ:

تنہ:

پتا:



نتائج:

نتائج:

نتائج:



سوچیے
آپ ایک درخت کی عمر کیسے
معلوم کریں گے؟



کیا تنے اور پتوں کے ویسکولر بنڈلز میں کیملیم (cambium) موجود ہے؟

.....

.....

.....

-1





مناسب سٹین (stain) استعمال کرتے ہوئے پودے کے حصوں میں پانی کا راستہ معلوم کرنا
اور مختلف طرح کے سیلز کے سائز کا موازنہ کرنا

تاریخ:

جزوں سے پانی اور نمکیات کی پودے کے اوپری حصوں تک ٹرانسپورٹ کو اینڈٹ آف سیپ (ascent of sap) کہتے ہیں۔ زائلم ٹشو ویسل اینڈٹس اور ٹریکیڈز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ویسل اینڈٹس لمبی ٹیوبز ہیں جن کے سیلز چھوٹے اور چوڑے ہیں جبکہ ٹریکیڈز ایسے لمبے سیلز ہوتے ہیں جن کے کنارے ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہیں۔ اینڈٹ آف سیپ کی دھار بڑی قوت ٹرانسپائریشنل بل ہے۔



ای او سین سولوشن (Eosine solution)، بیکر، ہریشینس (herbaceous) پودا، ڈائی سیکنگ مائیکروسکوپ، کمپاؤنڈ مائیکروسکوپ، گلاس سلائڈز، سٹینڈ، لیزر




احتیاطیں
☆ طوی تراشے احتیاط سے کاٹیں۔
☆ ای او سین سٹین کی زائد مقدار استعمال نہ کریں (سولوشن ڈائیکوٹ ہونا چاہیے)۔

1- ایک بیکر کو ڈائیکوٹ ای او سین سولوشن سے بھریں۔

2- شکل کے مطابق بیکر میں ایک ہریشینس پودا [مثلاً سفید رنگ کا پیٹونیا (Petunia)] رکھیں۔

3- اپریٹس کورات بھر کے لیے رکھ دیں۔

4- تنے کا طوی تراشا کاٹیں۔ (زائلم میں ای او سین کی موجودگی کی مزید تحقیق کے لیے آپ تنے کا عمودی تراشا بھی کاٹ سکتے ہیں)۔



شکل 9.7.1: کئے ہوئے تنے میں پانی کا راستہ معلوم کرنے کے لیے تجرباتی سیٹ اپ

- 5- تراشے کا معائنہ کریں اور ڈائی سیکنگ مائیکروسکوپ کے نیچے اس کا مشاہدہ کریں۔
- 6- استرے کے ساتھ جڑ اور پتے کا عرضی تراشہ کاٹیں اور اسے کم اور زیادہ پاورز میں دیکھیں۔
- 7- مختلف سیز کے سائز کا موازنہ کریں جن میں پانی حرکت کرتا ہے۔
- ☆ اپنے مشاہدات کی ڈایا گرام بنائیں۔



.....

.....

.....



- 1- پانی کا تنے میں سے گزر کر پتوں تک جانے کا راستہ بیان کریں، جو آپ کے تجربہ سے ظاہر ہوا۔


.....

.....


- 2- اگر پودے کے پتوں پر سیلو فین (cellophane) پیپر چڑھا دیا جائے تو ہم تنے میں پانی کی حرکت کا مشاہدہ نہیں کریں گے۔ ایسا کیوں ہے؟

.....

.....



مائیکروسکوپ کے نیچے تیار شدہ سلائڈز اور فوٹو مائیکروگرافس سے ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز کی شناخت کرنا




تاریخ:

کیا آپ جانتے ہیں؟

انسانی جسم میں ہر سیکنڈ میں 15 ملین بلڈ سیلز بنائے اور توڑے جا رہے ہوتے ہیں۔



بلحاظ حجم خون 44% ریڈ بلڈ سیلز، 1% وائٹ بلڈ سیلز، پلیٹلیٹس اور 55% پلازما پر مشتمل ہوتا ہے۔ ریڈ بلڈ سیلز (اریتھروسائٹس) آکسیجن کی ٹرانسپورٹ کے ذمہ دار ہیں۔ وائٹ بلڈ سیلز (لیوکوسائٹس) دو طرح کے ہوتے ہیں یعنی گرینولوسائٹس (granulocytes) اور اے گرینولوسائٹس (agranulocytes)۔ گرینولوسائٹس کی مزید تین اقسام ہیں: نیوٹروفیلز (neutrophils) جراثیموں کو تباہ کرتے ہیں، ای وینوفیلز (eosinophils) پیراسائٹس پر حملہ کرتے ہیں، اور بیسوفیلز (basophils) انفلیکشن کرتے ہیں۔ اے گرینولوسائٹس بھی دو طرح کے ہیں: مونوسائٹس (monocytes) کا کام میکروفج (macrophage) بنانا ہے جبکہ لمفوسائٹس (lymphocytes) کا کام مدافعت پیدا کرنا ہوتا ہے۔



شکل 9.8.1: مختلف بلڈ سیلز کی اشکال

انسانی خون کی تیار شدہ سلائڈز، مائیکروسکوپ، فوٹو مائیکروگرافس



1- مائیکروسکوپ کی کم اور زیادہ پاؤرز کے نیچے بلڈ سیلز کی تیار شدہ سلائڈز کا مشاہدہ کریں۔

2- فوٹو مائیکروگرافس میں ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز کا مشاہدہ کریں۔



☆ بلڈ سیلز کی اشکال کے حوالہ سے اپنے مشاہدات ریکارڈ کریں۔ بلڈ سیلز کی مختلف اقسام کی تصاویر بھی بنائیں۔



سیل کی قسم	بیان	ڈرائینگ





ذہنی آزمائش

☆ غذائیں آئرن (iron) کی کمی کس طرح خون کی آکسیجن لے جانے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہے؟

☆ انسان کے بالغ ریڈ بلڈ سیل کے اندر نیوکلیس اور مائٹوکانڈریا نہیں ہوتے۔ یہ بنیادی طور پر ہیموگلوبن کے گرد ایک ممبرین پر مشتمل ہوتا ہے۔ تجویز دیں کہ انسان کے ریڈ بلڈ سیلز کی اس سادہ تنظیم کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔

1- ریڈ بلڈ سیلز اور بلڈ کیپریز کے ڈایا میٹرز کا آپس میں کیا تعلق ہے؟



2- کیا ریڈ بلڈ سیل ایک سخت ساخت رکھتا ہے یا یہ ایک لچکدار ساخت ہے؟

3- ایک سائنسدان نے سطح سمندر پر اور 5860 میٹرز بلند پہاڑی علاقہ میں رہنے والے لوگوں میں ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد کی تحقیق کی۔ اس تحقیق کے نتائج اس طرح تھے۔

سطح سمندر پر: 5.0 ملین فی مکعب ملی میٹر

5860 میٹرز پر: 7.4 ملین فی مکعب ملی میٹر

ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد میں یہ فرق کیوں ہے؟ وضاحت کریں۔



نبض کی رفتار پر جسمانی سرگرمی کا اثر معلوم کرنا

تاریخ:

جب دل جسم میں خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے تو جلد کے قریب چند بلڈ ویسلز میں نبض محسوس کی جاسکتی ہے۔ جب کوئی شخص جسمانی مشقت یا ورزش میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی نبض کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔



سٹاپ واچ (stop watch)، یارسٹ واچ (wrist watch)



شکل 9.9.1: نبض معلوم کرنے کا طریقہ

احتیاطیں

☆ جسمانی کام آپ کی عمر اور صحت کے لحاظ سے زیادہ مشقت طلب نہیں ہونا چاہیے۔

1- اپنے ہاتھ کی ہتھیلی والی جانب کو اوپر کی طرف کریں۔

2- دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی (index finger) اور دو میانی انگلی کو اپنی کلائی پر رکھیں (ہاتھ کے نچلے کنارے سے تقریباً 1 انچ نیچے)۔

3- اس مقام پر گہرائی میں اپنی انگلیوں کو تھوڑا

دبا لیں۔ آپ کو ایک پھڑک (throbbing) محسوس ہوئی چاہیے، جو کہ آپ کی نبض ہے۔

4- ایک منٹ تک (throbbing) کی تعداد گنتیں۔ یہ آرام کی حالت میں فی منٹ آپ کی نبض کی رفتار ہوگی۔

5- ایک منٹ تک کوئی جسمانی مشقت کریں مثلاً بھاگنا، اچھلنا یا کوئی اور کام کرنا۔ اس مشقت کے بعد، اسی طریقہ

(مرحلہ 1 سے 4) سے اپنی نبض کی رفتار معلوم کریں۔

6- جسمانی مشقت 5 منٹ تک کریں اور اپنی نبض کی رفتار معلوم کریں۔

نبض کی رفتار (فی منٹ)	
آرام کے وقت	
1 منٹ کے کام (ورزش) کے بعد	
5 منٹ کے کام (ورزش) کے بعد	



☆ کیا تمام طلبہ کی نبض کی رفتار ایک ہی ہے یا مختلف؟

☆ تمام طلبہ کی نبض کی رفتار اوسطاً کیا ہے؟

.....

.....

.....

.....




ذہنی آزمائش

☆ بہت سخت مشقت کے بعد ایک شخص کچھ دیر تک گہرے اور تیز سانس لیتا ہے۔ وضاحت کریں کہ زیادہ مشقت سے کس طرح گہرے اور تیز سانس کی تحریک ملتی ہے۔



1- اگر ایک شخص کا بہت سا خون ضائع ہو جاتا ہے، مثلاً کسی ایکسیڈنٹ میں، تو اس کی نبض بہت کمزور ہو سکتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟

-1




2- اگر آپ کے بازو کے گرد ایک پٹی (bandage) باندھی گئی ہوتی، تو آپ کو اپنی نبض بالکل بھی محسوس نہ ہوتی۔ وجہ بتائیں۔

-2

3- جب مشقت کا کام شروع ہوتا ہے تو دل کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے تیز دھڑکنا چاہیے؟

-3

مچھلی کی دُم یا فین (fin) یا مینڈک کے پاؤں کی انگلیوں کے جال میں موجود کپریز میں خون کے بہاؤ کا مشاہدہ کرنا



تاریخ:

کپریز سب سے چھوٹی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جو آرٹریولز (arterioles) کی تقسیم سے بنتی ہیں۔ کپریز خون اور ٹشو فلوئڈ کے مابین میٹیریلز کے تبادلہ کی ذمہ دار ہیں۔ یہ آکسیجن میں مل کر وینیکلز (venules) بناتی ہیں۔ وینیکلز آکسیجن میں مل کر وینز بن جاتی ہیں۔ مچھلیوں کی جلد کے نیچے کپریز کا وسیع جال موجود ہوتا ہے۔




احتیاطیں

☆ تجربہ کے دوران کاشن کے ٹکڑوں پر مسلسل پانی ڈالیں۔ کاشن کے ٹکڑے خشک نہیں ہونے چاہئیں۔

مچھلی، مائیکروسکوپ، گلاس سلائیڈز، کاشن، پیٹری ڈش



- 1- کاشن کا پتلا ٹکڑا (wad) پیٹری ڈش کے پینڈے پر ایک کنارے پر رکھیں۔
- 2- شکل کے مطابق، دوسرے کنارے پر ایک سلائیڈ رکھیں۔
- 3- ایکویریئم (aquarium) یا پانی کے جار (jar) میں سے ایک مچھلی نکالیں اور اسے اس طرح سے پیٹری ڈش پر رکھیں کہ اس کا جسم گیلی کاشن کے اوپر ہو اور دم سلائیڈ کے اوپر ہو۔
- 4- کاشن کا ایک موٹا ٹکڑا مچھلی کے اوپر رکھیں اور اس کی دم پر ایک اور سلائیڈ رکھ دیں۔ کاشن کے دونوں ٹکڑوں پر پانی کے قطرے گراتے رہیں اور انہیں گیلیا رکھیں۔
- 5- مائیکروسکوپ کی سٹیج سے کلپ (clips) اتاریں۔ پیٹری ڈش کو سٹیج پر اس طرح رکھیں کہ مچھلی کی دم سٹیج کے سوراخ کے اوپر ہو۔
- 6- مائیکروسکوپ کو دم پر فوکس کریں اور دم کا وہ حصہ ایڈجسٹ کریں جہاں سے بلڈ کپریز کا مشاہدہ ہو سکے۔



شکل 9.10.1: مچھلی کی دم میں کپریز میں خون کے بہاؤ کے مشاہدہ کا تجربہ جاتی سیٹ اپ



.....

.....

.....

.....

مچھلی کی دم میں دکھائی دینے والے کپھریز کے جال کی ساخت بنائیں۔

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....


.....

1- خون کے بہاؤ کی سب سے آہستہ رفتار کپھریز میں کیوں ہوتی ہے؟

.....

.....

.....



2- سرکولیٹری سسٹم میں سب سے کم بلڈ پریشر (blood pressure) کہاں ہوتا ہے؟

.....