

بائیولوجی

پریکٹیکل نوٹ بُک

گریڈ X

Web Version of PCTB Textbook



giz

پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بُک بورڈ، لاہور

جملہ حقوق بحق پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ محفوظ ہیں

اس کتاب کا کوئی حصہ نقل یا ترجمہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اسے ٹیٹ پیپر، گائیڈ بکس، خلاصہ جات، نوٹس یا امدادی کتب کی تیاری میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مصنفین

- 1- مسز ریحانہ جوہر
 - 2- ایم ندیم اصغر
 - 3- غفران احمد آصف
 - 4- مسز روبیلہ شبیر
 - 5- مسز ارم حبیب
 - 6- عطیہ رزاق
 - 7- ڈاکٹر فرخندہ منظور
- سینئر سبجیکٹ سپیشلسٹ بائیولوجی (ریٹائرڈ)، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور
- ڈپٹی سیکرٹری، ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ۔
- سبجیکٹ سپیشلسٹ (بائیولوجی)، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور
- سبجیکٹ سپیشلسٹ (بائیولوجی)، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور
- سائنس ٹیچر، پگن ہاؤس سکول، جوہر ٹاؤن، لاہور
- ریسرچ سکالر، سنٹر آف ایپلیڈ انسٹیٹیوٹ، لاہور
- پروفیسر، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی، لاہور

کمپوزنگ، لے آؤٹ
اینڈ اسٹریٹنگز:
حافظ انعام الحق

ڈائریکٹر (مینوسکریپٹس)

محترمہ ریحانہ فرحت

مترجم

ایم ندیم اصغر

ڈپٹی ڈائریکٹر (گرافکس)

سیدہ انجم واصف

نگران طباعت

روبیلا شبیر

ایڈیٹر

- 1- ایم ندیم اصغر
- 2- مسز ریحانہ جوہر
- 3- ڈاکٹر ذوالفقار علی ثاقب
- 4- غفران احمد آصف



سرٹیفکیٹ

تصدیق کی جاتی ہے کہ:

طالب علم

کلاس

_____ رول نمبر _____

سکول

نے بائیولوجی 10 کے پریکٹیکل سیشن _____ مکمل کر لیے ہیں۔

دستخط سائنس ٹیچر

دستخط ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ

Web Version of PCTB Textbook

فہرست تجربات

باب نمبر 10: گیسوں کا تبادلہ: Gaseous Exchange

- 10.1 آرام کی حالت اور ورزش کے بعد تنفس کی رفتار (Breathing rate) کا موازنہ کرنے کے لیے سرگرمی 1
- 10.2 پھیپھڑوں میں لے جائی جانے والی ہوا کی مقدار معلوم کرنے کا تجربہ 4
- 10.3 سانس کے ذریعہ باہر نکالی جانے والی ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی موجودگی دکھانا 7
- 10.4 سگریٹ کے دھوئیں میں ٹار (Tar) کی موجودگی دکھانا؛ چارٹس اور تصاویر کے ذریعہ سموکرز (smokers) اور نان سموکرز (non-smokers) کے پھیپھڑوں میں فرق دکھانا 10

باب نمبر 11: ہومیوسٹیسس: Homeostasis

- 11.1 گردے (بھیڑ کا گردہ یا ماڈل) کی ساخت کا معائنہ 13

باب نمبر 12: کوآرڈینیٹیشن: Coordination

- 12.1 دو اقسام کی کوآرڈینیٹیشن سے پیدا ہونے والے ریسپانس (Response) کی تیزی میں فرق کا مشاہدہ کرنا اور ریکارڈ کرنا [ایک طالب علم / طالبہ کو جماعت کے سامنے چند الفاظ بولنے کا کہیں اور اس کی دھڑکن کی رفتار (Heartbeat) میں تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں] 16
- 12.2 میتھلین بلیو (Methylene blue) سے بھری پیٹری ڈش میں 12 وولٹ (Volt) ڈائریکٹ کرنٹ (Direct Current) استعمال کر کے مینڈک کی پنڈلی کے مسلز کا سکڑنا دیکھنے کے لیے تجربہ 19
- 12.3 نیل یا بھیڑ کی آنکھ کے طولی تراشہ میں مختلف حصوں کی شناخت کرنا اور اس کی ڈایا گرام بنا کر لیبل کرنا 22

باب نمبر 13: سہارا اور حرکت: Support and Movement

- 13.1 ہڈی کی کیمیائی ترکیب کی تحقیق کرنا (بھیڑ کی ہڈی کے تین ٹکڑے پانی، NaOH اور ڈائلیوٹ HCl میں رکھ کر) 26

باب نمبر 14: ریپروڈکشن: Reproduction

- 28 14.1 سلائڈز، فوٹو مائیکروگرافس (photomicrographs) اور چارٹس کے ذریعہ امیبا (*Amoeba*) میں بائنری فشن (Binary Fission) کا مشاہدہ کرنا
- 30 14.2 تیار شدہ سلائڈز سے پیسٹ (yeast) میں بڈنگ (budding) کا مشاہدہ کرنا
- 32 14.3 بلب (بیاز)، کورم (اروی)، رائی زوم (ادرک) اور سٹیم ٹیوبر (آلو) کا مشاہدہ کرنا اور نئے پودے حاصل کرنے کے لیے ان کی کاشت کرنا
- 37 14.4 گلاب یا علاقہ میں دستیاب کسی دوسرے پودے کی سٹیم کٹنگ (Stem Cutting) اور پتھر چٹ یعنی برائیوفائلم (*Bryophyllum*) کے پتے سے پودوں کی نسل بڑھانا
- 41 14.5 سرسوں کے پھول، پھنے کے بیج اور مکی کے دانے (بیج) کا مطالعہ کرنا
- 45 14.6 بیج کے اگنے (جرمینیشن: Germination) کی شرائط کی تحقیق کرنا

باب نمبر 15: وراثت: Inheritance

- 49 15.1 ہم جماعت طلبہ کے قد ماپ کر معلوم کرنا کہ یہ کس طرح کا تغیر (Variation) ہے اور طلبہ کے قد کے اعداد و شمار کو ہسٹوگرام (Histogram) یا بار چارٹ (Bar Chart) کے گرافس (Graphs) بنا کر پیش کرنا

باب نمبر 16: انسان اور ماحول: Man and Environment

- 52 16.1 ایک ایکوسسٹم (Ecosystem) مثلاً اکویریم (Aquarium) یا تالاب (Pond) کی تحقیق کرنا

باب نمبر 17: بائیو ٹیکنالوجی: Biotechnology

- 55 17.1 آٹے اور دودھ کی فرمینیشن (Fermentation) میں پیسٹ (Yeast) اور بیکٹیریا کے کردار کی تحقیق کرنا

گیسوں کا تبادلہ


آرام کی حالت اور ورزش کے بعد تنفس کی رفتار (Breathing rate) کا موازنہ کرنے کے لیے سرگرمی



تجربہ
10.1

تاریخ:

تنفس کی رفتار یعنی بریڈنگ ریٹ (breathing rate) سے مراد فی منٹ لیے جانے والے سانس (breath) کی تعداد ہے۔ تنفس کے دو مراحل ہیں یعنی ایک انہیلیشن (inhalation) یعنی ”ہوا اندر لے جانا“ اور ایک اگیزہیلیشن (exhalation) یعنی ”ہوا باہر نکالنا“۔ تنفس کا عمل پیچھڑوں، پسلیوں (ribs) اور ڈایافراگم (diaphragm) کی حرکات کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ انہیلیشن کے دوران، ڈایافراگم سکڑتا ہے اور پسلیاں کھل جاتی ہیں جس کی وجہ سے سینے کا خلا (chest cavity) بڑا ہو جاتا ہے۔ پیچھڑے پھیلتے ہیں اور باہر سے ہوا تیزی کے ساتھ پیچھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگیزہیلیشن کے دوران، ڈایافراگم اور پسلیاں اپنی نارمل حالت میں واپس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سینے کا خلا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ پیچھڑے سکڑتے ہیں اور ہوا پیچھڑوں سے باہر نکل جاتی ہے۔ تنفس کی رفتار کئی عوامل پر منحصر ہے یعنی اونچائی، پیچھڑوں کی گنجائش (lung capacity)، صحت اور سرگرمی کا لیول (آرام یا ورزش)۔ یہاں ہم یہ جانیں گے کہ سرگرمی کے لیول میں تبدیلی سے کس طرح تنفس کی رفتار میں تبدیلی آتی ہے۔



سٹاپ واچ (stopwatch)



طلبہ یہ سرگرمی گروپس کی شکل میں کریں گے۔ ہر گروپ میں ایک طالب علم / طالبہ نوٹ کرنے والا (observer) ہوگا، جس کا کام گروپ کے دوسرے طلبہ کے مشاہدات کو ریکارڈ کرنا ہوگا۔



- 1- نوٹ کرنے والے طالب علم / طالبہ سے کہیں کہ گروپ کے دوسرے طلبہ میں آرام کی حالت میں (بیٹھے ہوئے) تنفس کی رفتار معلوم کرے اور اسے ریکارڈ کرے۔
- 2- پانچ منٹ تک کوئی ہلکی ورزش کریں (مثلاً چلنا)۔
- 3- نوٹ کرنے والے طالب علم / طالبہ سے تنفس کی رفتار معلوم کرنے اور مشاہدات نوٹ کرنے کا کہیں۔
- 4- پندرہ منٹ کے آرام کے بعد پانچ منٹ تک زیادہ ورزشی کام کریں (مثلاً بھاگنا)۔
- 5- نوٹ کرنے والے طالب علم / طالبہ سے دوبارہ گروپ کے ارکان کے تنفس کی رفتار ریکارڈ کرنے کا کہیں۔



⚠ احتیاط

☆ دمہ (asthma) یا دل کے امراض میں
بتلا طلبہ کو اس ورزشی کام میں حصہ نہیں لینا
چاہیے۔

طلبہ کھڑے ہوئے ہیں جب کہ ایک نوٹ کرنے والا طالب علم ان کے تنفس کی رفتار نوٹ کر رہا ہے۔



طلبہ کچھ وقت کے لیے بھاگتے ہیں اور ان کے رکنے کے بعد ایک نوٹ کرنے والا طالب علم / طالبہ ان کے تنفس کی رفتار نوٹ کرے گا/گی

شکل 10.1: آرام کے وقت اور ورزش کے بعد تنفس کی رفتار

ٹیبیل: تنفس کی رفتار


طالب علم / طالبہ کا نمبر	آرام کے وقت	ہلکی ورزش کے بعد	وزنی ورزش کے بعد
1			
2			
3			
4			
5			
اوسط			



ان تمام مشاہدات کا موازنہ کریں اور نتائج کی وضاحت کریں۔



1- تنفس کا محرک (stimulus) کیا ہوتا ہے؟ (i) خون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ارتکاز، (ii) ایلویولائی (alveoli) میں موجود ہوا کے اندر کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ارتکاز، (iii) خون میں آکسیجن کا ارتکاز یا (iv) ایلویولائی میں موجود ہوا کے اندر آکسیجن کا ارتکاز!



2- ورزش کے بعد تنفس کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور تنفس مزید گہرا بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟

دفنی آزمائش



- ☆ تنفس کے دوران اندر داخل ہونے والی اور باہر خارج ہونے والی ہواؤں کی ترکیب میں کیا فرق ہیں؟
- ☆ زیادہ محنت طلب ورزش کے بعد آپ کے مسلز میں تھکاوٹ (fatigue) ہو جاتی ہے۔ ایسا کس طرح ہوتا ہے؟



تجربہ
10.2

پھیپھڑوں میں لے جانی جانے والی ہوا کی مقدار معلوم کرنے کا تجربہ

تاریخ:

ریسپریشن سے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ہوا اور خون کے درمیان گیسوں کا تبادلہ پھیپھڑوں میں ہوتا ہے جن کے اندر ایلیو لائی (alveoli) یعنی ہوا کی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں اور خون کی چھوٹی نالیوں یعنی پلموئری کپلریز (pulmonary capillaries) کا جال ہوتا ہے۔ ان دو ساختوں میں دونوں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے یعنی آکسیجن ایلیو لائی سے کپلریز میں ڈیفوز (diffuse) کر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کپلریز سے ایلیو لائی میں ڈیفوز کر جاتی ہے۔ جب ہم سانس اندر کھینچتے ہیں، پھیپھڑوں میں تازہ ہوا داخل ہوتی ہے اور ہر ایلیو یولس تک پہنچ جاتی ہے۔ گیسوں کے تبادلہ کے بعد، ایکسپیریشن (expirations) میں ہوا باہر نکال دی جاتی ہے۔ ہوا کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو سب سے زیادہ ممکن گہرے تنفس کے دوران پھیپھڑوں میں سانس کی مجموعی گنجائش (total lung capacity) کہلاتی ہے۔ بالغ انسان میں پھیپھڑوں کی مجموعی گنجائش اوسطاً 5 لیٹرز ہے۔ نارمل تنفس کے دوران، ہر سانس میں پھیپھڑوں میں داخل ہونے والی اور باہر نکلنے والی ہوا کے حجم کو ٹائیدل والیوم (tidal volume) کہتے ہیں۔ یہ مقدار مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہے۔ ایک نوجوان بالغ لڑکے کا اوسط ٹائیدل والیوم 500 ملی لیٹرز جبکہ نوجوان لڑکی کا 387 ملی لیٹرز ہے۔



بیکر، ریٹورٹ سٹینڈ (retort stand)، ڈیلیوری ٹیوب (delivery tube)، درجہ ٹیوب (graduated tube) کی نشان زدہ ٹیوب




1- ایک بیکر لے کر اس میں پانی بھریں۔

2- 500 ملی لیٹرز کی ایک نشان زدہ ٹیوب یا سلنڈر لیں اور اسے بھی پانی سے بھریں۔

3- شکل کے مطابق نشان زدہ ٹیوب یا سلنڈر کو پانی سے بھرے بیکر یا پیا لے (trough) میں الٹادیں۔




- 4 ایک ڈیلیوری ٹیوب / یا ر ہڑ ٹیوب کے ذریعہ نشان زدہ ٹیوب یا سلنڈر میں اپنے ایک سانس کی ہوا نکالیں۔ یہ ہوا نشان زدہ ٹیوب یا سلنڈر میں موجود پانی کو نیچے کی جانب دھکیل دیتی ہے۔
- 5 ریکارڈ کریں کہ نشان زدہ ٹیوب یا سلنڈر میں پانی کی کتنی مقدار نیچے گری ہے۔



شکل 10.2: سانس کے ذریعہ اندرجانے اور باہر آنے والی ہوا کی مقدار ماپنا

☆ نشان زدہ ٹیوب یا سلنڈر میں پانی کی نیچے گرنے والی مقدار کو نوٹ کریں۔ یہ مقدار ہوا کی اس مقدار کو ظاہر کرتی ہے جو ایک انسان سانس کے ذریعہ اندر کھینچ سکتا ہے یا باہر نکال سکتا ہے۔





1- زیادہ اونچائی والے علاقوں میں رہنے کا ٹائیدل والیوم (tidal volume) پر کیا اثر ہوتا ہے؟

.....

.....

.....

2- کون سے عوامل ٹائیدل والیوم اور پھیپھڑوں کی مجموعی گنجائش پر اثر ڈالتے ہیں؟

.....

.....

.....

.....

.....

ذہنی آزمائش



- ☆ زیادہ جسمانی کام کرنے سے کیا ٹائیدل والیوم بھی بڑھ جاتا ہے؟
- ☆ پھیپھڑوں کے اندر آکسیجن ایلوپولانی سے نکل کر خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ کون سی خصوصیات اس عمل کو تیز بناتی ہیں؟



سائنس کے ذریعہ باہر نکالی جانے والی ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی موجودگی دکھانا

تاریخ:

تنفس کے دوران ہوا پھیپھڑوں کے اندر کھینچی جاتی ہے (انہیلیشن) اور باہر نکالی جاتی ہے (ایگزہیلیشن) اور ہوا اور خون کے درمیان گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں کے اندر ہوا سے آکسیجن لے کر خون میں ڈال دی جاتی ہے اور خون سے کاربن ڈائی آکسائیڈ نکال کر ہوا میں ڈال دی جاتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ چونے کے پانی (limewater) کو دودھیا کر دیتی ہے۔



مخروطی فلاسکس (conical flasks)، ڈیلیوری ٹیوب، چونے کا پانی، کارکس (corks)



1- دو مخروطی فلاسکس لیں۔ ایک پر "A" اور دوسری پر "B" لکھ دیں۔

2- ہر فلاسک کا 1/4 حجم چونے کے پانی سے بھر دیں۔

3- فلاسک "B" کو کارک سے بند کر دیں۔

4- ایک اور کارک میں سے شیشہ کی ایک تالی گزاریں اور اسے فلاسک "A" کے منہ پر فکس (fix) کر دیں۔

5- گہرا سانس اندر کھینچیں اور ہوا کو شیشہ کی ٹیوب کے ذریعہ فلاسک "A" میں نکالیں۔



احتیاطیں


☆ اپنے سانس کی ہوا ڈیلیوری ٹیوب میں نکالنے سے پہلے اس کا منہ اٹھوٹھے سے بند رکھیں تاکہ فضائی ہوا فلاسک میں داخل نہ ہونے پائے۔

☆ چونے کے پانی کو نہ نگھیں کیونکہ یہ خطرناک ہوتا ہے۔



کیا آپ جانتے ہیں؟

تنفس کا محرک خون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا زیادہ ارتکاز ہوتا ہے۔




شکل 10.3: تجرباتی سیٹ اپ

دونوں فلاسکس میں (چونے کے پانی میں) رنگوں کی تبدیلی کا مشاہدہ کریں۔




فلاسک "A"



فلاسک "B"





-1

جو نتیجہ آپ نے نوٹ کیا صرف اس کاربن ڈائی آکسائیڈ کی وجہ سے ہے کہ جو آپ نے سانس کے ذریعہ باہر نکالی تھی، نہ کہ ارد گرد کی ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کی وجہ سے۔ اس بات کے حق میں دلائل دیں۔

.....

.....

-2

جب چو نے کاپانی کاربن ڈائی آکسائیڈ سے ملتا ہے تو کون سا کمپاؤنڈ بنتا ہے؟

.....

.....

-3

اس تجربہ میں کون سی فلاسک ”کنٹرول“ کے طور پر کام کر رہی ہے؟ دلائل دیں۔

.....

.....

ذہنی آزمائش



☆ فضائی ہوا کی نسبت سانس کے ذریعہ باہر نکالی جانے والی ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟

☆ ایک جانور کو ایسے اپریٹس میں رکھا جاتا ہے جہاں وہ مسلسل ایک ہی ہوا میں بار بار سانس لیتا ہے۔ اس جانور کے تنفس کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟

سگریٹ کے دھوئیں میں ٹار (Tar) کی موجودگی دکھانا

چارٹس اور تصاویر کے ذریعہ سموکرز (smokers) اور نان سموکرز (non-smokers)

کے پھیپھڑوں میں فرق دکھانا



تجربہ
10.4

تاریخ:

سگریٹ کے دھوئیں میں بے شمار کارسی نوجنز (carcinogens)، ایسے مادے جو کینسر کی وجہ بن سکتے ہیں، زہریلی گیسیں (کاربن مانو آکسائیڈ، ہائیڈروجن سائیائیڈ: Hydrogen cyanide) اور دوسرے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں۔ ان کیمیکلز میں سے ایک کو ٹار (tar): بھورے رنگ کا چپکنے والا مادہ] کہتے ہیں، جو کہ سموکرز کے پھیپھڑوں میں جم جاتا ہے اور پھر یہاں سے خون میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ کیمیکل ہوا کی نالی اور پھیپھڑوں کے سیلز کو بھی تباہ کرتا ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایک تیز نشہ آور دو اٹوٹین (nicotine) بھی ہوتی ہے۔ خون میں ٹوٹین کی 0.07 گرام مقدار بھی زہریلی ہو سکتی ہے۔




فلٹر (filter) کے بغیر سگریٹ، لٹینٹ، ماچس کی ڈبیا، فنل (funnel)، سفید نشو پیر، کاٹن، سموکر اور نان سموکر کے پھیپھڑوں کی تصاویر



حصہ اول:

- 1- شکل کے مطابق ایک جلتی ہوئی سگریٹ کو شینڈ پر لگائیں۔
- 2- سگریٹ کے اوپر شینڈ میں ایک فنل لگائیں۔
- 3- فنل کی نلی کے اوپری کنارے کو کاٹن سے بند کریں۔



شکل 10.4: سگریٹ کے دھوئیں میں ٹار کی موجودگی دیکھنے کے لیے تجربہ کا سیٹ اپ

احتیاطیں

☆ تجربہ سے پہلے فنل کو صاف کر لیں۔

☆ سگریٹ کے دھوئیں کو سانس کے ذریعے اندر مت لے جائیں کیونکہ یہ صحت کے لیے مضر ہے۔

☆ سگریٹ کو خود سے مت جلائیں۔

☆ فنل کی اندرونی سطح پر سفید ٹشو پیپر رگڑ کر اس پر ٹار کی موجودگی کا مشاہدہ کریں۔



حصہ دوم:

☆ ایک سموکر اور ایک نان سموکر کے پھیپھڑوں کی تصاویر کا معائنہ کریں اور مشاہدہ کریں کہ دھوئیں کی ٹار سموکر کی بروئیکل ٹیوبز (bronchial tubes) کی دیواروں پر اکٹھی ہو جاتی ہے۔

☆ نان سموکرز کے پھیپھڑوں کا موازنہ سموکرز کے پھیپھڑوں سے کریں اور اپنے مشاہدات کو نوٹ کریں۔

☆ مندرجہ ذیل فوٹو گرافس دیکھیں۔ ایک نارمل شخص اور ایک سموکر کے سینے کے خلا میں دل کی پوزیشن میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟



نان سموکر کے پھیپھڑے اور دل

سموکر کے پھیپھڑے اور دل



.....

.....

.....

.....

تمباکو نوشی (سمونگ) کے اہم اثرات کیا ہیں؟

-1



.....

.....

.....

.....

پھیپھڑوں پر ثار کے کیا اثرات ہیں؟

-2

حکومت کی طرف سے سمونگ سے لوگوں کی حوصلہ شکنی اور پیسو (passive) سمونگ کے نقصانات کم کرنے کی خاطر اٹھائے جانے والے کوئی سے تین اقدامات لکھیں۔

-3

.....

.....

.....

ذہنی آزمائش



☆ کیا کوٹین کی کم مقدار فائدہ مند ہوتی ہے؟

☆ سموکرز میں ہارٹ ایٹیک (heart attack) کا زیادہ خطرہ کیوں ہوتا ہے؟

ہومیو سٹیسس



تجربہ
11.1

◀ گردے (بھیڑ کا گردہ یا ماڈل) کی ساخت کا معائنہ

تاریخ:

یورینری سسٹم (urinary system) کے اہم آرگنز گردے ہیں۔ یہ لوہیے کے بیج کی شکل کی ساختیں ہیں اور پیٹ یعنی لیڈائن (abdomen) کے خلا میں جسم کی ڈارسل (dorsal) دیوار کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ میملو کے جسم میں دو گردے ہوتے ہیں۔ بائیں گردہ دائیں کی نسبت تھوڑا اونچا ہوتا ہے۔ گردے کی مقعر (concave) جانب ایک گڑھا ہوتا ہے جسے ہیلکس (hilus) کہتے ہیں۔



نیم شفاف ممبرین جو گردے کی بیرونی سطح کے ساتھ مضبوطی سے جڑی ہوتی ہے، رینل کپسول (renal capsule) کہلاتی ہے۔ رینل کارٹیکس (renal cortex) گردے کا بیرونی حصہ ہے۔ اس کی رنگت گہری سرخ ہے اور یہ رینل کپسول کے بالکل نیچے ہے۔ رینل میڈولا (renal medulla) کی رنگت ہلکی سرخ ہے۔ یہ گردے کا اندرونی حصہ ہے اور رینل کارٹیکس سے اندر کی طرف موجود ہے۔ رینل میڈولا بہت سے مخروطی حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ مخروطی حصے رینل پائرامڈز (pyramids) کہلاتے ہیں اور ان کے نوکیلے کنارے ایک کیوبیٹی کی طرف لگے ہوتے ہیں جسے رینل پیلووس (pelvis) کہتے ہیں۔

کیا آپ جانتے ہیں؟
گردے آپ کے جسم میں پانی اور نمکیات کی مقداروں کو کنٹرول کرتے ہیں۔

بھیڑ کے گردے کے ماڈل یا چارٹس، محفوظ کیا گیا، بھیڑ کا گردہ، ڈائی سیکن باکس، سوڈیم کلورائیڈ کا 1% سولوشن، ہینڈ لینز (handlens)، بورڈ



1- مہیا کیے گئے چارٹ یا ماڈل سے بھیڑ کے گردے کے مختلف حصوں کا مشاہدہ کریں۔

2- بھیڑ کا ایک تازہ گردہ حاصل کریں۔



3- اس پر سے چکنائی اتار کر اس کی بیرونی ساخت دیکھیں اور یورینر (ureter)، رینل آرٹری، اور رینل وین سامنے لائیں۔

4- گردے کو نمکین (saline) پانی 1% [سوڈیم کلورائیڈ سولوشن] میں رکھ کر آہستہ آہستہ ملیں یعنی مساج (massage) کریں تاکہ اس کی تالیوں میں موجود مواد باہر نکل جائے۔



5- ایک تیز اُسترے (razor) کی مدد سے گردے کو وسط سے لمبائی کے رخ کاٹیں۔

6- ہینڈ لینز کی مدد سے گردے کی اندرونی ساخت کا مشاہدہ کریں۔



شکل 11.1: بھیڑ کے گردے کی ڈائی سیکشن


☆ بھیڑ کے گردے کی بیرونی اور اندرونی ساخت کے حوالہ سے اپنے مشاہدات کی ڈایا گرامز بنائیں۔





Blank lined area for writing.

1- گردے کی ساخت اور فعل کی بنیادی اکائی کیا ہے؟



Blank lined area for writing.

2- گردے کی کون سی سطح ورٹیکل کالم (vertebral column) کی طرف ہوتی ہے؟ کنکلیو یا کنوکیس!

Blank lined area for writing.

ذہنی آزمائش



☆ گردے کے طویل تراشہ میں بیرونی حصہ اندرونی حصہ کی نسبت زیادہ گہرے رنگ کا کیوں ہے؟

☆ بلڈ پریشر (blood pressure) کو کنٹرول کرنے میں گردوں کا کیا کردار ہے؟

کوآرڈی نیشن



تجربہ
12.1

دو اقسام کی کوآرڈی نیشن سے پیدا ہونے والے ریسپانس (Response) کی تیزی میں
 فرق کا مشاہدہ کرنا اور ریکارڈ کرنا [ایک طالب علم / طالبہ کو جماعت کے سامنے چند الفاظ بولنے
 کا کہیں اور اس کی دھڑکن کی رفتار (Heartbeat) میں تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں]

تاریخ:

جاندار کسی محرک یعنی سٹیمولس (stimulus) کے خلاف رد عمل (ریسپانس) پیدا کرنے یا عمل کر دینے کی صلاحیت رکھتے
 ہیں۔ ریسیپٹرز (receptors) یا سنس آرگنز (sense organs) سٹیمولس کو محسوس کرتے ہیں۔ ریسپانس پیدا کرنے کا
 کام ایفیکٹر (effector) یعنی مسل یا گلینڈ کرتا ہے۔ انسان کے جسم میں نروس (nervous) اور ہارمونل (hormonal)
 کنٹرول کے ذریعہ کوآرڈی نیشن پیدا ہوتی ہے۔ نروس سسٹم ایسی جسمانی سرگرمیوں میں کوآرڈی نیشن کا ذمہ دار ہے جو
 ہمیں کسی بھی سٹیمولس کے خلاف مناسب رد عمل دینے کے قابل بناتی ہیں۔ اینڈوکرائن (endocrine) گلینڈز ہارمونز
 بناتے ہیں اور انہیں براہ راست خون میں خارج کرتے ہیں۔ ایڈرینل گلینڈز جوش، غصہ، لڑائی اور ذہنی تناؤ (stress) کے
 وقت ایڈرینالین (adrenaline) ہارمون بناتے ہیں اور جسم کو صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔
 ایڈرینالین تنفس اور دھڑکن کی رفتار تیز کر دیتا ہے۔ ہارمونز سے پیدا ہونے والے ریسپانسز عام طور پر نروس سسٹم سے پیدا
 ہونے والوں کی نسبت سست ہوتے ہیں۔



شناپ واچ (stopwatch)، میٹر راڈ (meter rod)، سٹیتھو سکوپ (stethoscope)



نروس کوآرڈی نیشن میں ریسپانس Response in Nervous Coordination -a

- 1- طالب علم / طالبہ A: کھڑے ہو جائیں اور ایک میٹر راڈ کا اوپری کنارہ پکڑ لیں۔
- 2- طالب علم / طالبہ B: کرسی پر بیٹھ جائیں اور اپنا انگوٹھا اور بڑی انگلی میٹر راڈ کی زیر (zero) ریڈنگ کے قریب رکھیں۔



- 3 طالب علم / طالبہ A: میٹر راڈ کو چھوڑیں؛ طالب علم / طالبہ B: جیسے ہی میٹر راڈ نیچے کرنا شروع ہو، اسے پکڑنے کی کوشش کریں۔
- 4 میٹر راڈ پر وہ مقام (ریڈنگ) نوٹ کریں جہاں طالب علم / طالبہ B نے میٹر راڈ کو پکڑ لیا ہو۔
- 5 یہ ٹیسٹ پانچ مرتبہ دوہرائیں اور فاصلہ ریکارڈ کرتے جائیں۔
- 6 پکڑا جانے والا کم سے کم فاصلہ نوٹ کریں۔

فاصلہ جہاں سے میٹر راڈ کو پکڑ لیا گیا (سینٹی میٹر میں)	
	پہلی مرتبہ
	دوسری مرتبہ
	تیسری مرتبہ
	چوتھی مرتبہ
	پانچویں مرتبہ



کم سے کم فاصلہ:

-b کیمیکل (ہارمونل) کوآرڈینیٹن میں ریسپانس

Response in Chemical (Hormonal) Coordination

- 1 اپنی ساتھی طالب علم / طالبہ سے کہیں کہ وہ آرام سے بیٹھ جائے اور پھر فی منٹ نبض (pulse) کی تعداد گن کر اس کی دھڑکن / نبض کی رفتار معلوم کریں۔
- 2 اس عمل کو کئی مرتبہ دوہرائیں اور نبض کی اوسط رفتار حاصل کریں۔
- 3 اب ساتھی سے کہیں کہ سٹیج (stage) پر آئے اور چار سے پانچ منٹ تک کوئی بات (تقریر) کرے۔
- 4 ساتھی کی تقریر ختم ہونے کے فوراً بعد اس کی دھڑکن اور نبض کی رفتار ریکارڈ کریں۔
- 5 دھڑکن کی رفتار میں تبدیلی کو نوٹ کر لیں۔



☆ مندرجہ ذیل ٹیبل میں اپنے مشاہدات ریکارڈ کریں۔


دھڑکن کی رفتار	
تقریر کے بعد	تقریر سے پہلے



☆ ریپانس کی تیزی کے لحاظ سے دونوں اقسام کی کوآرڈینیٹیشن کس طرح مختلف ہیں؟



☆ 1- اپنے جسم میں ایسے دو مقامات بتائیں جہاں سے نبض معلوم کی جاسکتی ہے؟



ذہنی آزمائش

- ☆ پودوں میں سیٹولوس - ریپانس کی ایک مثال دیں۔
- ☆ نروس کوآرڈینیٹیشن میں ایلیکٹرونز کون سے ہوتے ہیں؟

میتھلین بلیو (Methylene blue) سے بھری پیٹری ڈش میں 12 ولٹ (Volt) ڈائریکٹ کرنٹ (Direct Current) استعمال کر کے مینڈک کی پنڈلی کے مسلز کا سکڑنا دیکھنے کے لیے تجربہ




تاریخ:

ورٹبرٹس میں سکلیٹل (skeletal) مسلز وولنٹری (voluntary) ہیں اور یہ حرکت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بڑی تعداد میں مسل فائبرز (fibers) اکٹھے ہو کر ایک بڑا مسل بناتے ہیں مثلاً انسان اور مینڈک کی نخلی ٹانگ میں گیسٹرونی میس (gastrocnemius) مسل۔ جانداروں میں مسلز نرو امپلس (nerve impulse) کے عمل سے سکڑتے ہیں۔ تجرباتی طور پر مسل یا اس کے ساتھ جڑی کسی نرو (nerve) کو براہ راست برقی (electrical) سٹیمولس پہنچا کر ایک مسل کو سکڑنے کی تحریک دی جاسکتی ہے۔ یہ برقی سٹیمولس مسل کو ایک امپلس دے دیتا ہے۔ اگر مسل کے ساتھ لگی نرو کو اتنی طاقت کا برقی سٹیمولس دیا جائے جس سے ایک امپلس پیدا ہو جائے تو مسل میں ایک سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے، جسے مسل ٹوچ (twitch) یعنی پھڑکنا کہتے ہیں۔



جب ایک مسل سکڑتا ہے تو اس میں آکسیڈیشن-ریڈکشن ری ایکشنز ہوتے ہیں اور سکڑتے ہوئے مسل میں سے چند کیمیکلز بھی نکلتے ہیں۔ یہ کیمیکلز میتھلین بلیو سولیوشن کی ریڈکشن کرتے ہیں اور اس کا رنگ ختم کر دیتے ہیں۔





شکل 12.1: سکلیٹل مسل کی ساخت

بے ہوش کیا گیا مینڈک، ڈائی سیکشن باکس، میتھلین بلیو سولیوشن، رنجرز سولیوشن (Ringer's solution)، پیٹری ڈش، 12 ولٹ ڈی سی (DC) بیٹری، کاپر (copper) کی دو تاریں، ڈراپر، ویزلین (Vaseline)






- 1 ایک پیٹری ڈش کو رنر زسولیشن سے بھریں اور اس میں متھلین بائیوسولیشن کے چند قطرے شامل کریں۔
- 2 مینڈک کی پنڈلی (shin) مسل، جو کہ ٹیچر نے مہیا کیا ہوگا، کو پیٹری ڈش میں رکھیں۔



فصل 12.2: مینڈک کی ٹانگ کی جلد اتر جانے کے بعد، گیسٹروفنی میس مسل اور اس کے نیچے موجود وسائے آ جاتے ہیں

- 3 پیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل (negative terminal) کی تار کو پنڈلی کے مسل کے ایک کنارے کے ساتھ جوڑ دیں۔ مسل کے دوسرے کنارے سے ایک اور تار جوڑیں۔



فصل 12.3: 12 ولٹ کا DC کرنٹ استعمال کر کے مینڈک کے پنڈلی کے مسل کا سکڑنا

- 4 پیٹری ڈش کو ڈھانپ دیں اور ویزلین لگا کر اسے مہر بند (seal) کر دیں، تاکہ ہوا اندر داخل نہ ہو۔
- 5 تار کے آزاد کنارے کو پیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل (positive terminal) کے ساتھ جوڑیں۔

☆ پنڈلی کے مسل کے سکڑاؤ کے متعلق تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں۔






.....

.....

.....

.....

.....



میٹھلین بلیو کے رنگ میں تبدیلیوں کو نوٹ کریں۔ رنگ تبدیل ہو جانے کی وجہ بھی لکھیں۔

-1

.....

.....

.....

ایٹنا گونسٹک (antagonistic) مسئلہ کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیں۔

-2

.....

.....

.....

.....

.....

وقتی آزمائش



☆ مسل کے سکڑنے کے لیے توانائی کا ذریعہ کیا ہے اور مسلز کے اندر بہت زیادہ ماسٹو کا نڈریا کیوں پائے جاتے ہیں؟

☆ کون سی قسم کے مسلز دماغ کی طرف سے کسی ارادی (conscious) پیغام کے بغیر ہی سکڑتے ہیں؟

بیل یا بھیڑ کی آنکھ کے طولی تراشہ میں مختلف حصوں کی شناخت کرنا اور اس کی ڈایا گرام بنا کر لیبل کرنا




تاریخ:

آنکھ کو پڑی میں ہڈی کی بنی ایک ساکٹ (socket) یعنی آر بٹ (orbit) میں موجود ہوتی ہے۔ آئی بال (eyeball) فلوئڈ (fluid) سے بھری ایک گول ساخت ہے جس میں ٹشوز کی تین تہیں ہوتی ہیں۔ سب سے بیرونی تہ سفید سکلیرا (sclera) ہے، درمیانی تہ کورائیڈ (choroid) ہے اور سب سے اندرونی تہ ریٹینا (retina) ہے۔



جب روشنی آنکھ سے ٹکراتی ہے، تو یہ کورنیا سے گزرتی ہے جو کہ سکلیرا کا ایک شفاف حصہ ہے۔ پھر روشنی ایکوئس ہیومر (aqueous humor) سے گزرتی ہے۔ اس کے بعد آئرس (iris) آتا ہے جو کہ آنکھ کا رنگدار حصہ ہوتا ہے اور کورنیا میں سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے مرکز میں ایک سوراخ ہوتا ہے جسے پیوپل (pupil) کہتے ہیں۔ ایکوئس ہیومر سے روشنی پیوپل میں سے گزر کر لینز (lens) تک پہنچتی ہے جو اسے ریٹینا پر فوکس کر دیتا ہے۔ ریٹینا تک پہنچنے سے پہلے روشنی وٹرس ہیومر (vitreous humor) میں سے گزرتی ہے۔ ریٹینا کا وہ حصہ جہاں ریسیپٹر (receptors) سیلز میں سے کونز (cones) بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، فوویا (fovea) کہلاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کسی شے کو بالکل سامنے سے دیکھتے ہوئے روشنی کو فوکس کیا جاتا ہے۔



شکل 12.4: میملری ایک مثالی آنکھ کی ساخت



کیا آپ جانتے ہیں؟

☆ جیسے جیسے لینز کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی لچک میں کمی آ جاتی ہے۔ اس سے لینز کی مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بوڑھے لوگ عینک کا استعمال کرتے ہیں۔

تیل یا بھینڑ کی آنکھ، ڈائی سیکشن باکس، پانی، دستانے، جاذب کاغذ (paper towel)، ڈائی سیکنگ بورڈ، اخبار کا ایک صفحہ



1- لیبارٹری سے آنکھ حاصل کریں اور اس کے سامنے کے حصہ کا مشاہدہ کریں۔ سکلیئر، فیٹ مسلز (fat muscles)، کورنیا، آئرس اور پیوئل کی شناخت کریں۔



2- قہنجی کی مدد سے فیٹ مسلز کاٹیں۔



3- سکلیپل (scalpel) کی مدد سے کورنیا میں ایک شکاف ڈالیں۔ شکاف کو گہرا کرتے جائیں حتیٰ کہ کورنیا کے پیچے سے ایکوئس ہیومر خارج ہو جائے۔



4- سکلیپل استعمال کر کے آنکھ کے وسط میں سکلیئر میں سے ایک شکاف ڈالیں۔



5- آنکھ کے وسط میں ایک کٹ لگا کر اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیں۔ سامنے کا آدھا حصہ کوڑیا ہے۔ سامنے کے حصہ سے کوڑیا کو علیحدہ کر دینے کے بعد اسے بورڈ پر رکھیں اور سکیلپل یا اسٹریچ کی مدد سے شفاف ٹشو کے اندر سے اس کو کاٹ دیں۔




6- کوڑیا اور لینز کے درمیان سے آئرس باہر نکال لیں۔ پوپل کی شناخت کریں۔



7- آنکھ کے پچھلے حصہ کا مشاہدہ کریں اور وٹرس ہیومر کی شناخت کریں۔



8- ہاتھوں سے لینز کو نکالیں۔ اسے ایک اخبار کے اوپر رکھیں سائز میں بڑے الفاظ دیکھیں۔




9- آنکھ کا مشاہدہ کریں اور تمام وٹرس ہیومر باہر نکال دیں۔ آنکھ کے پچھلے حصہ کی پشت کی اندرونی طرف ریٹینا کی شناخت کریں۔

10- ڈائی سیکشن مکمل کر لینے کے بعد آنکھ کے تمام ٹکڑوں کو پلاسٹک بیگ میں لپیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔

☆ آنکھ کی ساخت کی ڈایا گرام بنائیں اور لیبل کریں۔



1- سینسری (sensory) سیلز آنکھ کے کون سے حصہ ہیں ہوتے ہیں؟



2- انسان کی آنکھ میں روشنی کے رستہ کی فہرست بنائیں۔



ذہنی آزمائش

☆ جب کوئی جانور گھاس چر رہا ہوتا ہے، تو گھاس کے پتے اس کی آنکھ میں گھس سکتے ہیں۔ آنکھ کا کون سا حصہ اندرونی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے؟

☆ آنکھ کے اندر کس طرح کا لینز ہوتا ہے؟ بائی۔ کنکلیو یا بائی۔ کنوئیکس!


سہارا اور حرکت

ہڈی کی کیمیائی ترکیب کی تحقیق کرنا (بھیڑ کی ہڈی کے تین ٹکڑے پانی، NaOH اور ڈائلکویٹ HCl میں رکھ کر)



تاریخ:

ہڈی جاندار سلیز کی بنی ہوئی ہے، جنہیں ہڈو، سلیز خوراک اور آکسیجن مہیا کرتی ہیں۔ یہ سلیز ہڈو، سلیز کے گرد اڑوں کی شکل میں ترتیب پائے ہوتے ہیں۔ ہڈی مختلف تہوں کی بنی ہوئی ہے۔ ہڈی کی سب سے سخت تہ جسے کمپیکٹ بون (compact bone) کہتے ہیں، سب سے بیرونی طرف ہوتی ہے۔ اس سے نیچے سپونجی بون (spongy bone) کی تہ ہوتی ہے جس کی اندر خالی جگہاں ہوتی ہیں۔ اس کے درمیان میں بون میرو (bone marrow) ہوتا ہے، جو کہ بہت نرم ہوتا ہے اور اس میں خون کی سپلائی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بون میرو دو طرح کا ہوتا ہے یعنی زرد اور سرخ۔ زرد بون میرو زیادہ تر چکنائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ سرخ بون میرو، جو کہ خاص ہڈیوں مثلاً پیلو (pelvis) اور ریز (ribs) میں پایا جاتا ہے، میں ریڈ ہڈ سلیز، واسٹ ہڈ سلیز اور پلیٹ لٹس بنتے ہیں۔ ہڈی کے سرے کارٹیج کی ایک تہ سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ ہڈی کنڈیکٹوٹی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اس کے میٹرکس (matrix) میں کولجن (collagen) قابض اور معدنیات (کیلسیم اور میگنیشیم کے نمکیات) ہوتے ہیں۔ ہڈی کے معدنیات مثلاً کیلسیم فاسفیٹ HCl کے عمل سے حل ہو جاتے ہیں جس سے ہڈی سوراخ دار ہو جاتی ہے۔ NaOH اور پانی کا ہڈی پر کوئی قابل ذکر اثر نہیں ہوتا۔



شکل 13.1: ہڈی کی ساخت

بھیڑ کی ہڈی کے تین ٹکڑے (ہر ایک 2cm لمبائی کا)، NaOH ، ڈائلکویٹ HCl ، پانی، فورسپس، پیکرز





احتیاطیں

- ☆ کیمیکلز کو احتیاط سے استعمال کریں۔
- ☆ کیمیکلز کے چھینٹوں سے بچیں۔
- ☆ بیکرز سے دور رہ کر تجربہ کریں۔



-1 برابر سائز کے تین بیکرز لیں اور ان پر A، B، اور C کے لیبل لگائیں۔

-2 ہر بیکر کے اندر ہڈی کا ایک ٹکڑا (2cm لمبائی کا) رکھ دیں۔

-3 بیکر میں اس کے والیوم کے پانچویں حصہ کے برابر NaOH (بیکر A میں)، ڈائلکٹوٹ HCl (بیکر B میں)

اور پانی (بیکر C میں) بھر دیں۔

-4 ایک گھنٹہ بعد ہڈی کی ساخت میں تبدیلیوں کا

مشاہدہ کریں۔

-5 سامان کو کئی دنوں تک ایسے ہی پڑا رہنے دیں اور

ہڈی کی ساخت میں تبدیلیوں کا مشاہدہ

کریں۔



فصل 13.2: مہلو کے بڑی ایک ہڈی

☆ ہڈیوں کی ساخت میں تبدیلیوں کو اس ٹیبل میں ریکارڈ کریں۔

ڈائلکٹوٹ HCl میں	NaOH میں	پانی میں

-1 ریز میں بون میرڈ کی کون سی قسم ہوتی ہے؟ زرد یا سرخ!

.....

.....

.....

-2 خوراک میں بحلیسم کے اچھے ذرائع کون سے ہیں؟

.....

.....

.....

وفنی آزمائش

☆ آپ نے دیکھا کہ پانی کے اندر ہڈی گلتی
سرتی (decay) نہیں ہے۔ اگر ہڈی کو
مہینوں تک پانی میں ہی رہنے دیا جائے تو کیا
ہوگا؟

☆ جوائنٹس پر ہڈیوں کے درمیان نرم کارٹیلج ہوتا
ہے۔ اگر یہاں کارٹیلج نہ ہو تو ہماری ہڈیوں کو
کیا ہو سکتا ہے؟


ریپروڈکشن

سلائیڈز، فوٹو مائیکرو گرافس (photomicrographs) اور چارٹس کے ذریعہ امیبا
(Amoeba) میں بائنری فشن (Binary Fission) کا مشاہدہ کرنا



تاریخ:

ادنیٰ درجہ کے جانداروں مثلاً امیبا (Amoeba) اور پیرامیسیم (Paramecium) وغیرہ میں اے سیکسوال ریپروڈکشن (asexual reproduction) کی ایک قسم بائنری فشن ہے۔ بائنری فشن میں آبائی جاندار برابر سائز کے دو دختر جانداروں میں تقسیم ہوتا ہے جو بعد میں نارمل سائز تک نشوونما پاتے ہیں۔ بائنری فشن ہمیشہ سازگار حالات میں ہی ہوتی ہے۔ امیبا میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر پر بائنری فشن کا عمل 30 منٹس میں مکمل ہوتا ہے۔



شکل 14.1: امیبا میں بائنری فشن

امیبا میں بائنری فشن دکھانے والی تیار شدہ سلائیڈز، فوٹو مائیکرو گرافس اور چارٹس، مائیکروسکوپ





احتیاط

☆ مائیکروسکوپ کے آئی پیس (eyepiece) میں دیکھتے بغیر اس کے لینز کو نیچے مت لائیں۔ اسے آہستہ آہستہ اور وقفوں کے ساتھ نیچے لائیں۔

☆ تیار شدہ سلائڈز کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔

1- فوٹو مائیکرو گرافس اور چارٹس سے امیبا میں بائنری فشن کے مراحل کا مطالعہ کریں۔

2- مائیکروسکوپ کی کم اور زیادہ طاقتوں کے نیچے امیبا میں بائنری فشن کی تیار شدہ سلائڈز کا مشاہدہ کریں۔

3- بائنری فشن کے مختلف مراحل کی نشان دہی کریں۔



بائنری فشن کا مشاہدہ کریں اور اس کے مختلف مراحل کی شناخت کریں اور ڈایا گرامز بنا کر لیبل کریں۔

Blank box for drawing or writing.

Blank box for drawing or writing.



1- پیرامیسیم میں بائنری فشن کی ایک تیار شدہ سلائڈ حاصل کریں۔ پیرامیسیم اور امیبا کی بائنری فشن میں فرق، اگر موجود ہیں، نوٹ کریں۔



Blank box for drawing or writing.

بائنری فشن سیل ڈویژن کی کون سی قسم ہے؟ مائی ٹوسس یا میٹوسس!

فنی آزمائش

☆ غیر سازگار حالات میں آبائی امیبا ایک ہی وقت میں بہت سے نئے سیلز بنا دیتا ہے۔ یہ فشن (fission) کی کون سی قسم ہوتی ہے؟






تیار شدہ سلائڈز سے پیسٹ (yeast) میں بڈنگ (budding) کا مشاہدہ کرنا

تاریخ:

پیسٹ یونی سیلولر فنجائی ہیں جو پھلوں کی سطح پر، مٹی اور پانی میں اور حتیٰ کہ ہوا میں موجود ذرات پر پائے جاتے ہیں۔ پیسٹ بڈنگ کے ذریعہ اے سیکسوسکل ریپروڈکشن کرتے ہیں جس کے دوران آبائی جسم کے اوپر چھوٹے سے ابھار کے طور پر ایک بڈ (bud) بنتی ہے۔ سیل کا نیوکلیس مائی ٹوس کر کے دو میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک دختر نیوکلیس بڈ کے اندر چلا جاتا ہے۔ بڈ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کا سائز آبائی سیل جتنا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نئے نیوکلیس اور دوسرے آرگنیلز رکھنے والی بڈ اپنی بنیاد کے مقام سے دب جاتی ہے اور آبائی سیل سے الگ ہو کر آبائی سیل جیسا ہی نیا سیل بنا دیتی ہے۔ بڈز الگ ہو کر آزادانہ زندگی بھی گزار سکتی ہیں اور جڑی رہ کر کالونی کی شکل میں بھی رہتی ہیں۔



کیا آپ جانتے ہیں؟

- ☆ بڈنگ سیل وال پر موجود پہلے سے معین شدہ مقامات پر ہوتی ہے۔
- ☆ آبائی سیل ایک ہی وقت میں ایک سے زائد بڈز بنا سکتا ہے۔

شکل 14.2: پیسٹ میں بڈنگ

پیسٹ میں بڈنگ کی تیار شدہ سلائڈز، مائیکروسکوپ



احتیاطیں

- ☆ مائیکروسکوپ کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔
- ☆ استعمال سے پہلے ہینڈ کو صاف کر لیں۔

- 1- مائیکروسکوپ کی کم اور زیادہ طاقتوں کے نیچے پیسٹ میں بڈنگ کی تیار شدہ سلائڈز کا مشاہدہ کریں۔
- 2- پیسٹ میں بڈنگ کے مختلف مراحل کی نشان دہی کریں۔




☆ پیسٹ میں بڈنگ کے مختلف مراحل کا مشاہدہ اور شناخت کریں اور ڈایا گرامز بنا کر لیبل کریں۔





1- آپ کی روزمرہ زندگی میں پیسٹ کا کیا کردار ہے؟



2- بڈنگ اور بانسز فشن میں فرق بیان کریں۔

ذہنی آزمائش



☆ کسی ایسے ملٹی سیلولر جاندار کا نام بتائیں جس میں بڈنگ ہوتی ہے؟
☆ یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر جانداروں میں بڈنگ میں فرق بیان کریں۔

بلب (پیاز)، کورم (اروی)، رائی زوم (ادرک) اور سٹیم ٹیوبر (آلو) کا مشاہدہ کرنا
اور نئے پودے حاصل کرنے کے لیے ان کی کاشت کرنا





تاریخ:

ترمیم شدہ تنے یا جڑ سے بننے والے زیر زمین سٹوریج آرگنز (storage organs) کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ یہ آرگنز نئی نشوونما کے لیے خوراک کا ذخیرہ کرتے ہیں اور پودوں کی ویجیٹیو (vegetative) ریپروڈکشن کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ توانائی کے ایسے ذخائر عموماً بڑے اور رس بھرے (fleshy) ہوتے ہیں۔ زیر زمین سٹوریج آرگنز کی اہم اقسام بلبر (bulbs)، ٹیوبرز (tubers)، کورمز (corms) اور رائی زومز (rhizomes) ہیں۔



A- پیاز کا بلب Bulb of Onion

بلب ایک زیر زمین شوٹ (shoot) ہے۔ یہ ایک چھوٹی عمودی تنے پر مشتمل ہے جس کے گرد موٹے، رس بھرے پتے لپٹے ہوتے ہیں۔ تنے کی بنیاد سے ایڈوٹیشیوس (adventitious) جڑوں کا ایک گچھا نکلتا ہے۔ رس بھرے پتوں کی بنیادوں کے مابین ایگزیری (axillary) بڈز موجود ہیں جبکہ تنے کی چوٹی پر ٹرمینل (terminal) بڈ موجود ہے۔ ایگزیری بڈز سے نئے بلبر بنتے ہیں جبکہ ٹرمینل بڈ سے نیا پودا بنتا ہے۔



شکل 14.3: پیاز کا بلب

استرا، ہینڈ لینز، مٹی سے بھرے گملے، بلیڈ (blade)، سوئی (needle)، بلب (پیاز)، کورم (اروی)، رائی زوم (ادرک)، سٹیم ٹیوبر (آلو)





- 1- ایک پیاز کا بلب لیں اور اس کے بیرونی حصوں کا معائنہ کریں۔
- 2- بلب کو عمودی کاٹیں اور پیٹنڈ لائنز کی مدد سے اس کے اندرونی حصوں کا معائنہ کریں۔
- 3- اپنے مشاہدات ریکارڈ کریں۔

پیار کے بلب کی کاشت Cultivation of Onion Bulb

- 1- ایک بلب کو مٹی میں یوئیں اور اسے روزانہ پانی دیں۔ سکیل لیوز (scale leaves) میں موجود بڈز سے تنا بننا ہے جس سے بعد میں شاخیں نکلتی ہیں۔
- 2- اپنے مشاہدات ریکارڈ کریں۔

-B اروی کا کورم Corm of Colocasia



کورم ایک چھوٹا پھولا ہوا تنہ ہے جو زمین کے اندر عموداً نمو پاتا ہے۔ اس میں خوراک کا ذخیرہ ہوتا ہے جو سردی کے موسم میں استعمال ہوتا ہے اور بعد میں اس کی ٹرمینل (terminal) بڈ سے نیا پودا نکلتا ہے۔ تنے کی سطح پر بہت سے ڈھیلے سکیل لیوز موجود ہوتے ہیں جو نوڈز سے نکلتے ہیں۔ ایڈونٹی ٹیکس روٹس کورم کو مٹی میں گاڑے رکھتی ہیں۔ ہر پتے کے ایکسل (axil) میں ایک یا زائد بڈز موجود ہوتی ہیں۔ ان میں چند بڈز دختر کورم میں نمو پاتی ہیں جبکہ ٹرمینل بڈ سے ہوائی شوٹ (aerial shoot) نکلتی ہے۔



کیا آپ جانتے ہیں؟

☆ نمو کے موسم کے دوران پودا اپنے رس بھرے تنے میں ذخیرہ شدہ خوراک کو استعمال کرتا ہے اور موسم کے اختتام پر آبائی کورم کے اوپر نئے کورم بنانے کے لیے خوراک پتے مہیا کرتے ہیں۔

شکل 14.4: اروی کا کورم

- 1- ایک اروی کا کورم لیں اور اس کے بیرونی حصوں کا معائنہ کریں۔
- 2- کورم کو عمودی کاٹیں اور پیٹنڈ لائنز کی مدد سے اس کے اندرونی حصوں کا معائنہ کریں۔
- 3- اپنے مشاہدات ریکارڈ کریں۔



- 1- کم از کم ایک بڑوالے اروی کی کورم کوٹھی میں بونیں اور اسے روزانہ پانی دیں۔ چند دن بعد اس سے کٹی گئے کورم بن جائیں گے۔
- 2- اپنے مشاہدات ریکارڈ کریں۔

C- اورک کارائی زوم Rhizome of Ginger

رائی زوم ایک پھولا ہوا تانا ہے جس پر پتے اور جڑیں لگی ہوتی ہیں۔ یہ سطح زمین کے اوپر یا تھوڑے نیچے افقی طور پر نمو پاتا ہے اور کئی سال تک زندہ رہتا ہے۔ رائی زوم پر بڑھے ہوئے حصے یعنی نوڈز ہوتے ہیں۔ ہر نوڈ پر ایک چھوٹا، پتلا اور خشک پتلا لگا ہوتا ہے۔ سکیل لیوز کے ایکسلز (axils) پر ایگزیری بڈز پائی جاتی ہیں جبکہ رائی زوم کے اوپر ایک ٹرمینل بڈ بھی موجود ہے۔ ٹرمینل بڈ سے زمین کے اوپر پتے اور پھول نکلتے ہیں۔ رائی زوم کی چٹائی سطح پر ایڈونٹی شیکس روٹس پائی جاتی ہیں۔



شکل 14.5: اورک کارائی زوم

- 1- ایک اورک کارائی زوم لیں اور اس کے حصوں کا معائنہ کریں۔
- 2- اپنے مشاہدات ریکارڈ کریں۔




Cultivation of Rhizome of Ginger

اورک کے رائی زوم کی کاشت

- 1- نوڈز اور بڈز والے اورک کی رائی زوم کوٹھی میں بونیں اور اسے روزانہ پانی دیں۔ چند دن بعد اس سے نئی شاخیں نکلتی ہیں اور نیا اورک بھی بن جاتا ہے۔
- 2- اپنے مشاہدات ریکارڈ کریں۔

-D آلو کا سٹیم ٹیوبر Stem Tuber of Potato

سٹیم ٹیوبر ایک پھولا ہوا زیر زمین تنا ہے جو خوراک کا ذخیرہ کرتا ہے، سردی کا موسم گزارتا ہے اور آنے والے سال میں نئے پودے بناتا ہے۔ ٹیوبر کی سطح کے ساتھ ساتھ ”آنکھوں“ (eyes) کی شکل میں بڈز کے مجموعے موجود ہوتے ہیں۔ ”آنکھوں“ کے نزدیک ہی سکیل لیوز بھی لگے ہوتے ہیں۔ ہر بڈ نئی شوٹ میں نمو پاتی ہے جو اوپر کی جانب بڑھتی ہے اور جڑیں بھی بناتی ہے۔



شکل 14.6: سٹیم ٹیوبر

1- آلو کا ایک سٹیم ٹیوبر لیں اور اس کے حصوں کا معائنہ کریں۔

2- اپنے مشاہدات ریکارڈ کریں۔



Cultivation of Stem Tuber of Potato آلو کے سٹیم ٹیوبر کی کاشت


1- ایک یا چند ”آنکھوں“ والے آلو کے سٹیم ٹیوبر کو مٹی میں یونیں اور اسے روزانہ پانی دیں۔ چند دن بعد ”آنکھ“ سے نئی شوٹ نمو پاتی ہے جو بعد میں آلو کا نیا سٹیم ٹیوبر بناتی ہے۔

2- اپنے مشاہدات ریکارڈ کریں۔

☆ بلب، کورم، رائی زوم اور سٹیم ٹیوبر کی ساخت کے حوالہ سے اپنے مشاہدات کی ڈایا گرام بنائیں۔



☆ بلب، کورم، رائی زوم اور سٹیم ٹیوہر کی ساخت کے حوالہ سے اپنے مشاہدات کی ڈایا گرام بنائیں۔



ایک آلور موجود ”آنکھ“ سے کیا مراد ہے؟

-1

بلب، کورم، رائی زوم اور سٹیم ٹیوہر کی تعریف لکھیں۔

-2

پودوں میں ویجی ٹیوہر پیر وڈکشن کے فوائد لکھیں۔


-3



وٹنی آزمائش

☆ آلوکوجڑ کی بجائے زیر زمین تنا
کیوں کہا جاتا ہے؟

گلاب یا علاقہ میں دستیاب کسی دوسرے پودے کی سٹیم کٹنگ (Stem Cutting)
اور پتھر چٹ یعنی برائیوفائٹ (Bryophyllum) کے پتے سے پودوں کی نسل بڑھانا



تاریخ:

کئی پودوں مثلاً گلاب، ہس کس (Hibiscus)، لچھی (leechi) وغیرہ میں ویجی ٹیو پروپیگیشن کا ایک مصنوعی طریقہ کٹنگ (cutting) ہے۔ باغبان اس طریقہ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقہ میں عام طور پر آبائی پودے کے تنے یا جڑ سے کٹنگ لی جاتی ہے۔ ان کٹنگز میں میری سٹیمیٹک (meristematic) حصے ضرور ہونے چاہئیں، جہاں سے نشوونما ہو سکے۔ جب کٹنگز کو مناسب مٹی میں سازگار حالات (کافی غذائی مادے، پانی اور سورج کی روشنی) میں رکھا جائے، تو ان کی جڑیں اور شوٹس (shoots) نکلتی ہیں اور آبائی پودے کے مماثل پودے میں نمو پا جاتی ہیں۔ ایک ہی پودے سے بہت سے نئے پودے حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔



شکل 14.7: گلاب میں سٹیم کٹنگ

وہجی ٹیڈو پروپیکیشن پتوں کی کٹنگز (leaves cuttings) سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ طریقہ عام نہیں ہے اور چند ہی پودوں میں پایا جاتا ہے مثلاً پتھر چٹ یعنی برائیو فائلیم۔ اس پودے کے پتے رس بھرے ہوتے ہیں اور اس کے پتوں کے کناروں پر ایڈونٹی ٹیکس (adventitious) بڈز پائی جاتی ہیں۔ جب ایک پتہ زمین پر گرتا ہے، تو بڈز سے نئے پودے نمو پا جاتے ہیں۔



شکل 14.8: برائیو فائلیم کا پتہ

گلاب کا پودا علاقہ میں دستیاب کوئی اور پودا، برائیو فائلیم کے پتے، تیز بلیڈز (blades)، مٹی سے بھرے گملے



-a- سٹیم کٹنگ (گلاب کی) سے پروپیکیشن

Propagation by Stem Cutting (Rose)

- 1- ایک تیز بلیڈ لیں اور اس کی مدد سے گلاب کے پودے کی صحت مند شوٹ سے نوڈ سے تھوڑا نیچے 8 سے 10 انچ لمبا کٹڑا کاٹیں۔ نئے کوتر چھا (obliquely) کاٹنا ہے اور اس کٹنگ میں 2 سے 3 نوڈز ہونی چاہئیں۔
- 2- کٹنگ پر سے زیادہ تر پتوں کو اتار دیں تاکہ ٹرانسپائریشن سے ہونے والے پانی کے ضیاع سے بچا جاسکے۔
- 3- اب اس کٹنگ کا دو تہائی حصہ (جس پر کم از کم ایک نوڈ ہو) زرخیز مٹی میں دبا دیں اور مٹی والے گملے کو سبز گار حالات میں رکھ دیں۔



- 4- کٹنگ کو روزانہ پانی دیں اور چند ہفتوں تک انتظار کریں۔

احتیاطیں

☆ بلیڈز کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔

☆ کٹنگز کو باقاعدگی سے پانی دیں۔

☆ کٹنگز کا مشاہدہ کریں اور جڑ اور شوٹ کی نشوونما کو نوٹ کریں۔ اپنے مشاہدات کی تصاویر بنائیں۔



-b پتے کی کٹنگ سے پروریکیشن Propagation by Leaf Cutting

-1 برائیو فاسکم کے چند پتے لیں اور ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیں۔ ہر ٹکڑے میں ایک ایڈونٹی ٹینس بڈ ضرور ہونی چاہیے۔

-2 ان ٹکڑوں کو نم دار زرخیز مٹی کے اوپر رکھیں۔

-3 ان کے اوپر بھی تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دیں اور باقاعدگی سے پانی کا چھڑکاؤ کریں۔

-4 چند ہفتوں بعد آبائی برائیو فاسکم کے پتے کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کریں اور اپنے مشاہدات کو ریکارڈ کریں۔




☆ کٹنگز کا مشاہدہ کریں اور جڑ اور شوٹ کی نشوونما کو نوٹ کریں۔ اپنے مشاہدات کی تصاویر بنائیں۔



-1 مصنوعی پروٹیکشن کے کیا نقصانات ہیں؟

-1



-2 کچھ اور ایسی مثالیں دیں جہاں آپ یہ طریقے (سٹیم کٹنگ اور لیف کٹنگ) استعمال کرتے ہیں۔

-2



ذہنی آزمائش

☆ ہم نے تینے کو نوڈ کے نیچے سے کیوں کاٹا تھا؟

☆ سٹیم کٹنگ کے لیے ہم نے موٹا تنا کیوں استعمال کیا؟

☆ برائو فائلیم کے پتے کا کون سا حصہ نئے پودے کو بناتا ہے؟

-3

سال کے کون سے مہینوں میں آپ گلاب کی کٹنگز سے بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں؟





سرسوں کے پھول، چنے کے بیج اور مکئی کے دانے (بیج) کا مطالعہ کرنا

تاریخ:

a- سرسوں کے پھول کا مطالعہ Examination of Mustard Flower

پھول پودے کا تولیدی یعنی ریپروڈکٹو (reproductive) حصہ ہوتا ہے۔ براسیکا (Brassica) کے پھول کی ڈنڈی کو پیڈیسل (pedicel) کہتے ہیں۔ پیڈیسل کے پھولے ہوئے اوپری کنارے کو تھیلیمس (thalamus) یا ریسیپیٹیکل (receptacle) کہتے ہیں، جس پر پھول کی پتیاں (floral leaves) حلقوں کی شکل میں ترتیب پائی ہوتی ہیں۔ سپلز (sepals) کی تعداد چار ہے اور یہ عام طور پر سبز ہوتے ہیں اور پھول میں سب سے نیچے لگے ہوتے ہیں۔ سپلز کے حلقے کو لیلس (calyx) کہتے ہیں۔ پیٹلز (petals) کی تعداد بھی چار ہے۔ یہ زرد رنگ کے ہوتے ہیں اور سپلز کے اندرونی طرف پائے جاتے ہیں۔ پیٹلز کا حلقہ کورولا (corolla) کہلاتا ہے۔ سٹیمنز (stamens) کی تعداد پچھ ہے اور یہ پھول کے نر (male) آگنر ہوتے ہیں۔ سٹیمنز کے حلقہ کو اینڈروسیئم (androecium) کہتے ہیں اور یہ پیٹلز کے اندرونی طرف پایا جاتا ہے۔ ہر سٹیمن کی ایک ڈنڈی (stalk) یعنی فلامنٹ (filament) ہے جس کے اوپری کنارے پر دو چھوٹی تھیلیاں پائی جاتی ہیں جنہیں اینتھر (anthers) کہتے ہیں۔ اینتھر زمیں پلن گریز (pollen grains) ہوتے ہیں۔ پھول کا مادہ (female) آگن کارپل (carpel) ہے اور کارپلز کے حلقہ کو گائیٹھیئم (gynoecium) کہتے ہیں۔ گائیٹھیئم پھول کے وسط میں پایا جاتا ہے اور دو کارپلز پر مشتمل ہے، جو آپس میں مدغم ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر کارپل کا نچلا پھولا ہوا حصہ اووری (ovary) ہے۔ اووری کے اوپر ایک ڈنڈی نما حصہ یعنی سٹائل (style) ہے اور سٹائل کا پھولا ہوا کنارہ اسٹگما (stigma) ہوتا ہے۔ اووری میں اوویولز (ovules) ہوتے ہیں جو پک کر بیج بنتے ہیں۔ اووری پک کر پھل بناتی ہے۔



شکل 14.9: براسیکا کے پھول کی ساخت

براسیکا کا پھول، میگنی فائینگ گلاس (magnifying glass)، گلاس سلائیڈ یا پیٹری ڈش، فورسپس



1- براسیکا کا ایک پھول لیں، اسے گلاس سلائیڈ پر رکھیں اور میگنی فائینگ گلاس کی مدد سے اس کے حصوں کا مشاہدہ کریں۔

2- فورسپس کی مدد سے اس کے حصوں کو الگ الگ کریں اور ان کا مطالعہ کریں۔



☆ پھول کے حصوں کی شناخت کریں اور ڈایا گرامز بنا کر لیبل کریں۔



Blank area for drawing or writing.

Blank area for drawing or writing.



-b بننے اور مکی کے بیجوں کا مطالعہ


Examination of Gram seed and Maize Grain

فرٹیلائزیشن (fertilization) کے بعد اوویول سے بیج بنتا ہے۔ بیج کے اوپر ایک حفاظتی کوٹ یعنی ٹیسٹا (testa) ہوتا ہے

جو ایک باریک ممبرین سے لے کر سخت غلاف تک کی شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ ٹیسٹا کے اندر ایک ایمبریو (embryo)



ہے۔ ایمریو ایک پلومیول (plumule) یعنی چھوٹی شوٹ، ایک ریڈیکل (radical) یعنی چھوٹی جڑ اور ایک یا دو کاٹی۔ لیڈنز (cotyledons) یعنی بیج کی پتیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بیج کے ایک کنارے پر چھوٹا سا سوراخ مائیکروپائل (micropyle) ہوتا ہے جو بیج میں پانی کے داخلہ کا بڑا مقام ہے۔ چنے کے بیج کا سیڈ کوٹ (seed coat) مضبوط اور سخت ہوتا ہے۔ مکئی کے دانے میں کاٹی لیڈن ایک آرگن سکوٹیلیم (scutellum) میں تبدیل شدہ ہوتی ہے۔ کچھ بیجوں میں کاٹی لیڈن خوراک کا ذخیرہ رکھتی ہے جبکہ دوسرے بیجوں میں خوراک کی فراہمی کے لیے ایک الگ ٹشو اینڈوسپرم (endosperm) ہوتا ہے۔ مانو کاٹی لیڈنس (monocotyledonous) پودوں کے بیج میں ایک کاٹی لیڈن جبکہ ڈائی کاٹی لیڈنس (dicotyledonous) پودوں کے بیج میں دو کاٹی لیڈنز ہوتی ہیں۔



فکل 14.10: چنے کا بیج (بیرونی اور اندرونی ساخت)



فکل 14.11: مکئی کا دانہ (بیرونی اور اندرونی ساخت)

چنے کے بیج، مکئی کے دانے، واچ گلاس (watch glass)، مائیکروسکوپ، ڈائی سیلنگ باکس



1- خشک اور بھگوئے گئے (soaked) چنے کے بیج اور مکئی کے دانوں کی بیرونی ساخت کا مطالعہ کریں۔

2- بھگوئے گئے بیجوں کو لمبائی کے رخ کاٹیں اور ان کی اندرونی ساختوں کی شناخت کریں۔



☆ مندرجہ ذیل ٹیبل میں اپنے مشاہدات ریکارڈ کریں اور ڈایا گرامز بنائیں۔



مکئی کا دانہ	چنے کا بیج	خصوصیات	
		شکل	بیرونی ساخت
		رنگ	
		تختی / نرمی	
		اینڈوسپرم ہے یا نہیں	اندرونی ساخت
		مانو کاٹی لیڈنس یا ڈائٹی کاٹی لیڈنس	
		ایمبریو کے پلومیول اور ریڈیکل کا مقام	

.....


.....

.....



1- بیج کے لیے اگنے سے پہلے پانی جذب کرنا کیوں ضروری ہے؟

-1



2- بیج اوویول سے بنتے ہیں جبکہ پھل اووری سے بنتے ہیں؟ بغیر بیجوں والے پھل (seedless fruits) کس طرح بنتے ہیں؟

-2



دفنی آزمائش

- ☆ بیجوں کے خشک حالت میں زمین میں بوئے جانے کے کیا فائدے ہیں؟
- ☆ کچھ کھائے جانے والے پھولوں کے نام لکھیے۔
- ☆ مکئی کا بھٹہ پھل کے طور پر کیوں جانا جاتا ہے۔




بیج کے اگنے (جرمینیشن : Germination) کی شرائط کی تحقیق کرنا

تاریخ:



بیج کا اگنا یعنی جرمینیشن (germination) سے مراد وہ عمل ہے جس میں ایک بیج فعال ہو کر ننھا پودا یعنی سیڈلنگ (seeding) بناتا ہے۔ بیج کی جرمینیشن کے لیے سازگار حالات (پانی، ٹمپرچر اور آکسیجن وغیرہ) کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمریو کے تنے کا وہ حصہ جو جڑنے کے مقام سے نیچے ہوتا ہے، ہائپوکاٹل (hypocotyl) کہلاتا ہے جبکہ اس کے جڑنے کے مقام سے اوپر والے حصہ کو اپی کائل (epicotyl) کہتے ہیں۔ جڑ وہ پہلی ساخت ہے جو بیج میں موجود ریڈیکل (radicle) سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد پلومیول (plumule) ایک چھوٹی سی شوٹ میں نمودار ہوتا ہے۔ یہ شوٹ بڑی ہو جاتی ہے اور مٹی سے اوپر نکل آتی ہے۔



شکل 14.12: ایک مخصوص بیج کی ساخت

زیادہ تر پودوں کے پکے ہوئے بیجوں میں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے اور ان کی جرمینیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک سیڈ کوٹ اور دوسرے نشوز پانی اپنے اندر نہ لے جائیں۔ ہوا ایمریو کے سیلز میں ریسپریشن کے لیے آکسیجن مہیا کرتی ہے۔ جرمینیشن کے لیے مختلف بیجوں کی درجہ حرارت کی ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ زیادہ تر پودوں کے بیجوں کی جرمینیشن کا آپٹیمم ٹمپرچر 25-30 ڈگری سنٹی گریڈ ہوتا ہے۔

پیٹری ڈشز (Petri dishes)، بیکرز، کاٹن وول (cotton wool)، چنے / لوہے / مٹر / گندم کے بیج،

ریفریجریٹر (refrigerator)، انکیوبیٹر (incubator)



تحقیق کرنا کہ جرمینیشن کے لیے پانی لازمی ہے

-a

To Investigate that Water is Essential for Germination



تین پیٹری ڈشز کو A، B، اور C کے لیبل لگائیں۔

-1

ہر پیٹری ڈش کے پینڈے میں ایک کاٹن وول رکھ دیں۔

-2

پیٹری ڈش A میں موجود کاٹن وول کو نم کر کے اس پر 5 سے 6 ایسے بیج رکھ دیں جو 12 گھنٹوں تک بھگوئے گئے

-3

(soaked) ہوں۔

پیٹری ڈش B میں موجود کاٹن وول کو خشک ہی رکھ کر اس پر 5 سے 6 بھگوئے گئے بیج رکھ دیں۔

-4

پیٹری ڈش C میں موجود کاٹن وول کو خشک ہی رکھ کر اس پر 5 سے 6 خشک (un-soaked) بیج رکھ دیں۔

-5

تینوں پیٹری ڈشز کو چند دنوں تک رکھ چھوڑیں۔

-6

پیٹری ڈشز میں بیجوں کی جرمینیشن کو نوٹ کریں اور اپنے مشاہدات کی ڈایا گرامز بنائیں۔

☆



Web Version of PCTB Textbook



-b جرمینیشن پر ٹمپریچر کے اثر کی تحقیق کرنا

To Investigate the Effect of Temperature on Germination

- 1 تین پیٹری ڈشز کو A، B، اور C کے لیبل لگائیں اور ہر ایک کے پینڈے میں ایک گیلی کاٹن وول رکھ دیں۔
 - 2 ہر پیٹری ڈش میں 5 سے 6 بھگوئے گئے (soaked) بیج رکھ دیں۔
 - 3 پیٹری ڈش A کو 35 ڈگری سینٹی گریڈ پر (انکوبیٹر میں)، پیٹری ڈش B کو 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر (ریفریجریٹر میں) اور پیٹری ڈش C کو کمرہ کے ٹمپریچر یعنی 20 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھ دیں۔
 - 4 تینوں پیٹری ڈشز کو ایک ہفتہ تک رکھ چھوڑیں۔
- ☆ پیٹری ڈشز میں بیجوں کی جرمینیشن کو نوٹ کریں اور اپنے مشاہدات کی ڈایا گرامز بنائیں۔



-c جرمینیشن کے لیے آکسیجن کی ضرورت کی تحقیق کرنا

To Investigate the Oxygen Requirement for Germination

- 1 500 ملی لیٹر کے دو بیکریس اور ان پر A اور B لے لیبل لگائیں۔
- 2 بیکری A کو ذریعہ مٹی سے آدھا بھر لیں اور اس میں بھگوئے گئے (soaked) کچھ بیج رکھ دیں (1 سے 2 سینٹی میٹر سے زیادہ کی گہرائی پر مت رکھیں)۔

-3 بیکر B میں بھگوئے گئے (soaked) کچھ بیج رکھیں اور اس بیکر کو ذرخیز مٹی سے مکمل بھر دیں۔

-4 بیکر B کو پولی تھین (polythene) بیگ میں رکھ دیں۔

-5 دونوں بیکرز کو چند دنوں تک رکھ چھوڑیں۔

☆ بیکرز میں بیجوں کی جرمنیشن کو نوٹ کریں اور اپنے مشاہدات کی ڈایا گرامز بنائیں۔




Blank box for drawing or writing observations.

Blank box for drawing or writing observations.



-1 اگر ٹمپرچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہو، مگر جرمنیشن کی دیگر شرائط پوری ہوں تو کیا بیجوں کی جرمنیشن ہوگی یا نہیں؟



-2 بیج اپنی جرمنیشن کا عمل کب مکمل کرتا ہے؟

وراثت

تجربہ

15.1



ہم جماعت طلبہ کے قد ماپ کر معلوم کرنا کہ یہ کس طرح کا تغیر (Variation) ہے
 اور طلبہ کے قد کے اعداد و شمار کو ہسٹوگرام (Histogram) یا بار چارٹ (Bar Chart)
 کے گرافس (Graphs) بنا کر پیش کرنا



تاریخ:

ہم سب کا تعلق ایک ہی سی شیز یعنی ہومو سپی ایسز (Homo sapiens) سے ہے لیکن پھر بھی ہر کوئی مختلف دکھائی دیتا ہے۔ ایک ہی سی شیز کے افراد کے مابین دکھائی دینے والے یہ اختلافات تغیرات (variations) کہلاتے ہیں۔
 تغیرات دو طرح کے ہوتے ہیں (i) مسلسل تغیرات (Continuous variations) اور (ii) غیر مسلسل تغیرات (Discontinuous variations)۔
 مسلسل تغیرات میں ایک حد سے دوسری حد تک پیمائش کا ایک مکمل سلسلہ ہوتا ہے۔
 غیر مسلسل تغیرات کئی جینز (genes) کے مجموعی اثر کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ماحولیاتی عوامل بھی اکثر ان تغیرات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسان کا قد، جلد کی رنگت، زبانیت اور میٹھی مکئی (sweet corn) کے کرل (kernal) وغیرہ مسلسل تغیرات کی مثالیں ہیں۔



غیر مسلسل تغیرات میں فینوٹائپس (phenotypes) واضح طور پر الگ الگ ہوتی ہیں اور یہ تغیرات ایسی خصوصیات پر مشتمل ہوتے ہیں جن کو ماپا نہیں جاسکتا۔ ایک پاپولیشن کے افراد میں یا تو کوئی خصوصیت موجود ہوتی ہے یا موجود نہیں ہوتی۔ غیر مسلسل تغیرات کو جینز کا ایک ہی جوڑا کنٹرول کرتا ہے۔ تغیرات کی اس قسم پر ماحول کا بہت کم اثر ہوتا ہے۔
 غیر مسلسل تغیرات کی مثالیں مٹر کے پودے کا قد، انسان میں زبان کو موڑنا (tongue rolling) اور ہلڈ گروپس وغیرہ ہیں۔

کسی وراثتی خصوصیت کے اعداد و شمار کا گرافس کی شکل میں اظہار ہسٹوگرام (histogram) کہلاتا ہے۔ وراثتی اعداد و شمار کے ہسٹوگرام میں افقی خط (horizontal axis) پر خصوصیت کی مختلف فینوٹائپس کا سلسلہ دکھایا جاتا ہے جبکہ عمودی خط (vertical axis) پاپولیشن میں افراد کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔



شکل 15.1: (a) مسلسل تغیرات کا ہسٹوگرام (b) غیر مسلسل تغیرات کا ہسٹوگرام

ماپنے والا پیمانا (Measuring Tape)، گراف پیپر (Graph Paper)



1- اپنی جماعت کے تمام طلبہ کے قد ماپیں (انچز میں) اور انہیں ریکارڈ کریں۔

2- اب قد کے اعداد و شمار کو مقدار کے لحاظ سے ترتیب دیں اور ایک فریکوئنسی (frequency) ٹیبل بنائیں۔ ٹیبل میں قد کا سلسلہ اس طرح سے موجود ہونا چاہیے۔



فریکوئنسی ٹیبل: Frequency Table

گروپس	قد کی پیمائش کا سلسلہ (انچز میں)	فریکوئنسی (طلبہ کی تعداد)
1.	55 انچز سے کم	
2.	56-58 انچز	
3.	59-61 انچز	
4.	62-64 انچز	
5.	65-67 انچز	
6.	68-70 انچز	
7.	71-73 انچز	



A stylized illustration of a document with a magnifying glass. The document has a blue header, a table with two columns, and a signature at the bottom. A green arrow points to the document from the left.



-1

-2


ذهنی آزمائش



51


انسان اور ماحول

ایک ایکوسسٹم (Ecosystem) مثلاً اکویریم (Aquarium) یا تالاب (Pond) کی تحقیق کرنا



تاریخ:

ایک قدرتی خود کفیل (self-sufficient) اکائی جو بائیونک (biotic) کمیونٹی اور اے۔ بائیونک (abiotic) ماحول پر مشتمل ہوتی ہے، ایکوسسٹم (ecosystem) کہلاتی ہے۔ تالاب تازہ پانی (fresh water) ایکوسسٹم کی ایک مثال ہے جس میں، دوسرے ایکوسسٹم کی طرح، دو اقسام کے اجزاء پائے جاتے ہیں یعنی بائیونک اجزاء اور اے۔ بائیونک اجزاء۔ تالاب کے اے۔ بائیونک اجزاء میں پانی، ٹھوس اجسام، ٹھیکڑ، روشنی، ہوا وغیرہ شامل ہیں۔ سورج سے آنے والی ریڈی ایشنز (radiations) توانائی کا بڑا ذریعہ ہوتی ہیں۔ بائیونک اجزاء میں پروڈیوسرز (producers)، کنزیومرز (consumers) اور ڈی کمپوزرز (decomposers) شامل ہیں۔ پروڈیوسرز آٹوٹرافس (autotrophs) ہوتے ہیں یعنی اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں اور ان میں پودے، الگی (algae) اور فوٹوسنتھی سیز کرنے والے بیکٹیریا (photosynthetic bacteria) شامل ہیں۔ کنزیومرز ہیٹروٹرافس (heterotrophs) ہوتے ہیں یعنی اپنی خوراک کے لیے پروڈیوسرز پر انحصار کرتے ہیں۔ ان میں ہربی وور (herbivore)، کارنی وور (carnivore) اور اومنی وور (omnivore) جانور شامل ہوتے ہیں۔ پرائمری کنزیومرز (یعنی ہربی وورز) پروڈیوسرز کو کھاتے ہیں؛ سیکنڈری کنزیومرز



شکل 16.1: ڈیاگرام کی شکل میں تالاب کے ایکوسسٹم کی سکیم (scheme)



کیا آپ جانتے ہیں؟

- ☆ آبی ایکوسسٹم اکثر غذائی اجزاء کے حصول کے حوالہ سے اپنے گرد موجود بہت سے ماحولیاتی دباؤ کے بلا واسطہ اور بالواسطہ اثرات کا شکار ہوتے ہیں۔
- ☆ صرف سمندر (oceans) ہی سطح زمین کے تین چوتھائی حصہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ سمندر اور دوسرے آبی ایکوسسٹم زمین (earth) پر موجود تمام زندگی کے لیے ضروری خوراک اور دوسرے ذرائع مہیا کرتے ہیں۔

(یعنی کارنی وورز) پرائمری کنزیومرز کو کھاتے ہیں؛ اور ٹشری (tertiary) کنزیومرز (یعنی کارنی وورز) سیکنڈری کنزیومرز کو کھاتے ہیں۔ ڈی کمپوزرز سپرو فیک (saprophytic) یعنی مردہ خور جاندار ہیں (مثلاً بہت سے بیکٹیریا اور فنجائی) جو پودوں اور جانوروں کے بے کار مادوں اور مردہ اجسام کو ان-آرگینک مادوں میں ڈی کمپوز کرتے ہیں۔



حشرات پکڑنے کے لیے جال (insect net)، مائیکروسکوپ، ہینڈ لینز، سلائیڈز، کورسلپس، جاز، ریز پینڈز، ٹن کے مرتبان (tin cans)، مارکرز، پلاسٹک کے بیگ



(آپ کے سکول کی انتظامیہ یا ٹیچر کسی قریبی تالاب کے ایکوسسٹم کے دورہ کا انتظام کریں گے۔ اگر تالاب جانا ممکن نہ ہو تو کسی باغ یا صحرا کا دورہ بھی کیا جاسکتا ہے۔)

1- اپنے منتخب کردہ ایکوسسٹم کے اندر اور ارد گرد اُگنے والے پودوں کا مشاہدہ کریں۔ اپنے ٹیچر کی نگرانی میں وہاں موجود پودوں کے چند نمونے اکٹھے کریں۔

2- وہاں موجود مختلف اقسام کے جانور دیکھیں اور (insect net) استعمال کر کے نمونے حاصل کریں۔

3- ایکوسسٹم کے مختلف حصوں سے پانی اور مٹی کے نمونے اکٹھے کریں۔ ہینڈ لینز یا مائیکروسکوپ استعمال کر کے پانی کے نمونوں کا مشاہدہ کریں۔


☆ مندرجہ ذیل ٹیبل مکمل کریں۔

کوئی خاص خصوصیات	عام خصوصیات	جانور یا پودے کا نام
		پروڈیوسرز
		پرائمری کنزیومرز
		سیکنڈری کنزیومرز
		ٹشری کنزیومرز
		ڈی کمپوزرز
		مٹی
		پانی
		ٹمپریچر





1- خشکی کے ایکوسسٹم (terrestrial ecosystem) کی مثال دیں۔ یہ کس طرح سے تالاب کے ایکوسسٹم سے مختلف ہے؟



2- آپ کنزیومرز کی مختلف اقسام سے واقف ہیں یعنی پرائمری کنزیومرز، سیکنڈری کنزیومرز اور ٹرنشری کنزیومرز۔ اوٹونی وورز (omnivores) کنزیومرز کی کون سی قسم میں شامل ہیں؟

3- تالاب کس طرح ایک خود کفیل اور خود نگہدار (self-regulatory) سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے؟

4- تالاب کے ایکوسسٹم میں عموماً کن اقسام کے ڈی کمپوزرز پائے جاتے ہیں؟

بائیو ٹیکنالوجی

تجربہ
17.1

آٹے اور دودھ کی فرمینٹیشن (Fermentation) میں پیسٹ (Yeast) اور
بیکٹیریا کے کردار کی تحقیق کرنا

تاریخ:

Fermentation of Milk

دودھ کی فرمینٹیشن

-a



گرم ٹمبرچر پر بیکٹیریا کے کلچر سے ہونے والی دودھ کی فرمینٹیشن سے دہی بنتا ہے۔ دودھ میں لیکٹوز (lactose) پایا جاتا ہے۔ لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا (lactic acid bacteria) مثلاً لیکٹوبیسس لس (Lactobacillus) سے بننے والے اینزائمز لیکٹوز کی فرمینٹیشن سے لیکٹک ایسڈ (lactic acid) بنا سکتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا دودھ میں موجود لیکٹوز کی فرمینٹیشن کرتے ہیں اور دہی بنا دیتے ہیں۔

دودھ کا ایک کپ، کاغذی کپ، ایک چمچ دہی، چمچ، چاول یا بنسن برنر (Bunsen burner)، ماچس، پیکر



1- تازہ دودھ کو آہستہ آہستہ 85 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کریں اور اسے 2 منٹ تک اسی ٹمبرچر پر رکھیں (تا کہ مائیکرو آرگنزمز ختم جائیں)۔

2- دودھ کو آہستہ آہستہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹھنڈا کریں۔

3- کپ میں ایک چمچ کے برابر دہی رکھیں۔

4- کپ کو دودھ سے بھر دیں اور اسے ہلائیں۔

5- کپ کو چمچنے والے کاغذ (cling wrap) یا کسی اور طرح

سے ڈھانپ دیں اور اسے اوون (oven) یا گرم جگہ

پر 40 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھ دیں۔



کیا آپ جانتے ہیں؟

☆ دہی بنانے کا آغاز بالکان (Balkans) اور مڈل ایسٹ (Middle East) میں ہوا تھا؛ اب یہ طریقہ ایشیا، یورپ اور امریکہ میں بہت مقبول ہے۔



احتیاطیں

☆ فرمینٹیشن کے دوران کپچر کا ٹمبرچر 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے نہیں بڑھنا چاہیے۔
☆ کپچر کو ٹھنڈی جگہ پر نہ رکھیں کیونکہ کم ٹمبرچر پر فرمینٹیشن نہیں ہوگی۔



شکل 17.1: دہی بنانا

☆ مکسچر کی طبعی ساخت کے حوالہ سے اپنے مشاہدات ریکارڈ کریں۔



Fermentation of Flour

-b آٹے کی فرمٹیشن

پیسٹ آٹے کی فرمٹیشن کرتے ہیں۔ آٹے میں سٹارچ پایا جاتا ہے۔ جب آٹے کو گھیلا کیا جاتا ہے تو سٹارچ کا کچھ حصہ شوگر مالتوز (maltose) میں ٹوٹ جاتا ہے۔ جب آٹے کے پیڑے (dough) میں پیسٹ ملایا جاتا ہے تو یہ فرمٹیشن کرتا ہے اور شوگر کو مزید توڑ دیتا ہے۔



آٹا، جار، پانی، بیکر، بیکرز پیسٹ (Baker's Yeast)





- 1- ایک چمچ بیکرز پیسٹ کو پانی کی تھوڑی سی مقدار میں چند منٹ تک بھگوئیں۔
- 2- ایک پیالہ لیں اور اس میں آٹا رکھیں۔
- 3- آٹے میں پانی ملائیں۔ اس میں پیسٹ شامل کریں اور پیڑا بنالیں۔
- 4- پیالہ کو 4 سے 6 گھنٹوں تک کمرہ کے ٹمپرچر پر رکھیں۔



فصل 17.2: آٹے کی فرمیشن


کمچر کی طبعی ساخت کے حوالہ سے اپنے مشاہدات ریکارڈ کریں۔





پسچرائزیشن (Pasteurization) سے کیا مراد ہے؟

-1



فرمنٹیشن کے دوران ہم نے ٹمپرچر 40 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان کیوں رکھا؟

-2

دودھ کی فرمنٹیشن کر کے ہم کھانے کی اور کون سی چیزیں حاصل کرتے ہیں؟

-3

فرمنٹیشن کے بعد آٹے کو استعمال کر کے کھانے کی اور کون سی چیزیں تیار کی جاتی ہیں؟

-4

ذہنی آزمائش



- ☆ فرمنٹیشن عمل سے پہلے تازہ دودھ کو پسچرائز (Pasteurize) کیوں کیا جاتا ہے؟
- ☆ روٹی کو ریفریجریٹر میں رکھنا کیوں اہم ہوتا ہے؟