


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(In the Name of Allah, the Most Merciful, the Most Compassionate)

10

کیمیستری (ٹیک)



پنجاب ایجوکیشن، کریکولم، ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی

یہ نصابی کتاب پاکستان کے 2023 کے اپ ڈیٹ شدہ / نظر ثانی شدہ قومی نصاب کے مطابق تیار کی گئی ہے۔
جملہ حقوق (کاپی رائٹ) بحق پنجاب ایجوکیشن، کریکولم، ٹریننگ اینڈ اسسٹنٹ اتھارٹی محفوظ ہیں۔
یہ کتاب پنجاب ایجوکیشن، کریکولم، ٹریننگ اینڈ اسسٹنٹ اتھارٹی کی تیار کردہ ہے۔ تحریری اجازت کے بغیر اس کتاب کا کوئی حصہ کسی امدادی کتاب، خلاصہ، ماڈل پیپر یا گائیڈ وغیرہ میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔

مصنف

ڈاکٹر عابد فیاض (پی ایچ ڈی، آرکیٹیکٹ کیمسٹری)
یونیورسٹی آف ایسٹ اینگلیا نارویج یونیورسٹی ڈنمارک

ایڈیٹس ریویو کمیٹی ممبرز

- ڈاکٹر افتخار حسین اسوسی ایٹ پروفیسر (کیمسٹری)، گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف سائنس، وحدت روڈ، لاہور
- ڈاکٹر طارق محمود اسسٹنٹ پروفیسر (کیمسٹری)، گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف سائنس، وحدت روڈ، لاہور
- ڈاکٹر روبینہ منیر اسسٹنٹ پروفیسر (کیمسٹری)، کینٹر ڈیپارٹمنٹ آف وٹن، لاہور
- ڈاکٹر صبا حیدر ایس ایس ای (کیمسٹری)، گورنمنٹ کپری سینس گرلز ہائیڈری سکول، وحدت روڈ، لاہور
- میس شمیمہ گل اسسٹنٹ ڈائریکٹر کریکولم سائنس، سیٹھا

ایکسٹرنل ریویو کمیٹی ممبرز

- ڈاکٹر محمد منعم المحبوب پروفیسر آف کیمسٹری، گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف سائنس، وحدت روڈ، لاہور
- ڈاکٹر عظمت محمود حاصم اسسٹنٹ پروفیسر، گورنمنٹ اسلامیہ اسوسی ایٹ کالج، لاہور کینٹ۔
- حافظہ سرین کوثر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر (ایس ای او)، لاہور
- ڈاکٹر امتیاز حسین پرنسپل (ر)، گورنمنٹ گریجویٹ کالج، سندھری، ڈسٹرکٹ فیصل آباد

چشم کشی برائے اختصار

- ڈاکٹر امتیاز حسین پرنسپل (ر)، گورنمنٹ گریجویٹ کالج سندھری، ضلع فیصل آباد
- پروفیسر جاوید اقبال گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف سائنس، وحدت روڈ، لاہور
- پرنسپل (ر)، گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف سائنس، وحدت روڈ، لاہور
- ڈائریکٹر کریکولم اینڈ کیمپس، سیٹھا
- ڈپٹی ڈائریکٹر کریکولم سائنس، سیٹھا

پیش کش ریویو کمیٹی

- میسٹر نادر شفیق چوہدری
- میسٹر افتخار الحق
- میسٹر محمد اختر اسماعیل
- ڈائریکٹر کریکولم اینڈ کیمپس
- میسٹر عامر ریاض
- انچارج آرٹ سیل
- محترمہ عائشہ صادق
- کران محمود
- میسٹر محمد الطاف الرحمان
- ڈپٹی ڈائریکٹر کیمپس سائنسز
- سید صغیر احسن ترمذی
- ڈائریکٹر اینڈ لے آؤٹ
- سید محمد لاریب

کوآرڈینیٹر
مس شمیمہ گل AD (C-Sc)
میسٹر محمد نعیم آفتاب
مس بشری انصاری

تیار کردہ: احسن پبلشرز، لاہور

تحریراتی ایڈیشن

DATE OF PRINTING	PMIU	PEF	TOTAL QUANTITY
February 2026	120,379	307	120,686

ناشر: پنجاب ایجوکیشن، کریکولم، ٹریننگ اینڈ اسسٹنٹ اتھارٹی، لاہور۔
مطبع: شیڈر ڈبک ہاؤس، اردو بازار، لاہور۔



صفحہ نمبر	عنوانات	باب نمبر
1	مادہ کی حالتیں اور اُن میں تبدیلیاں (States of Matter and Phase Changes)	13
11	سٹائکیومیٹری (Stoichiometry)	14
24	الیکٹروکیمسٹری (Electrochemistry)	15
41	ری ایکشن کا کینٹیکس (Reaction Kinetics)	16
49	سالتس (Salts)	17
53	نائٹروجن اور سلفر (Nitrogen and Sulphur)	18
63	پانی (Water)	19
73	آرگینک کیمسٹری (Organic Chemistry)	20
89	ہائڈروکاربنز (Hydrocarbons)	21
96	مونو ہائڈروکسی الکینز یا الکوحلو (Monohydroxy Alkanes or Alcohols)	22
102	کاربوکسلک ایسڈز (Carboxylic Acids)	23
110	بائیو کیمسٹری (Biochemistry)	24
119	پولمرز (Polymers)	25
126	میزنگ سکیم / ماڈل پیپر	

مادہ کی حالتیں اور اُن میں تبدیلیاں

States of Matter and Phase Changes

حاصلاتِ تعلیم:

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ:

- ٹیمرچر میں تبدیلی کے ساتھ طبعی حالت (میٹلک، بوائٹنگ، فریزنگ، کنڈنسیشن، سب لیمیٹیشن اور ڈیپوزیشن) اور انٹرال انرجی میں تبدیلی کی کائی ہیکل پارٹیکل تھیوری کے لحاظ سے وضاحت کریں۔
- ایوپوزیشن اور بوائٹنگ کے درمیان فرق کی وضاحت کریں۔
- کائی ہیکل پارٹیکل تھیوری کے لحاظ سے بوائٹنگ، چارلس لا اور ایوپوگیڈروز لا کے حوالے سے گیس کے دباؤ، ٹیمرچر اور والیوم میں سے دو میں تبدیلی کا تیسرے پر ہونے والے اثرات کی وضاحت کریں۔
- بوائٹنگ اور ایوپوزیشن کی شرح پر بیرونی دباؤ کے اثر کا کوالیٹایٹو (Qualitative) لحاظ سے جائزہ لیں۔
- کائی ہیکل پارٹیکل تھیوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیفیوژن کی تشریح کریں۔
- ڈیفیوژن کی شرح پر مالدیوڈر ماس اور ٹیمرچر کے اثرات کا کوالیٹایٹو (Qualitative) جائزہ لیں۔

اس دنیا میں مادہ چار حالتوں میں پایا جاتا ہے جس کو ٹھوس، مائع، گیس اور پلازما کہتے ہیں۔ ان چار حالتوں میں سے گیسوں کے خواص کا مطالعہ سب سے پہلے کیا گیا۔ گیسوں کے طبعی خواص مثلاً اُن کا سٹوڈ جانا یا پھیل جانا اور نفوذ (Diffuse) ہو جانا آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ گیسیں چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہیں جو کہ لگاتار ہر سمت میں گھوم رہے ہیں۔ ان خیالات کی بنیاد پر گیسوں کی کائی ہیکل پارٹیکل تھیوری (Kinetic Particle Theory) بنائی گئی۔

کائی ہیکل پارٹیکل تھیوری کی مدد سے ہم نہ صرف گیسوں سے متعلق قوانین کی وضاحت کر سکتے ہیں بلکہ مادہ کی ٹھوس اور مائع حالتوں کی کمپوزیشن اور مادہ کی تینوں حالتوں میں باہمی تبدیلیوں کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا اس لیے آسان ہے کہ مادہ کی تینوں حالتیں صرف طبعی طور پر مختلف ہیں جبکہ ان کی کیمیائی ساخت بالکل ایک جیسی ہے۔ مثال کے طور پر پانی اپنی تینوں حالتوں میں فرق کے باوجود کیمیائی طور پر ایک ہی کمپاؤنڈ ہے۔

کائی ہیکل پارٹیکل تھیوری کے مطابق گیسیں چھوٹے چھوٹے ذرات کا مجموعہ ہوتی ہیں جو کہ ہر ممکن سمت میں لگاتار حرکت کرتے رہتے ہیں۔ کسی گیس کا پریشر اُس کے ذرات کے برتن کی دیواروں کے ٹکرانے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ چونکہ کسی گیس کا پریشر مخصوص ٹیمرچر پر مستقل رہتا ہے اس لیے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ گیس کے ذرات کے ٹکراؤ کے دوران اُن کی انرجی نہ کم ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ۔ علاوہ



اگرچہ یہ بات بھی فرض کی گئی ہے کہ چونکہ گیس کے ذرات کے درمیان کم پریشر پر بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے اس لیے ان ذرات کے درمیان کشش کی قوتیں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ گیس کے ذرات کی اوسط کائیٹک انرجی کا انحصار اس کے ٹمپریچر پر ہے۔ بشرطیکہ ٹمپریچر کو کیلون (Kelvin) کیل پر مپایا جائے۔ تمام گیسوں کی اوسط کائیٹک انرجی ایک جیسے ٹمپریچر پر ایک جیسی ہوتی ہے۔

کائیٹک تھیوری کے مطابق گیس کے ذرات کے مقابلے میں مائع کے ذرات بہت قریب قریب ہوتے ہیں اور یہ بھی ہر سمت میں ہر

✓ قابل غور بات!

گیس اور مائع میں موجود ذرات تینوں قسم کی حرکت یعنی ٹرانس لینیشنل، روتیشنل (Translational, Rotational) اور وائبریشنل (Vibrational) حرکت کر سکتے ہیں۔

وقت حرکت کرتے رہتے ہیں۔ نتیجتاً مائع کے ذرات کی کوئی مستقل پوزیشن نہیں ہوتی اور اس لیے ان کی شکل و صورت بھی مستقل نہیں ہوتی۔ تاہم مائع کے ذرات کے درمیان موجود کشش کی قوتوں کی وجہ سے یہ آپس میں جڑے رہتے ہیں اس لیے مائع کا وایوم (Volume) مستقل ہوتا ہے اور یہ اپنی سطح ہموار بھی رکھتی ہے۔ مائع حالت میں موجود ذرات تینوں قسم کی حرکت کر سکتے ہیں۔

ٹھوس اشیا آئنز، ایٹمز یا مالیکیولز پر مشتمل ہوتی ہیں۔ کائیٹک تھیوری کے مطابق ٹھوس اشیا میں موجود ذرات کے درمیان کشش کی قوت بہت مضبوط ہونے کی وجہ سے ذرات ترتیب سے اپنی اپنی مستقل پوزیشنز پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ ذرات اپنی ان پوزیشنز پر صرف وائبریت (Vibrate) کر سکتے ہیں۔ ان محدود حرکات کی وجہ سے ٹھوس اشیا کی اشکال اور وایوم بھی مخصوص ہوتے ہیں۔

13.1 انٹرنل انرجی (Internal Energy)

کسی سسٹم کی انٹرنل انرجی دراصل اس کی مجموعی انرجی کے برابر ہوتی ہے۔ اس میں ذرات کی حرکات کی وجہ سے کائیٹک انرجی اور ذرات کے درمیان موجود کیمیائی بانڈ کی وجہ سے پوٹینشل انرجی دونوں شامل ہیں۔ کسی شے کو گرم کرنے سے اس کی انٹرنل انرجی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

- 1- ٹرانس لینیشنل موٹن (Translational Motion) کیا ہوتی ہے؟
- 2- کیا گیسوں اور مائع کے ذرات کی اوسط کائیٹک انرجی کس خاص ٹمپریچر پر ایک جیسی ہوتی ہے؟

فوری جانچ 13.1

13.2 مادہ کی طبعی حالتوں میں تبدیلیاں (Interconversion of Physical States of Matter)

(Conversion of a Solid into a Liquid) کسی ٹھوس کا مائع میں تبدیل ہونا

کسی ٹھوس کی طبعی حالت کو گرم کرنے سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ گرم کرنے سے ٹھوس میں موجود ذرات تیزی سے وائبریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک خاص ٹمپریچر پر جب ان کی وائبریشن (Vibration) بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان کے درمیان کشش کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ٹھوس شے پگھلنا شروع ہو جاتی ہے اس ٹمپریچر کو ٹھوس کا میلٹنگ پوائنٹ (Melting Point) کہتے ہیں۔ اس میلٹنگ پوائنٹ پر ٹھوس کے ذرات نہ صرف اپنی مستقل پوزیشنز چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ان کے درمیان کسی قسم کی ترتیب بھی برقرار نہیں رہتی۔ یہ ٹھوس پھر اس طرح اپنی مائع حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ شکل (13.1)۔





فصل (13.1) برف کا پگھلنا

کسی ٹھوس شے کو جب گرم کیا جاتا ہے تو میلنگ پوائنٹ تک پہنچنے سے پہلے یہ ہیٹ انرجی (Heat Energy) دو کام کرتی ہے ایک تو ٹھوس کے ذرات کی کائی فیک انرجی میں اضافہ کرتی ہے، دوسرا ان ذرات میں موجود کشش کی قوتوں کو کمزور کرتی ہے۔ مزید گرم کرنے سے جب یہ ٹھوس مائع میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا ٹمپریچر نہیں بڑھتا۔ اس مرحلہ پر ٹھوس کو دی جانی والی ہیٹ ساری کی ساری اس ٹھوس کو مائع میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

کسی مائع کا گیس میں تبدیل ہونا (Conversion of a Liquid Into a Gas)

مائع کے مالیکیولز تمام ٹمپریچرز پر اس کی سطح سے متواتر نکلتے رہتے ہیں۔ اس طرح مالیکیولز کا نکل کر ہوا میں شامل ہونا ایوپوریشن (Evaporation) کہلاتا ہے۔ جب مائع کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کے ذرات کی کائی فیک انرجی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ایوپوریشن کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے۔ مائع کو اور زیادہ گرم کرنے سے اس کے مالیکیولز کی کائی فیک انرجی اور زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ان کے درمیان کشش کی قوتیں خاصی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس موقع پر مائع کے اندر سے ٹیلبلے تیزی سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہاں پر مائع کا ویپر پریشر (Vapour Pressure) اُس کی سطح پر پڑنے والے بیرونی پریشر کے مساوی ہو جائے تو مائع اُبلنا شروع کر دیتی ہے۔ کسی ٹمپریچر پر جب مائع کا ویپر پریشر اُس کی سطح پر موجود ایٹموسفیرک یا بیرونی پریشر کے برابر ہو جائے تو اس ٹمپریچر کو مائع کا بوائنگ پوائنٹ (Boiling Point) کہتے ہیں۔

کسی مائع کے بوائنگ پوائنٹ پر جو ہیٹ اس کو دی جاتی ہے وہ مائع کو گیس میں تبدیل ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہے جب کہ مائع کا ٹمپریچر نہیں بڑھتا۔ دوسرے الفاظ میں، اس موقع پر مائع کو جو ہیٹ مہیا کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری مالیکیولز کے درمیان موجود کشش کی قوتوں کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

کسی گیس کا مائع میں تبدیل ہونا (Conversion of a Gas into its Liquid)

جس کسی گیس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو اس میں موجود مالیکیولز کی کائی فیک انرجی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مالیکیولز قریب آ جاتے ہیں اور ان کے درمیان کشش کی قوتیں بھی خاصی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کسی موزوں ٹمپریچر پر کشش کی قوتیں اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ گیس کے مالیکیولز بہت قریب آ کر اس کو مائع میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس عمل کو کنڈنسنیشن (Condensation) کہتے ہیں۔ اس تبدیلی کے دوران گیس کا ٹمپریچر بدستور مستقل رہتا ہے۔ حتیٰ کہ ساری گیس مائع میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

13.3 ایوپوریشن اور بوائنگ (Evaporation and Boiling)

جب پانی کو کسی کھلے برتن میں عام بیرونی پریشر پر کچھ دیر رکھیں تو اس کی سطح سے خود بخود تسلسل سے بخارات نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ برتن میں پانی کی سطح نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اس مظاہر کو ایوپوریشن کہتے ہیں اور یہ بدستور ہر ٹمپریچر پر جاری رہتا ہے۔






اگر ہم پانی کا ٹمپرچر بڑھا دیں تو ایو پوریشن کی رفتار تیز ہو جاتی ہے کیونکہ سطح سے پانی کے مالکیولز زیادہ تعداد سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر پانی کا ٹمپرچر مزید بڑھا یا جائے تو ایک ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ پانی کے مالکیولز کی کافی ٹھیک انرجی اپنی زیادہ سے زیادہ حد کو پہنچ جاتی ہے۔ اس صورتحال میں اگر ہم اسے مزید گرم کریں تو یہ فراہم کردہ ہیٹ پانی کے مالکیولز کو کسی حالت میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوگی جب کہ پانی کا ٹمپرچر مستقل رہے گا۔ اس مرحلہ کو ہم بوائٹنگ کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سارے عمل کے دوران بیرونی پریشر بدستور مستقل رہتا ہے۔

ایو پوریشن اور بوائٹنگ میں فرق

ایو پوریشن	بوائٹنگ
1- یہ عمل پانی کی سطح پر آہستہ آہستہ وقوع پذیر آتا ہے۔	1- یہ عمل مائع پانی کو بھاپ میں تبدیل کرتا ہے اور اس دوران مستقل طور پر سارے پانی میں یکساں ہوتے رہتے ہیں اور اس دوران پانی پر پڑنے والا بیرونی ایٹموسفیرک پریشر بھی مستقل رہتا ہے۔
2- پانی کا ٹمپرچر بڑھنے سے ایو پوریشن کی رفتار بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔	2- یہ عمل بوائٹنگ کے ٹمپرچر تک پہنچنے سے پہلے تک بدستور جاری رہتا ہے۔
3- ایو پوریشن سے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔	3- بوائٹنگ سے ٹھنڈک پیدا نہیں ہوتی۔
4- اس عمل کے وقوع پذیر ہونے کے لیے بہت کم انرجی درکار ہوتی ہے جو کہ پانی کے اندر سے مہیا ہو جاتی ہے۔	4- بوائٹنگ کے لیے انرجی کے ایک بیرونی ماخذ کی ضرورت ہوتی ہے۔

ایو پوریشن اور بوائٹنگ کی رفتار پر بیرونی پریشر کا اثر

(Effect of External Pressure on the Rates of Evaporation and Boiling)



ایو پوریشن اور بوائٹنگ دونوں کی رفتار پر مائع کے اوپر پڑنے والے ایٹموسفیرک پریشر میں تبدیلی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

بیرونی پریشر کم ہونے سے ایو پوریشن کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے جب کہ بڑھنے سے یہ رفتار کم ہو جاتی ہے۔ جب ایک گھلے برتن میں موجود مائع کے مالکیولز اس کی سطح سے باہر نکلتے ہیں تو وہ فوراً بیرونی ہوا کے ساتھ مل جاتے ہیں اور بہت کم واپس مائع میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر مائع پر پڑنے والا بیرونی دباؤ زیادہ

ہو جائے تو سطح سے نکلنے والے مالکیولز ہوا میں شامل ہونے کی بجائے مائع میں واپس چلے جاتے ہیں۔ نتیجتاً ایو پوریشن کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے۔





جب کسی مائع کو بوائل (Boil) کیا جاتا ہے تو اس کے اندر مسلسل بجلی بنتے رہتے ہیں جو کہ اوپر اُٹھ کر مائع کی سطح پر آ کر پھٹ جاتے ہیں، اس دوران مائع کا ٹھیرچر مستقل ایک جگہ پر رہتا ہے۔ اس ٹھیرچر کو بوائٹنگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ اگر آپ کراچی میں پانی کا بوائٹنگ پوائنٹ نکالیں تو یہ 100°C ہوگا تاہم اگر یہی بوائٹنگ پوائنٹ مری میں نکالا جائے تو یہ 98°C ہوتا ہے۔ مری میں چونکہ بیرونی ایٹموسفیرک پریشر کراچی کی نسبت کم ہوتا ہے اس لیے پانی یہاں پر جلدی بوائل کر جاتا ہے۔

13.4 سب لیمیشن (Sublimation)

کسی ٹھوس شے کا مائع حالت میں تبدیل ہوئے بغیر براہ راست بخارات میں تبدیل ہو جانا سب لیمیشن کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹھوس کاربن ڈائی آکسائیڈ جسے ڈرائی آئس (Dry Ice) بھی کہتے ہیں عام ٹھیرچر پر مائع حالت میں تبدیل ہونے کے بغیر سیدھا گیس حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سب لیمیشن کی ایک اور مثال عام ملنے والی فائل کی گولیوں کا خود بخود غائب ہو جانا ہے۔ یہ گولیاں ادنیٰ کپڑوں کے اندر رکھی جاتی ہیں تاکہ نقصان پہنچانے والے کیڑے دُور رہیں۔

ایوپوریشن کی طرح سب لیمیشن کے لیے بھی انرجی شے کے اندر سے مہیا ہوتی ہے۔ یہ شے پھر اپنی انرجی میں ہونے والی کمی کو ماحول سے لے کر پوری کرتی ہے۔ یہ انرجی مالیکیولز کے درمیان کشش کی قوتوں کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ مالیکیولز پھر آزاد حالت میں بخارات بن کر اُڑ جاتے ہیں۔

ڈیپوزیشن (Deposition)

یہ مظاہر سب لیمیشن کے الٹ ہے اور اس میں ایک گیس مائع میں تبدیل ہونے کے بغیر سیدھی ٹھوس حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں آبی بخارات کا ٹھہرے میں تبدیل ہونا ڈیپوزیشن کی ایک مثال ہے۔

13.2 فوری جانچ

- 1- ایوپوریشن کے عمل کے دوران کیا مائع کے ٹھیرچر میں تبدیلی آتی ہے؟
- 2- کیا برف سب لائم (Sublime) کرتی ہے؟
- 3- اوپر دی گئی مثالوں کے علاوہ سب لیمیشن اور ڈیپوزیشن کی ایک ایک مثال دیں۔

13.5 گائیٹک تھیوری اور گیسوں کے قوانین (Kinetic Theory and Gas Laws)

پریشر اور وولیم کے درمیان تعلق۔ بوائل کا قانون (Pressure-Volume Relationship Boyle's Law)

گائیٹک تھیوری کی رُو سے کسی گیس کا پریشر اُس میں موجود مالیکیولز کے برتن کی دیواروں سے ٹکرانے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ اس پریشر کا انحصار ٹکرانے والے مالیکیولز کی تعداد پر ہے کہ جو دیئے ہوئے وقت میں دیواروں سے ٹکراتے ہیں۔

جب کسی گیس کی خاص مقدار پر اور ایک خاص ٹھیرچر پر بیرونی پریشر بڑھایا جاتا ہے تو اس کے مالیکیولز کے درمیان موجود فاصلہ کم ہو جاتا ہے جس سے گیس کا وولیم کم ہو جاتا ہے۔ اگر بیرونی پریشر ڈال کر گیس کے وولیم کو آدھا کر دیا جائے تو اس میں موجود مالیکیولز کی تعداد





بالفاظ والیوم ڈگنی ہو جائے گی۔ اس کے نتیجہ میں برتن کی دیواروں سے ٹکرانے والے مالیکیولز کی تعداد بھی ڈگنی ہو جائے گی۔ چونکہ ٹکرانے والی مالیکیولز کی تعداد ڈگنی ہوگئی ہے اس لیے اس گیس کا پریشر بھی ڈگنا ہو جائے گا۔ ان مشاہدات کی بدولت آئرلینڈ کے رہنے والے کیمسٹ رابرٹ بوائل نے گیس کے پریشر اور اس کے والیوم کے درمیان تعلق کا قانون وضع کیا۔ اس قانون کی رُو سے کسی گیس کی خاص مقدار کے والیوم اور اس کے پریشر کے درمیان مخالف تعلق ہے بشرطیکہ اس گیس کا ٹمپریچر مستقل رکھا جائے۔ دوسرے الفاظ میں جب اس گیس کا والیوم کم ہوگا تو اس کا پریشر زیادہ ہوگا اور جب والیوم زیادہ ہوگا تو پریشر کم ہوگا۔

علم ریاضی کی رُو سے اس تعلق کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔


$$V \propto \frac{1}{P} \quad (V \text{ کسی گیس کی خاص مقدار کا والیوم ہے جبکہ } P \text{ اس کا پریشر ہے۔})$$

سرگرمی 13.1

بوائل کے قانون کی تجرباتی تصدیق

رابرٹ بوائل نے اپنے بنائے ہوئے پریشر اور والیوم کے درمیان تعلق کے قانون کو درج ذیل سادہ تجربہ سے ثابت کیا۔

اس مقصد کے لیے اس نے انگریزی حرف L کی شکل کی ایک گلاس ٹیوب لی اور اس کے چھوٹے بازو کو بند کر دیا جیسا کہ شکل (13.3) میں دکھایا گیا



ہے۔ اس کے بعد اس نے اس ٹیوب کی بڑے بازو میں مرکری (Mercury) انڈیل دی جس سے چھوٹے بازو میں موجود ہوا اس کے اندر ہی قید ہوگئی چونکہ اس نے مرکری کی بہت کم مقدار استعمال کی اس لیے یہ مقید ہوا سکڑنے سے محفوظ رہی اور اس پر پریشر عام ہوا کے پریشر کے برابر ہی تصور کیا گیا۔ بوائل نے پھر بڑے بازو میں مزید مرکری ڈالی حتیٰ کہ دونوں بازوؤں میں مرکری کی سطحوں کے درمیان 760 ملی میٹر کا فاصلہ ہو گیا۔ اس طرح اس نے مقید ہوا پر پڑنے والے پریشر کو دوگنا کر دیا (2x760 ملی میٹر)۔ اس عمل کے بعد جب اس نے مقید گیس کا والیوم نوٹ کیا تو وہ پہلے سے آدھا تھا۔ واضح رہے کہ اس تجربے کے دوران ہوا کے ماس اور اس کے ٹمپریچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔


اس تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ جب گیس پر پریشر ڈگنا کیا گیا تو اس کا والیوم آدھا رہ گیا اور یہی بوائل کا قانون بھی ہے۔

ٹمپریچر اور والیوم کے درمیان تعلق۔ چارلس کا قانون

(Temperature-Volume Relationship, Charles's Law)

کائی فٹک تھیوری کے مطابق اگر کسی گیس کے ٹمپریچر میں اضافہ کیا جائے تو اس گیس میں موجود مالیکیولز کی اوسط رفتار اور کائی فٹک انرجی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ مالیکیولز کی رفتار میں اضافہ کی وجہ سے برتن کی دیواروں کے ساتھ ان کے ٹکراؤ بھی بڑھ جاتے ہیں اور ٹکرائے کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان دونوں وجوہات کی وجہ سے گیس کا پریشر بھی بڑھ جاتا ہے۔ تاہم اگر گیس کا پریشر نہ بڑھنے دیا جائے تو پھر اس کے ٹمپریچر میں اضافہ کے وجہ سے اس کا والیوم بڑھ جائے گا۔ اس عمل کا بڑی آسانی سے مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر





گیس ایک سلنڈر میں موجود ہو اور اس سلنڈر کے ساتھ پستون لگا ہو جیسا کہ شکل (13.4) میں دکھایا گیا ہے جب گیس کو گرم کیا جاتا ہے تو پستون لازمی طور پر اوپر حرکت کرے گا جس سے سلنڈر میں موجود گیس کا والیوم بڑھ جائے گا۔ یاد رہے کہ اس عمل کے دوران گیس پر پڑنے والا پریشر مستقل رہے گا۔

ایک فرانسیسی سائنس دان جیکوس الیگزینڈر چارلس (Jacques Alexander Charles) نے اوپر دیے گئے مشاہدات کو ایک قانون کی شکل دے دی۔ اس قانون کو چارلس کا قانون کہتے ہیں اس قانون کے مطابق اگر کسی گیس کی خاص مقدار

کا ٹمپریچر بڑھایا جائے تو اس کا والیوم بھی بڑھ جائے گا بشرطیکہ اس پر پڑنے والا پریشر مستقل رہے۔ چارلس کے اس قانون کے مطابق گیس کا ٹمپریچر ہمیشہ کیلون سکیل میں ماپا جاتا ہے۔

ریاضی کے مطابق $V \propto T$ (گیس کا ماس اور اس پر پڑنے والا پریشر مستقل رہتا ہے۔)

ایووگنیڈرو کا قانون (Avogadro's Law)

کافی عینک تھیوری کے مطابق کسی گیس کا پریشر اس میں موجود مالیکیولز کا برتن کی دیواروں کے ساتھ ٹکرانے سے وجود میں آتا ہے۔ مزید یہ کہ ان کے پرینٹ ایر یا ٹکرانے کا انحصار ان کی تعداد اور ان کی رفتار پر ہے۔

اگر آپ کے پاس دو ایک جیسے برتن ہیں اور ان میں گیس کی ایک ہی مقدار کسی خاص ٹمپریچر پر اور پریشر پر موجود ہے اور آپ کسی ایک برتن میں مزید گیس داخل کر دیتے ہیں تو قدرتی طور پر اس برتن میں موجود گیس کا پریشر بڑھ جائے گا۔ اگر آپ اس پریشر کو بڑھنے نہ دیں تو لازمی طور پر اس کا پھر والیوم بڑھ جائے گا۔ گیس کے والیوم میں اضافہ کی وجہ سے اس برتن میں موجود گیس کا پریشر پہلے جتنا ہو جائے گا۔ اس مشاہدہ سے یہ نتیجہ نکلا اگر کسی برتن میں گیس کے مالیکیولز کی تعداد زیادہ ہوگی تو لازمی طور پر اس کا والیوم بھی زیادہ ہوگا بشرطیکہ ہم اس گیس کا پریشر اور ٹمپریچر تبدیل نہ ہونے دیں۔

ایووگنیڈرو نے ان مشاہدات کو ایک قانون کی شکل میں پیش کیا۔ اس قانون کے مطابق ایک جیسے والیوم رکھنے والے برتنوں میں ہند مختلف گیسوں میں موجود مالیکیولز کی تعداد لازمی طور پر ایک جیسی ہوگی اگر ان کا ٹمپریچر اور پریشر ایک جیسا رکھا جائے گا۔

ریاضی کے مطابق $V \propto n$ (پریشر اور ٹمپریچر مستقل رہیں گے)

13.6 ڈیفیوژن (Diffusion)

مختلف گیسوں میں موجود مالیکیولز ہر سمت میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ مالیکیولز کی اس حرکت کی وجہ سے مختلف گیسیں زیادہ ارتکاز والے ایر یا سے کم ارتکاز والے ایر یا میں نہ صرف پھیل جاتی ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ یکجا بھی ہو جاتی ہیں۔ گیسوں کے یکجا ہونے کی اس خاصیت کو ڈیفیوژن کہتے ہیں۔ جب جسم میں لگانے والے پرفیوم کی بوتل کو کھولا جاتا ہے تو اس میں نکلنے والی خوشبو آہستہ آہستہ ڈیفیوژن کی





وجہ سے سارے کمرے میں پھیل جاتی ہے شکل (13.5) میں ہائڈروجن گیس کو ایک برتن سے دوسرے برتن میں منتقل یا ڈیفوز (Diffuse) ہوتا دکھایا گیا ہے۔ ڈیفیوژن ایک خود بخود ہونے والا عمل ہے اور اس کی بدولت گیس کے ذرات ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔




مختلف گیسوں کا مختلف رفتار سے پھیلنے یا ڈیفوز ہونے کے عمل کو کائی فیکس تصویر سے واضح کیا جاسکتا ہے۔ کائی فیکس تصویر کے مطابق تمام گیسوں میں موجود مالیکیولز کی اوسط کائی فیکس انرجی ایک ہی ٹیپر پچر پر یکساں ہوتی ہے چونکہ ہائڈروجن آکسیجن کی نسبت ایک ہلکی گیس ہے اس لیے اس کے مالیکیولز کی رفتار بھی آکسیجن کے مالیکیولز سے زیادہ ہوگی بشرطیکہ دونوں گیسوں کا ٹیپر پچر ایک ہی ہو۔ نتیجتاً ہائڈروجن گیس آکسیجن گیس کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے ڈیفوز ہوگی۔

گیسوں کے ڈیفیوژن کی رفتار ٹیپر پچر بڑھنے سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ بلند ٹیپر پچر پر مالیکیولز کی کائی فیکس انرجی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ تیزی سے حرکت کرتے ہوئے نہ صرف کہ پھیل جاتے ہیں بلکہ یکجا بھی ہو جاتے ہیں۔

سرگرمی 13.2 مختلف گیسوں کا مختلف رفتار سے ڈیفوز ہوتی ہیں۔

100 سینٹی میٹر لمبی گلاس ٹیوب لیں جس کے دونوں سرے کھلے ہوں۔ روئی کے دو گولے لیں ایک کو ہائڈروجن کلورائیڈ گیس اور دوسرے کو امونیا گیس کے سیلینڈر میں ڈبو کر گیلا کر لیں۔ ان دونوں گولوں کو بیک وقت گلاس ٹیوب کے دونوں کھلے سروں کے اندر رکھیں، جس طرح کہ شکل (13.6) میں دکھایا گیا ہے دونوں گولوں میں سے یہ گیسیں علیحدہ علیحدہ نکل کر ٹیوب میں چلیں گی اور جہاں پر یہ دونوں ملیں گی وہاں سفید رنگ کا دھواں نظر آئے گا جو کہ امونیم کلورائیڈ کا دھواں ہوگا۔ ایک ہی وقت میں چلتے ہوئے ہائڈروجن کلورائیڈ گیس 40.5 سینٹی میٹر کا فاصلہ طے کرے گی جبکہ امونیا گیس اسی وقت میں 59.5 سینٹی میٹر فاصلہ طے کرے گی۔ اس سرگرمی سے ظاہر ہوا کہ امونیا گیس نے ہلکا ہونے کی وجہ سے ہائڈروجن کلورائیڈ کی نسبت زیادہ فاصلہ طے کیا۔



شکل 13.6 دو گیسوں کے ڈیفیوژن کی رفتار کا تقابلہ





فوری جانچ 13.3

- 1- ایک جیسے ٹیپر چر اور پریشر پر ذیل میں درج کون سی گیس سب سے زیادہ جلدی ڈیفوز ہوگی اور کون سی گیس ڈیفوز ہونے کے لیے سب سے زیادہ دیر لگائے گی۔ NO_2 , SO_2 , H_2S
- 2- کافی ٹھیک پارٹیکل تیوری کی مدد سے اس بات کی وضاحت کریں کہ امونیا گیس کیوں ہائڈروجن کلورائیڈ گیس کی نسبت جلدی ڈیفوز ہوتی ہے۔

مشق

A کثیر الانتخابی سوالات:

صحیح جواب پر (✓) کریں۔

- (i) کائیٹھک تیوری کے مطابق ٹھوس، مائع اور گیس کے درمیان بنیادی فرق اس وجہ سے ہے:
 - (الف) ذرات کی حرکت میں فرق
 - (ب) ذرات کی کیمیائی خصوصیات
 - (ج) ذرات کا سائز
 - (د) ذرات کی شکل
- (ii) ایوپوریشن کی شرح گرم کرنے پر:
 - (الف) گھٹتی ہے۔
 - (ب) بڑھتی ہے۔
 - (ج) یکساں رہتی ہے
 - (د) پہلے گھٹتی ہے پھر مزید گرم کرنے پر بڑھتی ہے
- (iii) ذرات کے مابین کشش سب سے زیادہ کس میں ہوتی ہے:
 - (الف) ٹھوس
 - (ب) مائع
 - (ج) پلازمہ
 - (د) گیس
- (iv) کچھ گیسوں کے بخارات کو ٹھنڈا کرنے پر یہ براہ راست ٹھوس حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس مظاہر کو کیا کہتے ہیں؟
 - (الف) ایوپوریشن
 - (ب) کنڈن سیشن
 - (ج) سب لمبیشن
 - (د) ڈیپوزیشن
- (v) طبعی حالت جس میں ذرات سب سے زیادہ توانائی رکھتے ہیں:
 - (الف) ٹھوس
 - (ب) مائع
 - (ج) گیس
 - (د) بخارات
- (vi) ایوپوریشن مائع کے مالیکولز میں موجود کشش پر کس طرح منحصر ہے؟
 - (الف) کشش میں اضافے کے ساتھ بڑھتی ہے
 - (ب) کشش میں اضافے کے ساتھ گھٹتی ہے
 - (ج) کشش کی طاقت پر منحصر نہیں ہوتی
 - (د) کشش کی طاقت میں اضافے کے ساتھ پہلے بڑھتی اور پھر کم ہوتی ہے
- (vii) کس گیس کے ڈیفوز ہونے کی شرح تیز ترین ہے؟
 - (الف) HCl
 - (ب) SO_2
 - (ج) H_2S
 - (د) CO_2
- (viii) ایک طالب علم نے صبح 6:30 پر میدان میں ٹمرہ کرتے دیکھا جو صبح 8:30 پر غائب ہو گیا۔ ٹمرے کو بخارات میں تبدیل کرنے سے کون سی طبعی تبدیلی وقوع پزیر ہوئی؟
 - (الف) میلنگ
 - (ب) ایوپوریشن
 - (ج) سب لمبیشن
 - (د) ڈیپوزیشن





B مختصر جوابی سوالات:

- 13.1 جب مائع ایوپوریشن ہوتی ہے تو توانائی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟
- 13.2 کیا کنڈن سیشن حرارت جذب کرنے والا عمل ہے؟
- 13.3 فینائل کی گولیاں (کیڑے مار دوائی) کچھ عرصے بعد تحلیل کیوں ہو جاتی ہیں؟
- 13.4 کیا مائع کو گیس کی طرح سکینرنا (Compress) ممکن ہے؟
- 13.5 لیب میں تجربے کے دوران کیا پانی کا بوائونگ پوائنٹ تبدیل کیا جاسکتا ہے؟
- 13.6 کس موسم میں گیلیے پٹرے نسبتاً زیادہ دیر سے سوکتے ہیں؟
- 13.7 جب ٹھوس کو گرم کیا جاتا ہے، تو مرتعش ذرات (Vibrating particles) کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
- 13.8 کیا ٹھوس اور مائع گیس کی طرح ڈیفوز ہوتے ہیں؟
- 13.9 شبنم کے قطرے صبح کے وقت کیوں بنتے ہیں؟

C تعمیری فکر پر مبنی سوالات:

- 13.1 ایوپوریشن اور بوائونگ میں فرق واضح کریں۔
- 13.2 بوائونگ کا بیرونی دباؤ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وضاحت کریں۔
- 13.3 ایوپوریشن کے لیے توانائی کی ضرورت کیوں نہیں ہوتی؟
- 13.4 جب برف پر دباؤ بڑھایا جاتا ہے تو وہ پگھلتی کیوں ہے؟
- 13.5 طبعی تبدیلیاں کیوں رونما ہوتی ہیں؟

D تفصیلی سوالات:

- 13.1 کائی ہیک تصوری کی بنیاد پر دو گیسوں کے درمیان ڈیفیوژن کی شرح میں فرق کی وضاحت کریں۔



سٹائکیومیٹری Stoichiometry

حاصلات قلم:

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ:

- گیسوں کے والیومز کو ناپنے کے لیے کمرے کے درجہ حرارت اور دباؤ پر 24 dm^3 کو لیٹر مولر گیس والیوم استعمال کریں۔
- g/dm^3 اور mol/dm^3 کا استعمال کرتے ہوئے، ارتکاز کی تعریف کریں اور ان کے مابین باہم تبدیلی واضح کریں۔
- اشیا کے درمیان سٹائکیومیٹرک تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ذیل میں درج اشیا کے درمیان تعلق کا حساب لگائیں۔
- (الف) ری ایکٹنٹس کے درمیان تعلق کا حساب، لمٹنگ ری ایکٹنٹس (Limiting Reactants) کے درمیان
- (ب) RTP پر گیسوں کے والیوم کا حساب
- (ج) g/dm^3 اور mol/dm^3 میں سلوشن کا والیوم اور سلوشن کے ارتکاز کا حساب
- (د) cm^3 اور dm^3 کے مابین باہم تبدیلی کا حساب
- مناسب معلومات کے ذریعے امپیریکل فارمولا اور مالیکیولر فارمولا معلوم کریں۔
- مناسب معلومات کے ذریعے فیصد پیلز، فی صد اجزائے ترکیبی (ماس) اور فیصد خالص پن معلوم کریں۔

14.1 مولر والیوم (Molar Volume)

گیس کا والیوم پریشور اور ٹمپریچر میں تبدیلی سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم مختلف گیسوں کے والیومز (Volumes) کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پریشور اور ٹمپریچر کی معیاری ویلیوز (Values) استعمال کرنا پڑیں گی ان معیاری ویلیوز کو کمرے کا ٹمپریچر اور کمرے کے پریشور (RTP) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کمرے کا معیاری ٹمپریچر 25°C یا 298.15 K اور اس کا معیاری پریشور ایک اسٹینڈرڈ پریشر (760 torr) ہے۔ گیسوں کے والیومز کا موازنہ کرنے کے لیے انہیں انہی معیاری شرائط میں ماپا جاتا ہے۔

یہ معلوم کیا گیا ہے کہ تمام گیسوں کے ایک مول کا والیوم RTP پر 24 dm^3 ہوتا ہے۔ اس ویلیوم کو مولر والیوم کہتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ تمام گیسوں کے ایک مول میں موجود مالیکیولز کی تعداد برابر ہوتی ہے اور RTP پر ان کے والیومز بھی ایک جیسے ہوتے ہیں تاہم ان کے ایک مول کے ماسز سب مختلف ہیں۔ دوسرے الفاظ میں مختلف گیسوں میں موجود مالیکیولز کے ماسز (Masses) اور سائز (Sizes) مختلف ہونے کے باوجود ان سب کے والیومز برابر ہیں۔ مولر والیوم کا نظریہ بہت مفید ہے کیونکہ یہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم گیسوں کے دیئے گئے والیومز کی مدد سے ان میں موجود مولز کی تعداد یا ان کے ماسز معلوم کریں۔

مثال: 14.1

نائٹروجن گیس کا والیوم RTP پر 2.5 dm^3 ہے۔ اس میں نائٹروجن گیس کے کتنے مولز موجود ہوں گے؟



حل:

$$\begin{aligned}
 1 \text{ mol} &= 24 \text{ dm}^3 \text{ نائٹروجن میں موجود مولز کی تعداد} \\
 \frac{1}{24} \text{ mol} &= 1 \text{ dm}^3 \text{ نائٹروجن میں موجود مولز کی تعداد} \\
 \frac{1}{24} \times 2.5 &= 2.5 \text{ dm}^3 \text{ نائٹروجن میں موجود مولز کی تعداد} \\
 0.10 \text{ mol} &=
 \end{aligned}$$

آپ اس سوال کو حل کرنے کے لیے ذیل میں درج ایکویشن (1) بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

$$\text{گیس کے مولز کی تعداد} = \frac{\text{گیس کا وولیم RTP پر}}{\text{گیس کا مولر وولیم}} \quad (1)$$

مثال: 14.2

ہائڈروجن گیس کے 0.5 مول RTP پر وولیم کیا ہوگا؟

حل:

$$\begin{aligned}
 \frac{\text{ہائڈروجن کا وولیم}}{24} &= 0.5 \quad \text{ایکویشن (1) کو اپلائی کریں۔} \\
 12 \text{ dm}^3 &= 0.5 \times 24 = \text{ہائڈروجن کا وولیم}
 \end{aligned}$$

مثال: 14.3

200 گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کا RTP پر وولیم معلوم کریں؟

حل:

$$\begin{aligned}
 \frac{\text{گیس کا وولیم}}{\text{گیس کا مولر وولیم}} &= \text{گیس کے مولز کی تعداد} \\
 \text{گیس کا وولیم} &= \text{گیس کا مولر وولیم} \times \text{مولز کی تعداد} \\
 \frac{\text{ماس}}{\text{مولر ماس}} &= \text{چونکہ گیس کے مولز کی تعداد} \\
 \text{کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کا وولیم} &= \text{ماس} \times \frac{\text{مولر وولیم}}{\text{مولر ماس}} \\
 109 \text{ dm}^3 &= 24 \text{ dm}^3 \times \frac{200 \text{ g}}{44 \text{ g}}
 \end{aligned}$$

فوری جانچ 14.1

100 dm³ کاربن ڈائی آکسائیڈ RTP پر موجود ہے۔ اس کا ماس معلوم کریں۔





14.2 سلوشن کا ارتکاز (Concentration of a Solution)

کسی سلوشن کا ارتکاز دراصل اس بات کی پیمائش کرتا ہے کہ سلوشن میں یا سولونیٹ میں سولیوٹ کی کتنی مقدار حل کی گئی ہے۔ حل ہونے والے سولیوٹ کی مقدار کو اس کے والیوم سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ والیوم dm^3 یا cm^3 میں ماپا جاتا ہے۔ اس والیوم/ماس ارتکاز کے لیے g/dm^3 کی اکائی استعمال ہوتی ہے جبکہ مولر ارتکاز کے لیے mol/dm^3 کی اکائی استعمال ہوتی ہے۔

مثال: 14.4

ایک سلوشن بنانے کے لیے 20 گرام سوڈیم کلورائیڈ کو $0.2 dm^3$ پانی میں حل کیا گیا ہے۔ اس سلوشن کا ارتکاز معلوم کریں۔

حل:

$$\text{ارتکاز} = \frac{\text{حل شدہ سولیوٹ کا ماس گراموں میں}}{\text{سلوشن کا والیوم } dm^3 \text{ میں}}$$

$$100 g/dm^3 = \frac{20}{0.2} =$$

مثال: 14.5

1.8 گرام ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس کو پانی میں حل کر کے $500 cm^3$ ہائیڈروکلورک ایسڈ بنایا گیا ہے۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ کا ارتکاز g/dm^3 میں معلوم کریں۔

حل:

اہم نکتہ

مولر ارتکاز اور مولیریتی دونوں سلوشن میں سولیوٹ کے ارتکاز کو ظاہر کرتے ہیں۔

$$0.5 dm^3 = \frac{500 cm^3}{1000} = \text{ہائیڈروکلورک ایسڈ کا والیوم } dm^3 \text{ میں}$$

$$\frac{1.8}{0.5} = \text{ہائیڈروکلورک ایسڈ کا ارتکاز}$$

$$3.6 g/dm^3 =$$

مثال: 14.6

$2 dm^3$ کا پرفسلیٹ سلوشن کا ارتکاز $15 g/dm^3$ ہے اس میں موجود کا پرفسلیٹ کی مقدار گراموں میں معلوم کریں۔

حل:

$$\text{کا پرفسلیٹ کا ماس گراموں میں} = \text{کا پرفسلیٹ کا ارتکاز } g/dm^3 \times \text{والیوم } (dm^3)$$

$$2 \times 15 =$$

$$30 g =$$





مثال: 14.7

1.2 dm^3 سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کا سلوشن بنانے کے لیے اس کے 10 گرام پانی میں حل کیے گئے ہیں۔ اس سلوشن کا ارتکاز mol/dm^3 میں معلوم کریں۔

حل:

فوری جانچ 14.2

کاپرسلفیٹ (CuSO_4) کے
 $5 \times 10^{-2} \text{ mol/dm}^3$
 ایکوس سلوشن کے 50 cm^3
 میں اس کا کتنا ماس ہوگا؟

$$10 \text{ g} = \text{سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کا ماس}$$

$$0.25 \text{ mol} = \frac{10}{40} = \text{سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے مولز}$$

$$0.21 \text{ mol/dm}^3 = \frac{0.25}{1.2} = \text{سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ سلوشن کا ارتکاز}$$

14.3 ماس کے لحاظ سے فی صد مقدار، امپیریکل فارمولا اور مالیکیولر فارمولا

Percentage Composition by Mass, Empirical Formula and Molecular Formula

ماس کے لحاظ سے فی صد مقدار

کسی کپاؤنڈ کی ماس کے لحاظ سے فی صد مقدار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں موجود ہر ایلیمنٹ کی فی صد مقدار کا پتہ ہونا، کسی کپاؤنڈ میں موجود ایلیمنٹ کی فی صد مقدار کا مطلب یہ ہے کہ اس کپاؤنڈ کے 100 g میں اس ایلیمنٹ کے کتنے گرام ہیں۔ ایلیمنٹ کی فی صد مقدار درج ذیل فارمولا سے معلوم کی جاتی ہے۔

$$\text{ایلیمنٹ کی فی صد مقدار} = \frac{\text{کپاؤنڈ میں موجود ایلیمنٹ کا ماس}}{\text{کپاؤنڈ کا فارمولا ماس}} \times 100 \quad (2)$$

کسی کپاؤنڈ کی فی صد مقدار معلوم کرنا ایک مفید عمل ہے کیونکہ اس سے ہم کپاؤنڈ کے خالص ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس سے امپیریکل اور مالیکیولر فارمولا معلوم کر سکتے ہیں۔ کپاؤنڈ کی فی صد مقدار ہم اُسکے فارمولا ماس کی مدد سے بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے پریکٹیکل سے بھی مدد لی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مثالیں ان دونوں طریقہ کار کی وضاحت کرتی ہیں۔

مثال: 14.8

کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ Ca(OH)_2 کی فی صد مقدار معلوم کریں۔

حل:

$$74 = 40 + 32 + 2 = \text{کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ کا فارمولا ماس}$$





دلچسپ معلومات

روزانہ ہمارے استعمال میں آنے والی اشیاء مثلاً شیشے، صفائی کے کیمیکلز، صابن، خوشبو پات اور کھادوں کے اجزائے ترکیبی کا فیصد سٹائیکو میٹری کی مدد سے کیا جاتا ہے۔

ایکویشن (2) کی مدد سے ہر ایلیمینٹ کی فی صد مقدار نکالیں

$$\text{ایلیمینٹ کی فی صد مقدار} = \frac{\text{کمپاؤنڈ میں موجود ایلیمینٹ کا ماس}}{\text{کمپاؤنڈ کا فارمولہ ماس}} \times 100$$

$$\text{کمپاسیم کی فی صد مقدار} = \frac{40}{74} \times 100 = 54.05 \%$$

$$\text{آکسیجن کی فی صد مقدار} = \frac{32}{74} \times 100 = 43.24 \%$$

$$\text{ہائڈروجن کی فی صد مقدار} = \frac{2}{74} \times 100 = 2.70 \%$$

مثال: 14.9

ایک کمپاؤنڈ کے 8.657 g جب اس کے ایلیمینٹس میں تحلیل کیا گیا تو 5.217 g کاربن، 0.962 g ہائڈروجن اور 2.478 g آکسیجن ملے۔ کمپاؤنڈ میں موجود ایلیمینٹس کی فی صد مقدار معلوم کریں۔

حل:

ذیل میں درج فارمولہ لگائیں۔

$$\text{ایلیمینٹ کی فی صد مقدار} = \frac{\text{ایلیمینٹ کا ماس}}{\text{کمپاؤنڈ کا ماس}} \times 100$$

$$\text{کاربن کی فی صد مقدار} = \frac{5.217 \text{ g}}{8.657 \text{ g}} \times 100 = 60.26 \%$$

$$\text{ہائڈروجن کی فی صد مقدار} = \frac{0.962 \text{ g}}{8.657 \text{ g}} \times 100 = 11.11 \%$$

$$\text{آکسیجن کی فی صد مقدار} = \frac{2.478 \text{ g}}{8.657 \text{ g}} \times 100 = 28.62 \%$$

پس 100 g زیر مطالعہ کمپاؤنڈ میں موجود ایلیمینٹس کی مقداریں بالترتیب کاربن کی 60.26 g ہائڈروجن کی 11.11 g اور آکسیجن 28.62 g ہیں۔

ایلیسینیم سلفیٹ $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ میں موجود سلفیٹ آئنز (SO_4^{2-}) کی فی صد مقدار معلوم کریں۔

فوری جانچ 14.3

14.4 امپیریکل فارمولہ (Empirical Formula)

کسی کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولہ اس میں موجود ایٹمز کے درمیان سادہ ترین نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہائڈروجن پر آکسائیڈ (H_2O_2) کا امپیریکل فارمولہ HO ہے جبکہ پانی (H_2O) کا H_2O ہی اور بینزین (C_6H_6) (Benzene) کا CH ہے۔





تمام آئینک کمپاؤنڈز کو ان کے امپیریکل فارمولاز سے ہی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ فارمولاز ان کمپاؤنڈز میں موجود آئینز کے درمیان سادہ ترین نسبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ سوڈیم کلورائیڈ کا فارمولا NaCl ہے اور یہ اس میں موجود سوڈیم آئینز اور کلورائیڈ آئینز کی سادہ ترین نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح کیلشیم کلورائیڈ کا فارمولا CaCl_2 اس میں موجود کیلشیم اور کلورائیڈ آئینز کے درمیان سادہ ترین نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ کسی کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا اُس میں موجود آئینز کی حقیقی تعداد کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اُن میں موجود سادہ ترین نسبت کو ظاہر کرتا ہے اس لیے ایسا ممکن ہے کہ بعض کمپاؤنڈز کے امپیریکل فارمولاز ایک ہی ہوں۔ مثال کے طور پر گلوکوز ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) اور ایسٹک ایسڈ (CH_3COOH) (Acetic Acid) دونوں کا امپیریکل فارمولا CH_2O ہے۔

مثال: 14.10

ایک کمپاؤنڈ کی فی صد اجزاء ترکیبی ظاہر کرتی ہے کہ اُس میں 25.26% میگنیشیم اور 74.74% کلورین ہیں۔ اس کا امپیریکل فارمولا معلوم کریں۔

حل:

کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا معلوم کرنے کے لیے ذیل میں درج اقدامات کریں۔

- اس کمپاؤنڈ کی فی صد اجزاء ترکیبی معلوم کریں۔
- اس کمپاؤنڈ میں موجود ہر ایلیمنٹ کے مولز کی تعداد معلوم کریں۔ اس کے لیے ایلیمنٹ کا ماس یا اس کی فی صد مقدار کو اٹامک ماس سے تقسیم کیا جاتا ہے۔
- کمپاؤنڈ میں موجود ہر ایلیمنٹ کی اٹامک نسبت (Atomic Ratio) معلوم کریں۔ اس نسبت کو معلوم کرنے کے لیے اس کے مولز کی تعداد اُس کمپاؤنڈ میں موجود اُس ایلیمنٹ کے مولز سے تقسیم کرتے ہیں جس کی مقدار سب سے کم ہے۔
- اگر اُس طرح ملنے والی اٹامک نسبت مکمل اعداد میں ہے تو اس سے امپیریکل فارمولا نکالیں ورنہ اس نسبت کو کسی ایسی عدد سے ضرب دیں جس سے یہ مکمل اعداد میں حاصل ہو جائیں۔
- ان مکمل اعداد کو ایلیمنٹس کے سمبلز کے نیچے لکھ کر امپیریکل فارمولا حاصل کریں۔

1۔ ایلیمنٹس کی فی صد مقداروں کو گرامز میں لکھیں۔

فوری جانچ 14.4

ایک کمپاؤنڈ کے 0.5 گرام سمبل میں 0.418 گرام آنتی منی (Antimony) اور 0.082 گرام آکسیجن موجود ہے۔ اس کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا معلوم کریں۔

$$\text{میگنیشیم} \quad 25.26 \text{ g} = 25.26\% \quad \text{کلورین} \quad 74.74 \text{ g} = 74.74\%$$

2۔ ہر ایلیمنٹ کے مولز کی تعداد

$$\text{میگنیشیم} \quad 1.05 \text{ mol} = \frac{25.26}{24} \quad \text{کلورین} \quad 2.10 \text{ mol} = \frac{74.74}{35.5}$$

3۔ ہر ایلیمنٹ کی اٹامک نسبت

$$\text{میگنیشیم} \quad 1 = \frac{1.05}{1.05} \quad \text{کلورین} \quad 2 = \frac{2.10}{1.05}$$

میگنیشیم کلورائیڈ کا امپیریکل فارمولا MgCl_2 ہے۔





مثال: 14.11

ایک آرگنک کمپاؤنڈ کی ماس کے لحاظ سے اجزائے ترکیبی یہ ہے کہ اس میں 64.8% کاربن 13.62% ہائیڈروجن اور 21.58% آکسیجن موجود ہیں اس کا امپیریکل فارمولا معلوم کریں۔

حل:

1- فی صد مقداروں کو گرامز میں تبدیل کریں

$$\begin{array}{lll} \text{O} = 21.58 \% & \text{H} = 13.62 \% & \text{C} = 64.8 \% \\ = 21.58 \text{ g} & = 13.62 \text{ g} & = 64.8 \text{ g} \end{array}$$

2- ہر ایک اٹمیٹ کے مولز کی تعداد نکالیں۔

$$\text{O} = \frac{21.58}{16} = 1.35 \quad \text{H} = \frac{13.62}{1} = 13.62 \quad \text{C} = \frac{64.8}{12} = 5.4$$

3- ہر ایک اٹمیٹ کی ایٹمی نسبت نکالیں۔

$$\text{O} = \frac{1.35}{1.35} = 1 \quad \text{H} = \frac{13.62}{1.35} = 10 \quad \text{C} = \frac{5.4}{1.35} = 4$$

اس کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ ہے۔

مالیکیولر فارمولا

کسی اٹمیٹ یا کسی کمپاؤنڈ کا مالیکیولر فارمولا اس میں موجود ایٹمز کی صحیح تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ پانی، ہائیڈروجن پراکسائیڈ، اتھیلین (Ethylene) اور سلفر کے مالیکیولر فارمولا، بالترتیب H_2O ، H_2O_2 ، C_2H_4 اور S_8 ہیں۔ کسی کمپاؤنڈ کا مالیکیولر فارمولا نکالنے کے لیے اس کے امپیریکل فارمولا کو کسی مثبت عدد سے ضرب دی جاتی ہے جیسا کہ ذیل میں درج مساوات میں دکھایا گیا ہے۔

$$\text{مالیکیولر فارمولا} = (\text{امپیریکل فارمولا}) \times n$$

$$\frac{\text{مالیکیولر ماس}}{\text{امپیریکل فارمولا ماس}} = n \quad \text{یہاں پر}$$

مثال: 14.12

بنیزین (Benzene) کا امپیریکل فارمولا CH ہے جبکہ اس کا مالیکیولر ماس 78 g/mol ہے۔ اس کا مالیکیولر فارمولا نکالیں۔

حل:

درجہ مطلوبات

سٹائیچیومیٹری کو مریضوں کے وزن، عمر اور کئی دوسرے عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے دوائی کی مقدار کے تعین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

$\text{CH} =$ بنیزین کا امپیریکل فارمولا

$$13 = 12 + 1 = \text{بنیزین کا امپیریکل فارمولا ماس}$$

$$78 = \text{بنیزین کا مالیکیولر ماس}$$

$$\frac{78}{13} = n$$

اس طرح بنیزین کا مالیکیولر فارمولا $6 \times (\text{امپیریکل فارمولا}) =$

$$\text{C}_6\text{H}_6 = 6 \times \text{CH} =$$

پس بنیزین کا مالیکیولر فارمولا (C_6H_6) ہے۔





مثال: 14.13

گلوکوز کا امپیریکل فارمولا CH_2O ہے جبکہ اس کا مالیکیولر ماس 180 گرام پر مول ہے۔ اس کا مالیکیولر فارمولا کیا ہوگا؟

حل:

فوری جانچ 14.5

ایک نامعلوم ہائڈروکاربن میں 85.71% کاربن ہے اور اس کا مولر ماس 84 g/mol ہے۔ اس کا مالیکیولر فارمولا کیا ہوگا؟

$$\begin{aligned} \text{CH}_2\text{O} &= \text{گلوکوز کا امپیریکل فارمولا} \\ 30 &= 12 + 2 + 16 = \text{گلوکوز کا امپیریکل فارمولا ماس} \\ 180 &= \text{گلوکوز کا مالیکیولر ماس} \\ 6 &= \frac{180}{30} = n \\ \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 &= (\text{CH}_2\text{O})_6 \text{ جس گلوکوز کا مالیکیولر فارمولا} \end{aligned}$$


کیمیائی مساوات کی مدد سے مقدار میں معلوم کرنا (Calculations Based on Chemical Equations)

ایک مکمل اور متوازن کیمیائی مساوات سے ہمیں ری ایکٹنٹس (Reactants) اور پروڈکٹس (Products) کے درمیان مول کی نسبت یا ماس کی نسبت معلوم ہوتی ہے۔ اس نسبت کی مدد سے ہم پروڈکٹس کے ماسز نکال سکتے ہیں اگر ہمیں ری ایکٹنٹس کے ماسز کا علم ہو یا پھر ری ایکٹنٹس کے ماسز نکال سکتے ہیں اگر ہمیں پروڈکٹس کے ماسز کا علم ہو۔

مثال کے طور پر ذیل میں درج مساوات ہمیں بتاتی ہیں کہ کیشیم کاربونیٹ کا ایک مول (100g) ہائڈروکلورک ایسڈ کے دو مولز (73g) سے ری ایکشن کر کے کیشیم کلورائیڈ کا ایک مول (111g)، پانی کا ایک مول (18g) اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ایک مول (44g) بناتا ہے۔

فوری جانچ 14.6

کیمیائی مساوات کی مدد سے مقدار میں معلوم کرنے سے پہلے یہ بات کیوں ضروری ہے کہ یہ مساوات متوازن ہو۔



مثال: 14.14

25 گرام لائم سٹون (CaCO_3) (Lime Stone) ہائڈروکلورک ایسڈ کی زیادہ مقدار سے اوپر دی گئی کیمیائی مساوات کے مطابق ری ایکشن کرتا ہے۔ اس ری ایکشن میں کیشیم کلورائیڈ کتنا بنے گا؟

حل:

مساوات کے مطابق

$$\begin{aligned} 100 \text{ گرام لائم سٹون ری ایکشن کر کے کیشیم کلورائیڈ جتنا بناتا ہے} &= 111 \text{ g} \\ \frac{111}{100} \text{ g} &= \text{ایک گرام لائم سٹون ری ایکشن کر کے کیشیم کلورائیڈ کتنا بنائے گا} \\ 25 \text{ گرام لائم سٹون ری ایکشن کر کے کیشیم کلورائیڈ کتنا بنائے گا} &= \frac{111}{100} \times 25 = 27.75 \text{ g} \end{aligned}$$





14.5 لمٹنگ ری ایکٹنٹ (Limiting Reactant)

ایک کیمیکل ری ایکشن میں عام طور پر اُس کی متوازن کیمیکل مساوات کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹائیکو میٹرک نسبت کے مطابق ری ایکٹنٹس کو نہیں ملایا جاتا۔ اکثر اوقات تجربات میں ری ایکشن کے دوران ایک یا ایک سے زیادہ ری ایکٹنٹس کو ضرورت سے زیادہ مقدار میں ملایا جاتا ہے۔ ایسا قصداً اس لیے کیا جاتا ہے کہ کسی دوسرے ری ایکٹنٹ کو جو کہ ہوسکتا ہے زیادہ قیمتی ہو مکمل طور پر استعمال کیا جاسکے۔ اس طرح زیادہ مقدار میں استعمال ہونے والا ری ایکٹنٹ، ری ایکشن کے ختم ہونے پر باقی رہ جاتا ہے جبکہ دوسرا ری ایکٹنٹ مکمل طور پر استعمال ہو جاتا ہے۔

اس ری ایکٹنٹ کو جو کہ پوری طرح استعمال ہو جاتا ہے، لمٹنگ ری ایکٹنٹ کہتے ہیں اور کسی ری ایکشن میں پروڈکٹس کی بننے والی مقدار کا تعین بھی یہی ری ایکٹنٹ کرتا ہے۔

لمٹنگ ری ایکٹنٹ کی شناخت کرنے کا طریقہ

- 1- کسی ری ایکشن کے دوران استعمال ہونے والے لمٹنگ ری ایکٹنٹ کو ذیل میں درج اقدامات کی مدد سے شناخت کیا جاتا ہے۔
- 2- ری ایکٹنٹس کی دی گئی مقداروں سے ان کے مولز کی تعداد نکالیں۔
- 3- ری ایکٹنٹس کے مولز کی تعداد کی مدد سے پروڈکٹس کے مولز کی تعداد معلوم کریں۔
- 3- اُس ری ایکٹنٹ کی شناخت کریں جس کی مدد سے پروڈکٹس کی کم از کم مقدار ملے اس ری ایکٹنٹ کو لمٹنگ ری ایکٹنٹ کہیں گے۔

مثال: 14.15

فوٹو سنٹھیسز کے اس ری ایکشن کے دوران جب 25 g گلوکوز، 40 g آکسیجن سے ری ایکشن کر لے گا تو کراموں میں کتنی کاربن ڈائی آکسائیڈ بنے گی؟



حل:

کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بننے والی مقدار کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ دونوں ری ایکٹنٹس میں سے کون سا ری ایکٹنٹ لمٹنگ ری ایکٹنٹ ہے۔

$$1- \text{گلوکوز کے مولز کی تعداد} = \frac{25}{180} = 0.138 \text{ mol}$$

$$\text{آکسیجن کے مولز کی تعداد} = \frac{40}{32} = 1.25 \text{ mol}$$

2- کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار نکالیں جو ری ایکٹنٹس کی ان مقداروں سے بنے گی۔

متوازن کیمیکل مساوات کے مطابق


ایک مول گلوکوز جتنی کاربن ڈائی آکسائیڈ دیتا ہے 6 mol =

$$0.138 \text{ mol گلوکوز جتنی کاربن ڈائی آکسائیڈ دے گا} = \frac{6}{1} \times 0.138 = 0.83 \text{ mol}$$

اسی طرح

قوری جانچ 14.7

اگر آپ 100g کلورین گیس کا ری ایکشن 500g KI سے کرتے ہیں تو اس ری ایکشن میں کون سا ری ایکٹنٹ لمٹنگ ری ایکٹنٹ ہوگا؟





6 mol = 6 مولز آکسیجن کتنی کاربن ڈائی آکسائیڈ دیتے ہیں

$$1.25 \text{ mol} = \frac{6}{6} \times 1.25 = 1.25 \text{ مولز آکسیجن کتنی کاربن ڈائی آکسائیڈ دیں گے}$$

چونکہ گلوکوز کی دی گئی مقدار نے کم کاربن ڈائی آکسائیڈ بنائی اس لیے گلوکوز اس ری ایکشن کا لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ ہوگا اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار جو بنے گی وہ درج ذیل ہوگی۔

$$36.5 \text{ g} = 0.83 \times 44 = \text{کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار}$$

14.6 ری ایکشن کی پیداوار یا ییلڈ (Yield)

کسی کیمیائی ری ایکشن کو کرنے کے نتیجے میں جو پروڈکٹس کی مقدار ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو انچوکل ییلڈ کہتے ہیں۔ یہ مقدار اس مقدار سے ہمیشہ کم ہوگی جو کیمیائی مساوات کی مدد سے نکالی جائے گی اور جس کو نکالنے میں ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ تمام ری ایکٹنٹس آپس میں ری ایکشن کر کے سارے کے سارے پروڈکٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس مقدار کو تھیوریٹیکل ییلڈ (Theoretical Yield) کہتے ہیں۔

ایک کیمیادان کی دلچسپی کا محور عام پرری ایکشن کی کارکردگی ہے جس کو وہ فی صد ییلڈ (Percentage Yield) سے ظاہر کرتا ہے۔ جب کہ یہ فی صد ییلڈ، انچوکل ییلڈ اور تھیوریٹیکل ییلڈ کے موازنہ سے نکالی جاتی ہے۔ فی صد ییلڈ نکالنے کے لیے ذیل میں درج مساوات استعمال کی جاتی ہے۔


$$\frac{\text{انچوکل ییلڈ}}{\text{تھیوریٹیکل ییلڈ}} \times 100 = \text{فی صد ییلڈ}$$

مثال: 14.16

ایک کیمیادان نے 50g گرام زنک (Zn) کا نائٹرک ایسڈ کی زیادہ مقدار سے ری ایکشن کر کے 80.2 گرام زنک نائٹریٹ بنایا۔ اس ری ایکشن کی تھیوریٹیکل ییلڈ اور فی صد ییلڈ معلوم کریں۔

حل:

1- ری ایکشن کی متوازن کیمیائی مساوات



2- زنک کے استعمال ہونے والے مولز کی تعداد

$$0.76 \text{ mol} = \frac{50}{65.37}$$

3- زنک نائٹریٹ کی مقدار

$$80.2 \text{ g} =$$

تھیوریٹیکل ییلڈ

ایک مول زنک کتنا زنک نائٹریٹ بناتا ہے

$$1 \text{ mol} =$$

0.76 مول زنک جتنا زنک نائٹریٹ بنائے گا

$$0.76 \text{ mol} =$$

0.76 مول زنک نائٹریٹ کی مقدار

$$143.92 \text{ g} = 0.76 \times 189.38 =$$





فی صد پیلڈ


$$\frac{\text{ایکچوئل پیلڈ}}{\text{تھیوریٹیکل پیلڈ}} \times 100 = \text{فی صد پیلڈ}$$

$$\frac{80.2}{143.92} \times 100 = \text{فی صد پیلڈ}$$

$$55.7\% = \text{فی صد پیلڈ}$$

فوری جانچ 14.8 40 g گرام پوٹاشیم کلوریٹ (KClO_3) کو گرم کرنے سے 14.9 g آکسیجن گیس بنتی ہے۔

اس ری ایکشن کی تھیوریٹیکل پیلڈ اور فی صد پیلڈ نکالیں۔ پوٹاشیم کلوریٹ کا مولر ماس 122.5 g/mol ہے۔



فی صد خالص پن (Percentage Purity)

کیمسٹری میں کسی شے کے خالص پن سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ وہ شے کتنا فٹوں سے کس حد تک پاک ہے۔ کس شے کا فی صد خالص پن یہ ظاہر کرتا ہے کہ اُس شے کے ناخالص نمونہ میں وہ شے کتنی موجود ہے۔ کسی شے کا فی صد خالص پن ذیل میں درج مساوات سے نکالا جاتا ہے۔

حل:

$$\frac{\text{خالص شے کا ماس}}{\text{ناخالص شے کا ماس}} \times 100 = \text{فی صد خالص پن}$$

مثال: 14.17

ایک دوائی کے 12.0 g نمونہ میں 11.57 g حقیقی دوائی موجود ہے۔ اس نمونہ کا فی صد خالص پن نکالیں۔

حل:

$$\frac{\text{خالص دوا کا ماس}}{\text{ناخالص نمونہ کا ماس}} \times 100 = \text{فی صد خالص پن}$$

$$\frac{11.57}{12.0} \times 100 = \text{فی صد خالص پن}$$

$$96.4\% = \text{فی صد خالص پن}$$

مشق

A کثیر الانتخابی سوالات:

صحیح جواب پر (✓) کریں۔

(i) RTP پر امونیا گیس کے 15 مولز کا والیوم:

(الف) 224 dm³ (ب) 160 dm³ (ج) 360 dm³ (د) 265 dm³

کیمسٹری 10 باب نمبر 14

NOT FOR SALE-PESRP

21

سٹا گیو پیڑی





- (ii) قدرتی گیس CH_4 کے کچھ مولز سلنڈر میں موجود ہوں گے اگر RTP پر اس کا والیوم 18dm^3 ہو تو:
- (الف) 0.75 mol (ب) 0.67 mol (ج) 0.85 mol (د) 0.56 mol
- (iii) اگر پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ کا 2.0g گرام 100cm^3 پانی میں حل کیا جائے تو اس کا مولر ارتکاز کیا ہوگا:
- (الف) 0.36 mol/dm^3 (ب) 0.53 mol/dm^3 (ج) 0.70 mol/dm^3 (د) 0.45 mol/dm^3
- (iv) 0.7g/dm^3 ارتکاز کے ساتھ اس کے سلوشن کے 15dm^3 بنانے کے لیے NaCl کی کتنی مقدار درکار ہوگی؟
- (الف) 21 g (ب) 10.5 g (ج) 31.5 g (د) 5.4 g
- (v) اگر کسی کمپاؤنڈ کا مولر ماس 178 g/mol ہے اور اس کا امپیریکل فارمولا $\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3$ ہے۔ اس کا مالیکیولر فارمولا کیا ہوگا؟
- (الف) $\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3$ (ب) $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_6$ (ج) $\text{C}_9\text{H}_{15}\text{O}_9$ (د) $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_8$
- (vi) جب قدرتی گیس ہوا میں جلتی ہے تو کون ساری ایکٹنٹ لمٹنگ ری ایکٹنٹ ہوتا ہے؟
- (الف) دونوں ری ایکٹنٹس (ب) کوئی ری ایکٹنٹ لمٹنگ ری ایکٹنٹ نہیں ہوتا۔ (ج) ہوا (د) قدرتی گیس
- (vii) اگر کسی کمپاؤنڈ کی انکچوئل سیلڈ 0.198g ہے جب کہ تھیورٹیکل سیلڈ 0.217g ہے۔ اس کی پرسنٹ اتھنٹیکٹیو کیا ہوگی؟
- (الف) 50% (ب) 91.2% (ج) 80% (د) 90%

B مختصر جوابی سوالات:

- 14.1 کسی گیس کا آر۔ٹی۔ پی پر مولر والیوم کیا ہوگا؟
- 14.2 مولر والیوم کا تصور ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند ہے؟
- 14.3 مولر والیوم کا ایووگڈرو زلا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
- 14.4 کیوں دو مختلف کمپاؤنڈز کا ہی امپیریکل فارمولا ایک ہی ہو سکتا ہے؟
- 14.5 پرسنٹ اتھنٹیکٹیو کیوں اہم ہے؟

C تعمیری فکر پر مبنی سوالات:

- 14.1 ایک کیمیکل ری ایکشن میں لمٹنگ ری ایکٹنٹ کو کس طرح شناخت کیا جاسکتا ہے؟
- 14.2 ایسے کمپاؤنڈ کے خالص پن کو جانچنا کیوں ضروری ہے جو بطور دوائی استعمال ہوتا ہو۔
- 14.3 کیمیاور سیمبل ری ایکشن میں کوئی لمٹنگ ری ایکٹنٹ ہوگا؟
- 14.4 ہم کس طرح جان پائیں گے کہ دیا گیا فارمولا، امپیریکل فارمولا ہے یا نہیں؟





حسابی سوالات:

D

- 14.1 RTP پر 4.0 g CH_4 کے مولز کی تعداد، والیوم اور مائیکسچر کی تعداد معلوم کریں۔
- 14.2 150 cm^3 سلوشن میں NaCl کی حل شدہ مقدار معلوم کریں اگر سلوشن کا ارتکاز 0.4 mol/dm^3 ہو۔
- 14.3 NaHCO_3 میں سوڈیم کی پرسنٹ اٹیج معلوم کریں۔
- 14.4 آئرن کے سلفائیڈ میں 1.926 g سلفر اور 2.333 g آئرن موجود ہے۔ کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا معلوم کریں۔
- 14.5 ایک کمپاؤنڈ میں بلحاظ ماس 40.0% کاربن، 6.71% ہائیڈروجن جبکہ 53.3% آکسیجن موجود ہے۔ 0.320 mol کمپاؤنڈ کا وزن 28.8 گرام ہے۔ اس کمپاؤنڈ کا مائیکسچر فارمولا کیا ہوگا؟
- 14.6 میٹل کے ایک سیمل کا ماس 3.66 kg ہے جب کہ اس میں سونے کی مقدار 2.45 kg ہے۔ اس نمونے میں سونے کی پرسنٹ اٹیج پورٹی معلوم کریں۔

WebVersion of PECTAA Textbook
Not for Sale



الیکٹروکیمسٹری

Electrochemistry

حاصلاتِ تعلیم:

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ:

- آکسیجن، ہائیڈروجن، الیکٹران اور آکسیڈیشن نمبرز میں تبدیلیوں کے لحاظ سے ایک وقت آکسیڈیشن اور ریڈکشن یا ریڈکس ری ایکشنز کی تعریف کریں۔
- رومن ہندسوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی کمپاؤنڈ میں موجود ایلیمینٹس کے آکسیڈیشن نمبرز معلوم کریں۔
- ریڈکس ری ایکشن میں آکسیڈائزنگ اور ریڈیوسنگ ایجنٹس کی شناخت کریں۔
- اس بات کو جانیں کہ آزاد حالت میں کسی بھی عنصر کا آکسیڈیشن نمبرز صفر ہوتا ہے۔
- آکسیڈیشن نمبرز اور آکسیڈیشن چارج کے درمیان کسی بھی آکسیڈائزنگ یا ریڈیوسنگ ایجنٹ کا فارمولہ معلوم کرنا۔
- اس بات کو جانیں کہ مولو ایٹمی آکسیڈیشن نمبرز اور آئن پر چارج ایک جیسے ہوتے ہیں۔
- وضاحت کریں کہ نیوٹرل کمپاؤنڈ میں آکسیڈیشن نمبرز کا مجموعہ صفر ہوتا ہے۔
- اس بات کی وضاحت کریں کہ کسی بھی آئن میں آکسیڈیشن نمبرز کا مجموعہ اس آئن پر چارج کے برابر ہوتا ہے۔
- پچھلے ہوئے آکسیڈائزنگ یا اس کے الیکٹروسلوٹن میں سے برقی رو گزرنے سے اس کی تحلیل کے عمل کے ذریعے الیکٹرولیسز کی تعریف کریں۔
- سادہ الیکٹرولیٹک سیل میں اینوڈ، کیتھوڈ، الیکٹرو لائٹ اور بیرونی سرکٹ میں الیکٹرانوں کے بہاؤ کی سمت کی وضاحت کریں اور لیٹل بھی کریں۔
- بیرونی سرکٹ میں چارج کی منتقلی، الیکٹرو لائٹ میں آئنوں کی حرکت اور الیکٹروڈز پر الیکٹرانوں کی منتقلی کی وضاحت کریں۔
- پچھلے ہوئے لیڈ (II) کلورائیڈ کی الیکٹرولیسز کے دوران الیکٹروڈز پر بننے والی اشیا کی شناخت کریں اور انرٹ الیکٹروڈز (پلائٹیم یا کاربن/گرافائیٹ) کا استعمال کرتے ہوئے، مرکوز سلفیورک ایسڈ کی الیکٹرولیسز کے دوران کیے گئے مشاہدات بیان کریں۔
- کورڈن کی تعریف کریں اور اس سے بچاؤ کے طریقوں پر بحث کریں۔ (چند مثالیں ہیں، دیکھاؤں طریقہ جیسے کہ پینٹ، گیلوینائزنگ، الیکٹروپلائٹنگ، دھاتی تحفظ جیسے بحری جہاز میں میگنیشیم بلاکس کا استعمال)۔
- الیکٹروڈز پر بننے والی اشیا کی شناخت کریں۔ انرٹ الیکٹروڈز یا کاربن پر الیکٹروڈز کا استعمال کرتے ہوئے ڈائلکیٹ کا پر (II) سلفیٹ کی الیکٹرولیسز کے دوران کیے گئے مشاہدات بیان کریں۔
- مرکوز ڈائلکیٹ سلوٹن میں ہیلوائڈ کمپاؤنڈز کے الیکٹرولیسز سے الیکٹروڈز پر بننے والی اشیا کی شناخت کریں۔
- الیکٹروپلائٹنگ اور اس کے استعمال کی وضاحت کریں۔

15.1 کمپاؤنڈز اور آئنز میں موجود ایٹمز کے آکسیڈیشن نمبرز

Oxidation Numbers of Atoms in Compounds and Ions

کسی ری ایکشن میں حصہ لینے والے کمپاؤنڈز اور آئنز میں موجود ایٹمز کو آکسیڈیشن نمبرز تفویض کرنے سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس ری ایکشن میں آکسیڈیشن اور ریڈکشن کے عمل ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اس مشق سے ہمیں یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ کون ساری ایکٹس آکسائیڈائزنگ (Oxidising Agent) ہے اور کون ساری ریڈیوسنگ ایجنٹ (Reducing Agent)۔ آکسیڈیشن نمبرز کی مدد سے



ہم کیمیائی کمپاؤنڈز کے فارمولہ اور ان کے نام بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس مشق سے آکسائیڈیشن، ریڈکشن ری ایکشن کے دوران ہونے والی الیکٹرونز کی تقسیم کا پتہ بھی چل جاتا ہے۔

کسی ایٹم یا آئن کا آکسائیڈیشن نمبر دراصل اس پر موجود ہونے والے ظاہری چارج (Apparent Charge) کو کہتے ہیں۔ یہ چارج مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔

کسی ایٹم کا آکسائیڈیشن نمبر معلوم کرنے کے لیے ذیل میں درج قوانین سے مدد لی جاتی ہے۔

1- کسی خالص ایلیمنٹ کے ایٹم کا آکسائیڈیشن نمبر زیرو ہوتا ہے۔ مثلاً سوڈیم میٹل میں موجود سوڈیم ایٹم کا آکسائیڈیشن نمبر زیرو ہوگا۔ اسی طرح اوزون (O_3) کے مالیکیول میں موجود آکسیجن ایٹم کا آکسائیڈیشن نمبر بھی زیرو ہوگا۔

2- ایسے آئنز جن میں صرف ایک ایٹم ہوتا ہے ان کا آکسائیڈیشن نمبر ان پر موجود چارج کے برابر ہوگا۔ مثلاً Ca^{2+} کا آکسائیڈیشن نمبر +2 جبکہ Al^{3+} کا آکسائیڈیشن نمبر +3 ہوگا۔

3- پیریڈک ٹیبل (Periodic Table) کے پہلے گروپ میں موجود ایلیمنٹس (ماسوائے ہائیڈروجن) کے آکسائیڈیشن نمبر +1 ہوں گے۔ اس طرح دوسرے گروپ کے ایلیمنٹس کے آکسائیڈیشن +2 اور تیسرے گروپ کے +3 ہوں گے۔

4- ایسے کمپاؤنڈز جن میں دو ایٹمز موجود ہوں گے ان میں سے زیادہ الیکٹرونکیٹیوٹی (Electronegativity) رکھنے والے ایٹم کو منفی آکسائیڈیشن نمبر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فلورین جس کی الیکٹرونکیٹیوٹی سب سے زیادہ ہے، کو ہمیشہ -1 آکسائیڈیشن نمبر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح امونیا (NH_3) اور ہائیڈروجن سلفائیڈ (H_2S) میں بالترتیب ہائیڈروجن کو -3 اور سلفر کو -2 آکسائیڈیشن نمبر دیا جاتا ہے۔

5- گروپ 17 کے ایلیمنٹس کو عام طور پر -1 آکسائیڈیشن نمبر دیا گیا ہے جب وہ اپنے سے کم الیکٹرونکیٹیوٹی (Electronegative) ایٹم سے جڑے ہوں۔ مثال کے طور پر کلورین کا آکسائیڈیشن نمبر HCl ، PCl_3 ، $CHCl_3$ سب میں -1 ہے۔

6- ہائیڈروجن جب اپنے سے زیادہ الیکٹرونکیٹیوٹی ایٹم کے ساتھ جڑی ہو تو اس کو ہمیشہ +1 آکسائیڈیشن نمبر دیا جاتا ہے اور جب اپنے سے کم الیکٹرونکیٹیوٹی ایٹم کے ساتھ

آکسائیڈیشن نمبر کو آکسائیڈیشن سٹیٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ پانی میں ہائیڈروجن کا آکسائیڈیشن نمبر +1 ہے اور ہم کہتے ہیں کہ پانی میں ہائیڈروجن +1 آکسائیڈیشن سٹیٹ میں موجود ہے۔

جڑی ہو تو -1 آکسائیڈیشن نمبر دیتے ہیں مثال کے طور پر HCl میں ہائیڈروجن کا آکسائیڈیشن نمبر +1 جبکہ NaH میں یہ -1 ہے۔

7- آکسیجن ایٹم کو اس کے زیادہ تر کمپاؤنڈز میں آکسائیڈیشن نمبر -2 دیا جاتا ہے۔

8- ایک نیوٹرل کمپاؤنڈ میں موجود تمام ایٹمز کے آکسائیڈیشن نمبرز کو جمع کریں تو ہمیشہ زیرو

آتا ہے۔ ایسے آئنز جن میں ایک سے زیادہ ایٹمز موجود ہوں ان کا آکسائیڈیشن نمبر ان آئنز میں موجود ایٹمز کے آکسائیڈیشن نمبرز کو جمع کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔





مثال: 15.2

$KMnO_4$ میں موجود Mn کا آکسیدیشن نمبر نکالیں۔

حل:

$$\begin{aligned} K + Mn + 4O &= 0 \\ (+1) + Mn + 4(-2) &= 0 \\ Mn - 7 &= 0 \\ Mn &= +7 \end{aligned}$$

مثال: 15.1

SO_4^{2-} میں سلفر کا آکسیدیشن نمبر کیا ہوگا؟

حل:

$$\begin{aligned} S + 4O &= -2 \\ S + 4(-2) &= -2 \\ S - 8 &= -2 \\ S &= 8 - 2 \\ S &= +6 \end{aligned}$$


مثال: 15.3 Fe_2O_3 میں Fe کا آکسیدیشن نمبر معلوم کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} 2Fe + 3O &= 0 \\ 2Fe + 3(-2) &= 0 \\ 2Fe &= +6 \\ Fe &= +3 \end{aligned}$$

قوری جانچ 15.1

ذیل میں درج کیاؤنڈز میں سے نشان زدہ ایئمز کے آکسیدیشن نمبر نکالیں۔




15.2 آکسیدیشن نمبر کی مدد سے آئنک کمپاؤنڈز کا کییمیائی فارمولا لکھنا

Writing Chemical Formulae of Ionic Compounds by Applying Oxidation Numbers

ہم آئنک کمپاؤنڈز میں موجود ایئمز کے آکسیدیشن نمبر کی مدد سے اس کا فارمولا لکھ سکتے ہیں۔ پیریاڈک ٹیبل اور ایئمز کے الیکٹرانک سٹرکچرز اس مقصد کے لیے ہماری معاونت کرتے ہیں اور ہمیں ایئمز کے اہم آکسیدیشن نمبرز ڈھونڈنے کے بارے میں مطلع کرتے ہیں۔ ان آکسیدیشن نمبر کی مدد سے پھر ہم کمپاؤنڈز کا فارمولا لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کیلشیم کلورائیڈ کا فارمولا درج ذیل طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں۔

کیلشیم پیریاڈک ٹیبل کے گروپ 2 میں موجود ہے اس کا اہم آکسیدیشن نمبر +2 ہے۔ کلورین گروپ 17 میں موجود ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جب اپنے سے کم الیکٹرونیکٹو ایٹم کے ساتھ جڑے گی تو بائنری (Binary) کمپاؤنڈ میں اس کا آکسیدیشن نمبر -1 ہوگا۔ اس طرح کیلشیم کلورائیڈ کا فارمولا پھر $CaCl_2$ ہوگا۔ کیونکہ صرف اسی فارمولا کی بدولت جب ہم اس میں موجود ایئمز کے آکسیدیشن نمبرز کو جمع کریں گے تو جواب زیر دئے گا۔






مثال: 15.4

ایلمینیم آکسائیڈ میں موجود عناصر کے آکسیڈیشن نمبرز کی مدد سے اس کا فارمولا لکھیں۔

حل:


چونکہ ایلمینیم گروپ 13 میں موجود ہے اس لیے اس کا اہم آکسیڈیشن نمبر 3 ہوگا۔ آکسیجن چونکہ زیادہ الیکٹرو نیگیٹو ایٹم ہے اس لیے نارمل آکسائیڈ (Normal Oxide) میں اس کا آکسیڈیشن نمبر 2- ہوتا ہے۔ چونکہ دونوں ایلیمینٹس کے آکسیڈیشن نمبر کا مجموعہ صفر ہونا ضروری ہے لہذا ایلمینیم آکسائیڈ کا فارمولا پھر Al_2O_3 ہوگا۔




15.3 آئینک چارجز کی مدد سے آئینک کمپاؤنڈز کا فارمولا لکھنا

Writing Formulae of Ionic Compounds Using Ionic Charges

پوٹاشیم پرمنیگنیٹ کا فارمولا لکھنے کے لیے پہلے مینیکلیٹ آئن (MnO_4^{1-}) اور پوٹاشیم آئن (K^{1+}) لکھیں اور پھر دونوں آئنز کو ملا کر ایک الیکٹریکی نیوٹرل کمپاؤنڈ بنالیں۔




جب آپ کسی ایسے آئینک کمپاؤنڈ کا فارمولا لکھیں جس میں ایک سے زیادہ ایسے آئنز موجود ہیں جن میں ایٹمی تعداد زیادہ ہے تو پھر ہم اس آئن کو بریکٹ میں لکھ کر نیچے ان کی تعداد لکھ دیتے ہیں۔ امونیم کاربونیٹ کا فارمولا اس طرح لکھا جائے گا۔



مثال: 15.5

ایلمینیم سلفائیٹ کا فارمولا لکھیں۔

حل:





نمیل 15.1 میں مختلف پولی ایٹامک آئنز (Polyatomic Ions) دیئے گئے ہیں۔

نمیل 15.1 عام پولی ایٹامک آئنز

CH ₃ CO ₂ ⁻ ایسیٹٹ	Cr ₂ O ₇ ²⁻ ڈائی کرومیٹ	NO ₂ ⁻ نائٹرائٹ
NH ₄ ⁺ امونیم	HCO ₃ ⁻ بائی کاربونیٹ	C ₂ O ₄ ²⁻ آگزالیٹ
CO ₃ ²⁻ کاربونیٹ	HSO ₄ ⁻ بائی سلفیٹ	ClO ₄ ⁻ پرکلوریٹ
ClO ₃ ⁻ کلوریٹ	HSO ₃ ⁻ بائی سلفائیٹ	MnO ₄ ⁻ پرمینگنیٹ
ClO ₂ ⁻ کلورائٹ	OH ⁻ ہائیڈروآکسائیڈ	PO ₄ ³⁻ فاسفیٹ
CrO ₄ ²⁻ کرومیٹ	ClO ⁻ ہائپوکلورائٹ	SO ₄ ²⁻ سلفیٹ
CN ⁻ سائنائڈ	NO ₃ ⁻ نائٹریٹ	SO ₃ ²⁻ سلفائیٹ



- 1- ذیل میں درج آئنک کمپاؤنڈز کے فارمولاز ان میں موجود ایٹمز کے آکسیڈیشن نمبرز کی مدد سے لکھیں۔
ایلمینٹل نائٹرائڈ، سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ۔
- 2- ذیل میں درج آئنک کمپاؤنڈز کے فارمولاز ان میں موجود آئنز کے چارجز کی مدد سے لکھیں۔
امونیم ایسیٹٹ، پوٹاشیم کرومیٹ

15.4 آکسیڈیشن اور ریڈکشن (Oxidation and Reduction)

آکسیڈیشن اور ریڈکشن ایک دوسرے کے برعکس ہیں اور بیک وقت وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ آکسیڈیشن اور ریڈکشن کی تین مختلف طریقوں سے وضاحت کی گئی ہے۔

(A) آکسیڈیشن (Oxidation)

- (1) آکسیڈیشن ایک ایساری ایکشن ہے جس میں یا تو آکسیجن داخل ہوتی ہے یا پھر ہائیڈروجن باہر نکل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر
- (i) آکسیجن دوسرے ایلیمنٹس سے مل کر آکسائیڈز بناتی ہے۔ ان ری ایکشنز میں ایلیمنٹس آکسائیڈز (Oxidize) ہوتے ہیں اور آکسیجن ریڈیوس (Reduce) ہوتی ہے۔ لوہے کو زنگ لگانا اور میگنیشیم کا ہوا میں جلنا ان آکسیڈیشن ری ایکشنز کی مثالیں ہیں۔




اوپر دیئے گئے ری ایکشنز میں آئرن اور میگنیشیم آکسیڈائز ہو رہے ہیں جبکہ آکسیجن ریڈیوس ہو رہی ہے۔ اس طرح آکسیجن آکسائیڈزنگ (Oxidizing) ایجنٹ ہے اور آئرن اور میگنیشیم ریڈیوسنگ (Reducing) ایجنٹس۔






(ii) ذیل میں درج مثالوں میں آکسیجن (یا اس کا کوئی کپاؤنڈ) ہائڈروجن کو متعین (CH₄) اور ہائڈروکلورک ایسڈ (HCl) سے باہر نکال رہے ہیں۔



ان ری ایکشنز میں متعین اور ہائڈروکلورک ایسڈ کسی ڈائنٹر ہو رہے ہیں جبکہ آکسیجن اور مینگنائز ڈائی آکسائیڈ (MnO₂) ریڈیوس ہو رہے ہیں۔ CH₄ اور HCl کو ریڈیوسنگ ایجنٹس اور O₂ اور MnO₂ آکسی ڈائنٹرنگ ایجنٹس کہتے ہیں۔

(2) آکسڈیشن ایک ایساری ایکشن ہے جس میں الیکٹران یا الیکٹرانز کھو دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاربن میں موجود ایک یا دو الیکٹرانز جب کھو دیے جاتے ہیں تو بالترتیب Cu¹⁺ یا Cu²⁺ بنتے ہیں۔ ان دونوں ری ایکشنز میں کاربن آکسڈائنٹر ہو رہا ہے۔ اس لیے کاربن کو ریڈیوسنگ ایجنٹ بھی کہیں گے۔




(3) آکسڈیشن ایک ایساری ایکشن ہے جس میں الیکٹرانز کا آکسڈیشن نمبر بڑھ جاتا ہے۔ اوپر دیے گئے دونوں ری ایکشنز میں کاربن کا آکسڈیشن نمبر زیرو سے بالترتیب 1 یا 2 (Cu(I) یا Cu(II)) ہو رہا ہے۔

(B) ریڈکشن (Reduction)

(1) ریڈکشن کے دروان یا تو ہائڈروجن داخل ہوتی ہے یا پھر آکسیجن باہر نکل جاتی ہے۔

(i) مثال کے طور پر ہائڈروجن جب کلورین کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہے تو ہائڈروجن کلورائیڈ بنی ہے۔



(ii) ذیل میں دیے گئے ری ایکشن میں ہائڈروجن کو جب مٹیل آکسائیڈ کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے تو آکسیجن کپاؤنڈ میں سے باہر نکل جاتی ہے اور ہائڈروجن کے ساتھ مل کر پانی بنا دیتی ہے۔



اوپر دی گئی مثالوں میں کلورین اور کاربن آکسائیڈ ریڈیوس ہو رہے ہیں اور دونوں مثالوں میں ہائڈروجن آکسڈائنٹر ہو رہی ہے۔ کلورین اور کاربن آکسائیڈ کو آکسی ڈائنٹرنگ ایجنٹس جبکہ دونوں ری ایکشنز میں ہائڈروجن ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے۔

(2) ریڈکشن ایک ایساری ایکشن ہے جس میں الیکٹران یا الیکٹرانز وصول کیے جاتے ہیں۔



اوپر دی گئی دونوں مثالوں میں آئرن اور مینگنیٹیم کے آئزنز ریڈیوس ہو رہے ہیں۔ اس لیے ان کو آکسڈائنٹرنگ ایجنٹس کہتے ہیں۔





(3) ریڈکشن ایک ایساری ایکشن ہے جس میں حصہ لینے والے ایلیمنٹ کا آکسیڈیشن نمبر کم ہو جاتا ہے۔ اوپر دی گئی مثالوں میں آئرن کا آکسیڈیشن نمبر 3 سے $[Fe(III)] + 2$ سے $[Fe(II)]$ ہو گیا ہے جبکہ مینگنا نیز (Manganese) کا آکسیڈیشن نمبر $[Mn(VII)] + 2$ سے $[Mn(II)]$ ہو گیا ہے۔


15.5 الیکٹرولیسز (Electrolysis)

جب پچھلے ہوئے آئیونک کمپاؤنڈز یا ان کے آبی سلوشنز میں سے بجلی گزاری جاتی ہے تو وہ کمپاؤنڈز تحلیل ہو کر اپنے اجزاء میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے کمپاؤنڈز کو الیکٹرولائٹس (Electrolytes) اور اس طریقہ کار کو الیکٹرولیسز (Electrolysis) کہتے ہیں۔ الیکٹرولیسز کے دوران ایک ایساری ایکشن بجلی کی مدد سے وقوع پذیر ہوتا ہے جو خود بخود وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔

الیکٹرولیسز کا عمل ایک ایسے برتن میں کیا جاتا ہے جس کو الیکٹرولیک باٹھ (Electrolytic Bath) یا الیکٹرولیک سیل (Electrolytic Cell) کہتے ہیں اور اس میں سے بجلی گزارنے کے لیے کسی دھات یا گریفائیٹ کے الیکٹروڈز (Electrodes) استعمال کیے جاتے ہیں۔

اینڈ (Anode): یہ مثبت الیکٹروڈ ہے جس کے ذریعہ الیکٹرانز بیرونی سرکٹ میں داخل ہوتے ہیں
کیٹھوڈ (Cathode): یہ منفی الیکٹروڈ ہے جس کے ذریعہ الیکٹرانز بیرونی سرکٹ سے باہر نکلتے ہیں۔

الیکٹرولیک سیل میں موجود الیکٹرولائٹ آزادانہ گھومنے والے آئنز پر مشتمل ہوتا ہے۔ الیکٹرولیسز کے دوران الیکٹرولائٹ بیرونی



دلیج کی موجودگی میں اپنے اجزاء میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ بیرونی دلیج کا منبع (Source) یعنی بیٹری ایک الیکٹروڈ کے ذریعہ الیکٹرانز سیل میں داخل کرتی ہے جس کی وجہ سے خود بخود وقوع پذیر نہ ہونے والا ری ایکشن وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس الیکٹروڈ کو منفی الیکٹروڈ کہتے ہیں۔ الیکٹرولائٹ کے مثبت چارج رکھنے والے آئنز اس منفی الیکٹروڈ کی طرف جاتے ہیں اور یہاں الیکٹرانز یا الیکٹرانز وصول کر کے ریڈیوس ہو جاتے ہیں۔ اس الیکٹروڈ کو کیٹھوڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس عمل کے ساتھ ہی بیٹری دوسرے الیکٹروڈ سے الیکٹرانز یا الیکٹرانز وصول کرتی ہے جس کی وجہ سے اس پر مثبت چارج آ جاتا ہے۔ الیکٹرولائٹ کے منفی آئنز اس الیکٹروڈ کی طرف جا کر اپنے الیکٹرانز کھو کر آکسیڈائز (Oxidized) ہو جائیں گے۔ اس الیکٹروڈ کو اینڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس سارے عمل کے دوران الیکٹرانز بیرونی سرکٹ میں گھومتے ہیں جبکہ سیل کے اندر موجود آئنز اپنے الیکٹروڈ کی طرف جاتے ہیں۔ اگر سیل کے اندر الیکٹروڈ پر آکسیڈیشن اور ریڈکشن کا عمل رک جائے تو الیکٹرانز بھی بیرونی سرکٹ میں گھومنا بند کر دیتے ہیں۔






جارج	فکشن	الیکٹروڈ	بیٹری	جاننے والی باتیں ✓
منفی	آکسیدیشن	اینوڈ		
مثبت	ریڈکشن	کیٹوڈ		
مثبت	آکسیدیشن	اینوڈ	الیکٹرولیک سیل	
منفی	ریڈکشن	کیٹوڈ		

اینوڈ اور کیٹوڈ کے الفاظ ہمیشہ اُن الیکٹروڈز کے لیے استعمال ہوتے ہیں جہاں بالترتیب آکسیدیشن اور ریڈکشن ہوتی ہے۔ تاہم ان الیکٹروڈز پر موجود چار جز بیٹری اور الیکٹرولیک سیل کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔

15.6 انرٹ (Inert) الیکٹروڈز (گریفائٹ یا پلائٹینم) کی مدد سے مرکب سوڈیم کلورائیڈ کے ایکوس سلوشن (برائن) کی الیکٹرولیسز



Electrolysis of a Concentrated Aqueous Solution of Sodium Chloride (Brine) using inert electrodes (Graphite / Pt)




سوڈیم کلورائیڈ کے مرکب سوڈیم کلورائیڈ کے برائن کہتے ہیں، اس کی جب الیکٹرولیسز کی جاتی ہے تو کیٹوڈ پر ہائیڈروجن گیس اور اینوڈ پر کلورین گیس بنتی ہیں جبکہ سلوشن میں سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ بنتا ہے جو کہ اس ری ایکشن کا بائی پروڈکٹ (By-product) ہے۔

اس الیکٹرولیسز میں استعمال ہونے والا الیکٹرولیک سیل شکل (15.2) میں دکھایا گیا ہے جس میں کیٹوڈ پلائٹینم دھات سے بنا ہے جب کہ اینوڈ لازمی طور پر گریفائٹ سے بنا ہونا چاہیے تاکہ یہاں بننے والی کلورین کے ساتھ ری ایکشن سے بچا جاسکے۔

سلوشن میں درج ذیل آئنز موجود ہیں۔



Na^+ اور H_2O اور دونوں کیٹوڈ کی طرف جاتے ہیں۔ چونکہ پانی کے مالکیولز اور ہائیڈروجن آئنز کی ریڈیوس ہونے کی طاقت سوڈیم آئن سے زیادہ ہے اس لیے یہ دونوں کیٹوڈ سے الیکٹرانز حاصل کر کے ہائیڈروجن گیس بنادیں گے۔



کیٹوڈ پر





کیا آپ جانتے ہیں؟

بعض ری ایکشنز قدرتی طور پر خود بخود وقوع پذیر ہوتے ہیں اور ان کے لیے انرجی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کے برعکس بعض ری ایکشنز صرف اُس وقت وقوع پذیر ہوتے ہیں جب ان کو انرجی دی جائے۔

پروٹان (H^+) کے ڈسچارج ہونے کی وجہ سے پانی کا آئونک ایکولبریم

(Ionic Equilibrium) متاثر ہو جاتا ہے۔ جس کی بدولت پانی کے اور زیادہ

مالیکیولز آئیونائز (Ionize) ہو جاتے ہیں تاکہ اس ایکولبریم کی حالت کو دوبارہ حاصل


کیا جاسکے۔ کیتھوڈ کے اگر دسلوشن ہائڈروآکسائیڈ آئنز (OH^-) بننے کی وجہ سے

الکلائن (Alkaline) ہو جاتا ہے۔



اینوڈ پر

دونوں الیکٹروڈز پر بننے والی ہائڈروجن اور کلورین گیسوں کے والیومز برابر ہوتے ہیں اس الیکٹرولیسز کی حتمی مساوات درج ذیل



ہے۔

15.7 میٹل ہیلائیڈز کے ڈائلٹیوٹ اور مرکوز سولوشن کی الیکٹرولیسز

Electrolysis of Dilute and Concentrated Aqueous Solutions of Metal Halides

جب میٹل ہیلائیڈز کے ایکوس سولوشن کی الیکٹرولیسز کی جاتی ہے تو پانی کی موجودگی کی وجہ سے کئی مشکلات آ جاتی ہیں۔ پانی ایک ویک

الیکٹرو لائٹ (Weak Electrolyte) ہونے کی وجہ سے بہت کم آئیونائز ہوتا ہے اور اس طرح بہت کم ہائڈروجن اور ہائڈروآکسائیڈ




بناتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرو لائٹ سولوشن میں کئی قسم کے آئنز کیتھوڈ اور اینوڈ کی طرف رجوع کریں گے اور پھر اپنی صلاحیت کے

مطابق ڈسچارج بھی ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر سوڈیم کلورائیڈ کے ایکوس سولوشن کو الیکٹرو لائٹ کیا جائے تو سولوشن میں دونوں سوڈیم اور

ہائڈروجن کیلکائیڈز (Cations) موجود ہوں گے جو کیتھوڈ کی طرف جائیں گے۔ اس طرح کلورائیڈ اور ہائڈروآکسائیڈ اینائیڈز (Anions)

دونوں اینوڈ کی طرف جائیں گے۔



15.3 میٹل ہیلائیڈز کے ڈائلٹیوٹ سولوشن کی الیکٹرولیسز

اس میں سے کون سے آئنز ترجیحاً ڈسچارج ہوں گے ان کا انحصار

ان میں موجود اینیونز کی اُس طاقت پر منحصر ہے جس کے ذریعے وہ الیکٹرونز

آسانی سے کھودیتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں۔ جو اینیونٹیل (15.2)

میں دکھائی جانے والی الیکٹروکیمیکل سیریز میں اوپر ہیں ان میں الیکٹرانز

کھودینے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے مقابلتاً ان اینیونز کے جو اس سیریز کے نیچے موجود ہیں۔

اگر کوئی میٹل الیکٹروکیمیکل سیریز میں ہائڈروجن سے نیچے موجود ہے تب یہ میٹل پروٹان کی نسبت ترجیحاً الیکٹران قبول کر کے ڈسچارج

ہوگی۔ اس طرح کی میٹلوں میں کا پر اور سلور شامل ہیں۔ اگر کوئی میٹل الیکٹروکیمیکل سیریز میں ہائڈروجن سے اوپر موجود ہے تب اس کی نسبت

ہائڈروجن کیلکائیڈز ترجیحاً الیکٹران قبول کر کے ہائڈروجن گیس بنائیں گے۔ اس طرح کی میٹلوں میں لیٹیم (Lithium) سوڈیم اور پوٹاشیم

شامل ہیں۔ پس جب سوڈیم کلورائیڈ کے ڈائلٹیوٹ سولوشن کی الیکٹرولیسز کی جائے گی تو کیتھوڈ پر ہائڈروجن گیس بنے گی۔






لیڈ (Lead) اور نکل (Nickel) قسم کی میٹلوں سے مشکلات اور بڑھ جاتی ہیں اگر ان میٹلوں کے ہیلانڈز کے ایکٹو سلوشن کی الیکٹرولیسز کی جائے تو کیتھوڈ بننے والے پروڈکٹ کا انحصار ان سلوشن کے ارتکاز پر ہے۔ اگر ان کے سلوشن مرکب ہیں تو کیتھوڈ پر میٹل بنے گی لیکن اگر سلوشن بہت ڈائلوٹ ہیں تو کیتھوڈ پر ہائیڈروجن بنے گی۔ اور اگر سلوشن نہ ڈائلوٹ اور نہ ہی مرکب ہے تو دونوں میٹل اور ہائیڈروجن بنیں گی۔ ان ہیلانڈز کے ڈائلوٹ سلوشن کی جب الیکٹرولیسز کی جائے گی تو اینوڈ پر آکسیجن بنے گی کیونکہ ہائیڈروآکسائیڈ آئن کا ارتکاز زیادہ ہوگا اور وہی ترجیحاً ڈسچارج ہوں گے۔




دلچسپ معلومات

فلورین اور ایلمینیم عناصر کی دریافت اور ان کی صنعتی چیلنے پر چاری میں الیکٹرولیسز نے اہم رول ادا کیا ہے۔



کیتھوڈ پر ہونے والے ری ایکشنز



اینوڈ پر ہونے والے ری ایکشنز

ٹبل 15.2 الیکٹرک میٹل سیریز

مختصر
رینڈم
پیش

الیکٹروڈ	ہاف ری ایکشن	سٹینڈرڈ پوٹینشل (v)
Lithium لیٹیم	$Li^{+}(aq) + e^{-} \rightleftharpoons Li(s)$	-3.04
Potassium پوٹاشیم	$K^{+}(aq) + e^{-} \rightleftharpoons K(s)$	-2.93
Calcium کالسیئم	$Ca^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightleftharpoons Ca(s)$	-2.86
Sodium سوڈیم	$Na^{+}(aq) + e^{-} \rightleftharpoons Na(s)$	-2.71
Magnesium میگنیشیم	$Mg^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightleftharpoons Mg(s)$	-2.37
Aluminum ایلمینیم	$Al^{3+}(aq) + 3e^{-} \rightleftharpoons Al(s)$	-1.66
Water پانی	$2H_2O(l) + 2e^{-} \rightleftharpoons H_2(g) + 2OH^{-}(aq)$	-0.82
Zinc زنک	$Zn^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightleftharpoons Zn(s)$	-0.76
Iron (II) آئرن	$Fe^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightleftharpoons Fe(s)$	-0.44
Cadmium کڈیم	$Cd^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightleftharpoons Cd(s)$	-0.40
Nickel نکل	$Ni^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightleftharpoons Ni(s)$	-0.25
Lead لیڈ	$Pb^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightleftharpoons Pb(s)$	-0.12
Hydrogen ہائیڈروجن	$2H^{+}(aq) + 2e^{-} \rightleftharpoons H_2(g)$	0
Sulfur سلفر	$S(aq) + 2H^{+}(aq) + 2e^{-} \rightleftharpoons H_2S(aq)$	0.14
Tin ٹین	$Sn^{4+}(aq) + 2e^{-} \rightleftharpoons Sn^{2+}(aq)$	0.15
Copper کانپر	$Cu^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightleftharpoons Cu(s)$	0.34
Iodine آئیوڈین	$I_2(g) + 2e^{-} \rightleftharpoons 2I^{-}(aq)$	0.53
Iron (III) آئرن	$Fe^{3+}(aq) + e^{-} \rightleftharpoons Fe^{2+}(aq)$	0.77
Silver سلور	$Ag^{+}(aq) + e^{-} \rightleftharpoons Ag(s)$	0.79
Bromine برومین	$Br_2(g) + 2e^{-} \rightleftharpoons 2Br^{-}(aq)$	1.06
Chlorine کلورین	$Cl_2(g) + 2e^{-} \rightleftharpoons 2Cl^{-}(aq)$	1.35
Gold گولڈ	$Au^{+}(aq) + e^{-} \rightleftharpoons Au(s)$	1.69
Hydrogen peroxide ہائیڈروجن پراکسائیڈ	$H_2O_2(aq) + 2H^{+}(aq) + 2e^{-} \rightleftharpoons 2H_2O(l)$	1.77
Fluorine فلورین	$F_2(g) + 2e^{-} \rightleftharpoons 2F^{-}(aq)$	2.87

کمزور
اکسائیڈ
پیش

مختصر
رینڈم
پیش






15.8 میٹل ہیلوائڈز کے مرکزا یکوس سلوٹن کی الیکٹرولیسز

Electrolysis of Concentrated Aqueous Solutions of Metal Halides


اگر میٹل ہیلوائڈز کے مرکزا یکوس سلوٹن کی الیکٹرولیسز کی جائے تو کیتھوڈ پر ہائیڈروجن آئنز ڈسچارج ہوں گے اگر میٹل الیکٹروکیمیکل



سیریز میں ہائیڈروجن سے اوپر ہوگی۔ مثال کے طور پر سوڈیم کلورائیڈ کے مرکزا یکوس سلوٹن کی الیکٹرولیسز کی جائے تو کیتھوڈ پر ہائیڈروجن گیس بنتی ہے تاہم جب میٹلو الیکٹروکیمیکل سیریز میں ہائیڈروجن سے نیچے ہوں گی تو کم عامل ہونے کی وجہ سے یہ میٹلو کیتھوڈ پر ڈسچارج ہوں گی۔ کاہر اور سلور میٹلو ان کم عامل میٹلو کی مثالیں ہیں۔

فصل 15.4 کا پیکورائڈ کے مرکزا سلوٹن کی الیکٹرولیسز

اینڈرو ہیلوائڈ آئنز ہی ڈسچارج ہوں گے چونکہ ان کا ارتکاز زیادہ ہے۔



کیتھوڈ پر ہونے والے ری ایکشنز




اینوڈ پر ہونے والے ری ایکشنز

15.9 پگھلے ہوئے لیڈ (II) کلورائیڈ کی الیکٹرولیسز

(Electrolysis of Molten Lead (II) Chloride)

لیڈ کلورائیڈ عام درجہ حرارت پر ٹھوس شکل میں ہوتا ہے۔ اس کو الیکٹرولائیٹ میں تبدیل کرنے کے لیے اسے 500°C تک گرم کیا جاتا ہے اس درجہ حرارت پر یہ پگھل جاتا ہے۔ گرم کرنے سے اس میں موجود جکڑے ہوئے آئنز آزاد ہو جاتے ہیں اور اب ان میں سے بجلی گزر سکتی ہے۔ اس پگھلے ہوئے لیڈ کو پھر ایک ایسی کروسیبل (Crucible) میں لے جایا جاتا ہے جس کا ٹمبر پچر 500°C برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس کروسیبل میں گریفامیٹ یا پلاٹینم کے بنے ہوئے دو الیکٹروڈ ڈالے جاتے ہیں۔ الیکٹرولیسز کے دوران لیڈ آئنز کیتھوڈ کی طرف جا کر مائع حالت میں لیڈ میٹل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس دوران کلورائیڈ آئنز اینوڈ کی طرف جاتے ہوئے اپنا الیکٹران اُسے دے کر کلورین گیس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ضروری ہے کہ اس الیکٹرولیسز کو لیڈ کلورائیڈ کے میلٹنگ پوائنٹ سے اوپر سرانجام دیا جائے۔



کیتھوڈ پر ہونے والی ری ایکشن



اینوڈ پر ہونے والی ری ایکشن



کمل ری ایکشن





15.10 سلفیورک ایسڈ کے ڈائیلیوٹ سلوشن کا الیکٹرولیسز انرٹ الیکٹروڈز کی مدد سے (کاربن یا پلاٹینم)


Electrolysis of Dilute Solution of Sulphuric Acid Using Inert Electrodes (Carbon or Pt)

سلفیورک ایسڈ کے ڈائیلیوٹ سلوشن کی جب الیکٹرولیسز کی جاتی ہے تو ہائڈروجن اور آکسیجن گیسیں بنتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس الیکٹرولیسز کے دوران پانی تحلیل ہو جاتا ہے۔ اس الیکٹرولیسز کو انرٹ الیکٹروڈز کے ساتھ سرانجام دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ الیکٹروڈز الیکٹرولائیٹ کے ساتھ ری ایکشن نہیں کرتے۔ ڈائیلیوٹ سلفیورک ایسڈ کے سلوشن میں سلفیٹ آئنز (SO_4^{2-}) اور ہائڈروجن آئنز (H^+) سلفیورک ایسڈ کی وجہ سے موجود ہوتے ہیں جبکہ پانی کی آئنوٹائزیشن سے پروٹانز اور ہائڈروآکسائیڈ آئنز بنتے ہیں۔

کیٹھوڈ پر ہائڈروجن آئنز الیکٹران قبول کر کے ہائڈروجن گیس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اینوڈ پر سلفیٹ آئنز اور ہائڈروآکسائیڈ آئنز دونوں رجوع کرتے ہیں لیکن ہائڈروآکسائیڈ آئنز الیکٹروڈز کھوکھڑے آکسیجن گیس بناتے ہیں۔ سلفیٹ آئنز ہائڈروآکسائیڈ آئنز کی نسبت مشکل سے ڈسچارج ہوتے ہیں کیونکہ اُن کا آکسائیڈ (Oxidize) ہونا مقابلاً مشکل ہے۔ جیسے جیسے الیکٹرولیسز کا عمل آگے بڑھتا ہے۔ سلفیورک ایسڈ مرکب ہوتا جاتا ہے کیونکہ پانی تحلیل ہو کر باہر نکل رہا ہے۔



کیٹھوڈ پر ہونے والی ری ایکشن



اینوڈ پر ہونے والی ری ایکشن

15.11 کاپر سلفیٹ کے ڈائیلیوٹ ایکو س سلوشن کا الیکٹرولیسز انرٹ الیکٹروڈز یا کاپر الیکٹروڈز کی مدد سے

Electrolysis of Dilute Aqueous Solution of Copper Sulphate Using Inert and Copper Electrodes

کاپر سلفیٹ کے ڈائیلیوٹ ایکو س سلوشن کی الیکٹرولیسز اگر انرٹ الیکٹروڈز کی مدد سے کی جائے تو پانی اور کاپر (II) سلفیٹ دونوں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ کاپر میٹل کیٹھوڈ جو کہ ایک انرٹ الیکٹروڈ ہے اُس پر جمع ہو جاتی ہے جبکہ انرٹ اینوڈ پر آکسیجن بنتی ہے۔

15.3 فوری جانچ

سوڈیم کلورائیڈ کے مرکب سلوشن کی الیکٹرولیسز کے دوران کاربن کے الیکٹروڈز استعمال کرنا کیوں ضروری ہے؟



کیٹھوڈ پر ہونے والی ری ایکشن

اینوڈ پر ہونے والی ری ایکشن



چونکہ سلوشن میں موجود کاپر آئنز کا ارتکاز آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اس سے سلوشن کا نیلا رنگ بھی آہستہ آہستہ ہلکا ہوتا جائے گا۔






اگر انرٹ الیکٹروڈ کی جگہ کا پر میٹل کے الیکٹروڈ استعمال کیے جائیں تو کا پر اینوڈ سے کا پر ایمنز (کا پر آکسجن بن کر) سلوشن میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور الیکٹروڈ کا ماس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔



کیٹھوڈ پر ہونے والی ایکشن



اینوڈ پر ہونے والی ایکشن

15.12 کوروشن یا زنگ لگنا (Corrosion)


زنگ لگنا ایک قدرتی عمل ہے جس کی وجہ سے ایک میٹل ماحول کے ساتھ کیمیائی ری ایکشن کی وجہ سے بتدریج ختم ہو جاتی ہے۔ اس ری ایکشن کے نتیجہ میں میٹل کی سطح پر آکسائیڈز، سلفائیڈز یا کاربونیٹس کی تہ جم جاتی ہے۔

زنگ لگنے کی بہت ہی عام مثال لوہے کو زنگ لگنا ہے۔ اس دوران لوہا ہوا میں موجود آکسیجن اور پانی سے ری ایکشن کر کے ہائیڈریٹڈ آئرن آکسائیڈ بناتا ہے۔ ایک بار جب لوہے کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ عمل پھر جاری رہتا ہے۔ کیونکہ زنگ ایک بھر بھری شے ہے جس کی وجہ سے ہوا اور پانی دونوں لوہے کی نیچے والی تہوں تک پہنچ کر انہیں بھی زنگ آلود کر دیتے ہیں۔ اس طرح اگر کافی عرصہ لوہا پڑا رہے تو سارے کا سارا زنگ آلود ہو جائے گا۔


لوہا کو زنگ لگنے کے لیے بظاہر دو کیمیائز درکار ہیں ایک آکسیجن اور دوسرا پانی۔ یہ دونوں لوہے کے ساتھ مل کر ذیل میں درج الیکٹرو کیمیائی ری ایکشن کا موجب بنتے ہیں۔ لوہا اپنے الیکٹروڈز کو Fe(II) آکسائیڈ بناتا ہے۔



اوپر والے ری ایکشن سے ملنے والے الیکٹرانز آکسیجن قبول کر کے پانی کی موجودگی میں ہائیڈروآکسائیڈ آکسائیڈ بنادیتی ہے۔



آئرن (II) پھر مزید آکسیجن اور پانی سے ری ایکشن کر کے آئرن (III) ہائیڈروآکسائیڈ بناتا ہے جسے زنگ کہتے ہیں۔



زنگ لگنے سے بچاؤ (Prevention of Corrosion)

میٹل کی سطح پر کوئی تہ چھانا (Coating of the Metal Surface)

میٹل کو زنگ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سطح کا تعلق ہوا سے ختم کر دیں ایسا کرنے کے لیے میٹل کی سطح پر کسی شے کو مل دیا جائے جو اس کو ہوا میں موجود پانی اور آکسیجن سے بچائے۔ اس مقصد کے لیے میٹل کی سطح پر گریس، تیل ملایا جاتا ہے یا پھر اس سطح پر پینٹ





کر دیا جاتا ہے۔ میٹل کی سطح کو محفوظ کرنے کے لیے دوسرے طریقوں میں گیلوانائزنگ (Galvanizing)، الیکٹروپلیٹنگ (Electroplating) اور سیکرٹیفیکل پروٹیکشن (Sacrificial Protection) شامل ہیں۔

گیلوانائزیشن (Galvanization)

یہ طریقہ آئرن اور سٹیل کو زنک سے بچانے کا ایک عام طریقہ ہے اس طریقے میں آئرن کی شیٹ کو ایک ایسے برتن میں ڈبوایا جاتا ہے جس میں ٹیکمل ہوئی زنک موجود ہو۔ اس طرح زنک میٹل کی ایک تہہ آئرن شیٹ پر جمع جاتی ہے اور اس کو زنک لگنے سے بچاتی ہے۔ عام استعمال ہونے والے ٹن کنیز (Tin Cans) دراصل سٹیل سے بنے ہوتے ہیں جن پر ٹن کی تہہ جمائی جاتی ہے۔

سیکریٹیفیکل پروٹیکشن (Sacrificial protection)

آئرن کو محفوظ کرنے کے لیے اس طریقے میں آئرن سے زیادہ ری ایکٹیو (Reactive) میٹل یعنی زنک یا میگنیشیم کے ٹکڑے آئرن کی سطح پر چکادے جاتے ہیں۔ زیادہ ری ایکٹیو ہونے کی وجہ سے زنک ان ٹکڑوں پر لگتا ہے اور آئرن کی سطح محفوظ رہتی ہے۔ زمین میں دفن فیول ٹینکس (Fuel Tanks)، پائپ لائنز (Pipe Lines) اور جہازوں کے ڈھانچے جو سمندر کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان سب کو بچانے کے لیے میگنیشیم میٹل استعمال کی جاتی ہے۔

میگنیشیم اور آئرن کے درمیان ری ایکٹیوٹی (Reactivity) میں فرق کی وجہ سے ان کے درمیان کرنٹ بہنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے زنک زیادہ ری ایکٹیو میٹل کو لگتا ہے جبکہ آئرن میٹل محفوظ رہتی ہے۔

15.4 فوری جانچ

- 1۔ زنک لگنے کے لیے کوئی شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔
- 2۔ اگر آئرن کے ایک ٹکڑے کو زنک کے ایک ٹکڑے سے ملایا جائے تو کوئی میٹل کو زنک لگے گا۔ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔

15.13 الیکٹروپلیٹنگ (Electroplating)

اس طریقے میں ایک میٹل کو دوسری میٹل پر بجلی کی مدد سے جمایا جاتا ہے۔

الیکٹروپلیٹنگ کرنے کے تین اہم مقاصد ہیں۔

1۔ سجاوٹ

سستی میٹل کو خوبصورت بنانے کے لیے ان پر نوبل میٹل یعنی گولڈ اور سلور کو جمایا جاتا ہے۔

2۔ حفاظت

الیکٹروپلیٹنگ کا دوسرا مقصد میٹل کو زنک اور آرگنک ایسڈز (Organic Acids) سے محفوظ بنانا ہے۔

3۔ مرمت

مشینری کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو جوڑنے کے لیے ان پر کسی دوسرے میٹل کی شہ جمدی جاتی ہے عام طور پر اس مقصد کے لیے کاپر، سلور، کرومیم، نکل اور گولڈ کی الیکٹروپلیٹنگ کی جاتی ہے۔


الیکٹروپلیٹنگ کا طریقہ کار

جس شے پر الیکٹروپلیٹنگ کرنی ہو تو اس کو پہلے ریت سے، پھر کاسٹک سوڈا سے اور آخر میں گھلے پانی میں دھو کر صاف کیا جاتا ہے۔ اس شے کو پھر الیکٹرو لیک سل میں کیتھوڈ بنایا جاتا ہے جبکہ جس میٹل کو اس پر جمانا ہوتا ہے اس کو اینوڈ بناتے ہیں۔ الیکٹرو لائٹ سلوشن جمانے





والی میٹل کے کسی سالٹ کا ایکوس سلوشن ہوتا ہے اور الیکٹروپلیٹنگ کرنے کے لیے سینٹ گلاس یا لکڑی کا بنا ہوا ٹینک استعمال کرتے ہیں جس کو الیکٹرولیٹک ٹینک کہتے ہیں۔ شکل 15.5 میں الیکٹروپلیٹنگ کا عمل دکھایا گیا ہے۔



منتخب شدہ الیکٹروڈ لائٹ کے خواص مندرجہ ذیل ہونے چاہئیں۔

1- یہ پانی میں بہت زیادہ حل پذیر ہو۔

2- اچھا کنڈکٹر ہو۔

3- نہ آسانی سے آکسائیڈ ہو نہ ریڈیوس ہو اور نہ ہی ہائڈرولائز

(Hydrolyze) ہو۔

4- سستا ہو۔

الیکٹرولیٹک ٹینک میں موجود الیکٹروڈ لائٹ میں الیکٹروڈز کو ڈوب دیا جاتا ہے اور پھر کرنٹ گزارا جاتا ہے۔ فوئل میٹل کی ہلکی سی تہہ اُس شے پر جم جاتی ہے جس کی الیکٹروپلیٹنگ کر رہے ہیں۔ اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے ذیل میں درج شرائط پوری کی جاتی ہیں۔

قابل غور بات!

آن ری ایکٹو اور قیمتی میٹلوں کے ایک گروپ کو فوئل میٹلوں کہتے ہیں۔ گولڈ، سلور اور پلانٹیم فوئل میٹلوں کی مثالیں ہیں۔


i- کرنٹ ڈینسٹی (Current Density) زیادہ ہونی چاہیے۔

ii- ٹمبرپرچر کم ہونا چاہیے۔

iii- الیکٹروڈ لائٹ میں میٹل کا ارتکاز زیادہ ہونا چاہیے۔

سلور پلٹنگ (Silver Plating)

سلور پلٹنگ کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ تاہم اس میں استعمال ہونے والا الیکٹروڈ لائٹ پوٹاشیم آر جینو سائنائڈ اور اینوڈ خالص سلور کا استعمال ہوتا ہے الیکٹروڈ لائٹ ایکوس سلوشن میں درج ذیل آکسائیڈ بناتا ہے۔



جب اس سیل میں سے بجلی گزاری جاتی ہے تو سلور آئنز (Ag^+) کیتھوڈ کی طرف جا کر الیکٹروڈز قبول کرتے ہیں اور پھر وہیں کیتھوڈ کے ساتھ جم جاتے ہیں۔ سائنائڈ آئنز اینوڈ کی طرف جا کر وہاں موجود سلور سے ری ایکشن کر کے سلور سائنائڈ ($AgCN$) بنادیتے ہیں جو کہ بعد میں پوٹاشیم سائنائڈ سے مل کر دوبارہ الیکٹروڈ لائٹ $K[Ag(CN)_2]$ بنادیتے ہیں۔

کاپر پلٹنگ (Copper Plating)

کاپر پلٹنگ میں اینوڈ کاپر میٹل کا بنا ہوتا ہے اور استعمال ہونے والا الیکٹروڈ لائٹ کاپر سلفیٹ ہے جس کے ایکوس سلوشن میں تھوڑا سا سلفیورک ایسڈ ملا جاتا ہے تاکہ اس کی ہائڈرولیسز (Hydrolysis) نہ ہو۔ جس شے پر الیکٹروپلیٹنگ کرنی ہے اُسے کیتھوڈ بنایا جاتا ہے۔ الیکٹروپلیٹنگ کے دوران الیکٹروڈز پر درج ذیل ری ایکشنز وقوع پذیر ہوتے ہیں۔



کیتھوڈ پر



اینوڈ پر





دلچسپ معلومات

کرومیم پلٹیک عام طور پر آئرن یا سٹیل پر کی جاتی ہے۔ چونکہ کرومیم ٹیل آئرن ٹیل پر اچھی طرح بڑتی نہیں ہے اس لیے پہلے آئرن کی کا پریڈنگ پلٹیک کی جاتی ہے اور پھر اس پر کرومیم پلٹیک کرتے ہیں۔

فوری جانچ 15.5

- 1- الیکٹروپلٹیک کس اصول پر وقوع پذیر ہوتی ہے؟
- 2- الیکٹروپلٹیک کو کس طرح میٹلوں موجود تھاٹص کی مرمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟

مشق

A کثیر الانتخابی سوالات:

صحیح جواب پر (✓) کریں۔

(i) $KMnO_4$ میں Mn کا آکسیڈیشن نمبر ہے:

- (الف) +7 (ب) +5 (ج) +6 (د) -6

(ii) درج ذیل ری ایکشن میں کون سا ایلیمنٹ ریڈیوس ہو رہا ہے:



- (الف) Br (ب) Mn (ج) H (د) Mn اور H دونوں

(iii) Pt الیکٹروڈ کا استعمال کرتے ہوئے، H_2SO_4 کے مرکب سلوشن کے الیکٹرولیسز کے دوران جو عمل کیٹھوڈ پر وقوع پذیر ہوتا ہے، اُسے کہتے ہیں:

- (الف) ریڈکشن (ب) تابی ریڈکشن اور نہ ہی آکسیڈیشن
(ج) آکسیڈیشن (د) پہلے آکسیڈیشن پھر ریڈکشن

(iv) کا پرا الیکٹروڈ کا استعمال کرتے ہوئے $CuSO_4$ کے ایکوس سلوشن کو الیکٹرو لائز کیا جاتا ہے تو آپ کو اینوڈ پر کون سا پروڈکٹ ملے گا؟

- (الف) Cu (ب) O_2 (ج) H_2 (د) کوئی پروڈکٹ نہیں، اس کے بجائے کا پریٹیل سلوشن میں کا پرائزن کی صورت میں حل ہو جائے گا

(v) جب $NaCl$ کے مرکب سلوشن کو الیکٹرو لائز کیا جاتا ہے تو اینوڈ پر کون سا پروڈکٹ حاصل ہوتا ہے؟

- (الف) Cl_2 (ب) O_2 (ج) زیادہ O_2 کم Cl_2 (د) زیادہ Cl_2 کم O_2

(vi) جب $ZnCl_2$ کے مرکب ایکوس سلوشن کو الیکٹرو لائز کیا جاتا ہے تو کیٹھوڈ پر کون سا پروڈکٹ حاصل ہوتا ہے؟

- (الف) H_2 (ب) Zn (ج) O_2 (د) Zn اور O_2 دونوں





B مختصر جوابی سوالات:

- 15.1 جب NaCl کے ایکوس سلوشن میں سے بجلی گزرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟
- 15.2 الیکٹروپلیٹنگ کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟
- 15.3 کرس الیکٹروڈ کے ذریعے، الیکٹرانز، الیکٹرولیٹک سل کو چھوڑ دیتے ہیں؟
- 15.4 الیکٹرو لائٹ کیسے بجلی کا کنڈکٹر ہے؟
- 15.5 جب Cu کی ایک پٹی کو FeSO_4 کے سلوشن میں ڈبو یا جائے تو کیا ہوگا؟

C تعمیری فکر پر مبنی سوالات:

- 15.1 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ میں کلورین ایٹم کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کریں۔
- 15.2 H_2O_2 آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر کیسے جانا جاتا ہے؟
- 15.3 جب NaCl کے مرکب اور ڈائیلوٹ ایکوس سلوشن کو الیکٹرو لائٹ کیا جاتا ہے تو مختلف پروڈکٹس کیوں حاصل ہوتے ہیں؟
- 15.4 برسات میں کوروڈن کا عمل کیوں تیز ہو جاتا ہے؟

D تفصیلی سوالات:

- 15.1 آکسیڈیشن نمبر کا استعمال کرتے ہوئے آئرن کمپاؤنڈ کا فارمولہ کس طرح معلوم کیا جاسکتا ہے؟ مثال سے واضح کریں۔
- 15.2 درج ذیل کمپاؤنڈز میں سے نشان زدہ ایلیمنٹ کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کریں۔
 $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$, $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$
- 15.3 آئرنک چارجز کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کمپاؤنڈز کا فارمولہ تحریر کریں۔
 سوڈیم ہائیپوکلورائیٹ، کبیشیم آگزالائیٹ، امونیم فاسفیٹ، کبیشیم نائٹریٹ
- 15.4 دھاتی ہیلانائیڈز کے مرکب سلوشن کے الیکٹرولیسس پر بحث کریں۔
- 15.5 مثالوں کے ساتھ الیکٹروپلیٹنگ کی وضاحت کریں۔
- 15.6 کوروڈن کسے کہتے ہیں؟ آئرن کی کوروڈن کے دوران ہونے والے ری ایکشنز کی وضاحت کریں۔



ری ایکشن کائی نیکس Reaction Kinetics

حاصلاتِ تعلیم:

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ:

- کولیون تھیوری کو ذرات کی تعداد فی یونٹ والیوم، ذرات کے درمیان تصادم کی فریکوئنسی، ذرات کی حرکی توانائی اور ایکٹیویشن انرجی کے لحاظ سے بیان کریں۔
- بیان کریں کہ کیٹالسٹ کسی بھی ری ایکشن کی شرح کو بڑھاتا ہے، ایکٹیویشن انرجی کم کرنے کے ساتھ ری ایکشن کے لیے متبادل راستہ فراہم کرتا ہے اور ری ایکشن کے اختتام پر غیر تبدیل شدہ رہتا ہے۔
- ایسے طبعی عوامل کی وضاحت کریں جو ری ایکشن کے ریٹ سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ بشمول ری ایکشن کے دوران ماس میں تبدیلی، درجہ حرارت میں تبدیلی اور گیس کا بننا۔
- کولیون تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے ری ایکشن کے ریٹ پر بدلتے ہوئے ارتکاز، گیسوں کے دباؤ، کسی ٹھوس کی سطح کا رقبہ، درجہ حرارت، کیٹالسٹ کی موجودگی (بشمول انزائم) کے اثرات کی وضاحت کریں۔

ری ایکشن کائی نیکس (Reaction Kinetics)

کسی کیمیکل ری ایکشن کا ریٹ (Rate) دراصل اُس کی وہ رفتار ہے جس سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ کیمیکل ری ایکشنز صرف اُس صورت میں ہی مفید ثابت ہوتے ہیں اگر وہ مناسب رفتار سے چلیں۔ اس باب میں ہم کیمیکل ری ایکشنز جس رفتار سے وقوع پذیر ہوتے ہیں اُس کا مطالعہ کریں گے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیمیکل ری ایکشن کے ریٹ پر کون کون سے عناصر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان باتوں کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماکیمو کس طرح ری ایکشنز کیسے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔

16.1 ری ایکشنز کے ریٹ کے بارے میں کولیون تھیوری

(Collision Theory of Reaction Rate)

ایک کیمیکل ری ایکشن صرف اُس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب اُس میں حصہ لینے والے ذرات (ایٹمز، مالیکیولز یا آئنز) آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ذرات کے درمیان جو کولیون ہوتے ہیں اُن میں بہت ہی کم کولیون پروڈکٹس بننے کے موجب بنتے ہیں۔ ان کولیون کی اکثریت سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا سوائے اس کے ذرات آپس میں ٹکراتے ہیں اور بعد واپس اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ جن کولیون کی وجہ سے ری ایکشن وقوع پذیر ہوتا ہے اُن کو ایفیکٹیو کولیون (Effective Collisions) کہتے ہیں۔



کسی ری ایکشن کے ریٹ کا انحصار ایٹمیٹھو کولیون کی تعداد پر ہے اور ایٹمیٹھو کولیون کا انحصار درج ذیل باتوں پر ہے۔

1- یونٹ والیوم میں پارٹیکلز کی تعداد (The Number of Particles Per Unit Volume)

یونٹ والیوم میں ذرات کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ایٹمیٹھو کولیون کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں ری ایکٹنٹس کا ارتکاز جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ تعداد میں ان میں موجود مالیکیولز آپس میں ٹکرائیں گے۔

2- کولیون کی فریکوئنسی (The Frequency of Collisions)


اگر ایک سیکنڈ میں ہونے والے کولیون زیادہ ہوں گے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان کے درمیان ایٹمیٹھو کولیون بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر ٹمپرچر زیادہ ہوگا تو مالیکیولز کی رفتار بھی زیادہ ہوگی اور ایک سیکنڈ میں ہونے والی کولیون بھی زیادہ ہوں گے۔ اس طرح کولیون کی تعداد بڑھنے سے ایٹمیٹھو کولیون کی تعداد بھی بڑھ جائے گی۔

3- ذرات کی کائیٹھک انرجی (The Kinetic energy of the particles)

ذرات کی کائیٹھک تھیوری کے مطابق تمام قسم کے مادہ میں موجود چھوٹے چھوٹے ذرات مستقل حرکت میں ہیں اور ان کی اس حرکت کا انحصار ان میں موجود کائیٹھک انرجی کی مقدار پر ہے۔ اگر کسی شے کا ٹمپرچر بڑھا یا جائے تو اس میں موجود ذرات کی کائیٹھک انرجی بھی بڑھ جاتی ہے جس کے نتیجے میں یہ ذرات تیزی سے حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حرکت کرنے میں اس تیزی کی وجہ سے ان ذرات کے آپس میں کولیون بھی بڑھ جاتے ہیں۔

4- ایکٹیویشن انرجی (Activation Energy)

کولیون تھیوری کے مطابق ٹکرائنے والے ذرات صرف اسی وقت آپس میں ایٹمیٹھو کولیون کا موجب بنتے ہیں جب ان کے پاس اتنی انرجی موجود ہو جو ری ایکٹنٹس کے مالیکیولز میں پائے جانے والے بانڈز کو توڑ سکے۔ انرجی کی یہ کم از کم مقدار جو کسی ری ایکشن کو شروع کرنے کا باعث بنتی ہے اس کو ایکٹیویشن انرجی کہتے ہیں۔



عام طور پر کسی خاص ٹمپرچر پر ری ایکٹنٹس کے مالیکیولز کے پاس انرجی کی اوسط مقدار ہوتی ہے۔ ان مالیکیولز میں بہت کم مقدار میں موجود مالیکیولز کی انرجی اوسط انرجی سے زیادہ ہوتی ہے۔ مالیکیولز صرف اسی صورت میں ری ایکشن میں حصہ لیتے ہیں جب مالیکیولز کی چھوٹی سی تعداد کی اوسط انرجی میں اتنی زیادتی ہو کہ درکار ایکٹیویشن انرجی سے بڑھ جائے تاکہ وہ ری ایکشن کے وقوع پذیر ہونے کا باعث بن جائیں۔

جب ری ایکٹنٹس کے ذرات کولیون کے لیے ایک دوسرے کے

قریب آتے ہیں تو ان کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے اور ان کی کائیٹھک انرجی، پوٹینشل انرجی میں تبدیل ہو کر اس میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے شکل (16.1) میں ری ایکشن کے راستہ اور اس کی پوٹینشل انرجی کے مابین ایک گراف بنایا گیا ہے۔ جب ری ایکٹنٹس





کے ذرات جن کی انرجی خاصی زیادہ ہو، آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ پوٹینشل انرجی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسی حالت اختیار کر لیتے ہیں جس کو ہائی انرجی سٹیٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ری ایکٹنٹس، پروڈکٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سسٹم کی پوٹینشل انرجی ایک بار پھر کم ہو جاتی ہے۔

16.1 نوری جانچ

- 1- آپ کو لیون فریکوئنسی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟
- 2- ری ایکٹنٹس کے ذرات کے درمیان کو لیون کے بعد کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

ری ایکشنز جس طریقے سے مکمل ہوتے ہیں اُس کو سمجھنے کے لیے ایکٹیویشن انرجی کا علم بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح ری ایکشنز جس طریقے سے پروڈکٹس میں تبدیل ہوتے ہیں اُس راستے کو ری ایکشن میکانیزم (Mechanism) کہتے ہیں۔

16.2 کیمیکل ری ایکشن کے دوران ماس کا تبدیل ہو جانا

(Change in Mass during a Chemical Reaction)

کیمیکل ری ایکشن کے مکمل ہونے سے پہلے اور بعد میں اس میں حصہ لینے والی اشیا کا ماس مستقل رہتا ہے۔ ایسا ہونا قانون بقائے مادہ کے تحت ضروری ہے۔ تاہم بعض ری ایکشنز کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مکمل ہونے پر اُن کے ماس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ایسا اکثر اُن ری ایکٹنٹس میں ہوتا ہے جن میں ری ایکٹنٹس یا پروڈکٹس میں کوئی گیس موجود ہو۔

اگر کسی ری ایکشن کو کھلے برتن میں کیا جائے جہاں گیسیں باہر بھی نکل سکتی ہیں اور اندر بھی داخل ہو سکتی ہیں تو ظاہری طور پر ری ایکشن کے دوران ماس میں تبدیلی آ سکتی ہے اگر اس ری ایکشن کے نتیجے میں گیس جذب ہو رہی ہو یا باہر نکل رہی ہو۔ مثال کے طور پر، اگر ری ایکشن کے دوران گیس باہر نکل رہی ہو تو ہم ماس میں کمی کا مشاہدہ کریں گے اور اس دوران اگر گیس جذب ہو رہی ہو تو ظاہری طور پر ماس بڑھ جائے گا۔

اگر مینگنیٹیم سے بنا ہوا ربین کسی کھلے کرو سیبل (Crucible) میں رکھ کر چلایا جائے تو پروڈکٹ یعنی MgO کا ماس زیادہ ہوگا۔ ماس میں زیادتی کی وجہ یہ ہے کہ مینگنیٹیم نے ہوا میں موجود آکسیجن سے ری ایکشن کر کے یہ حاصل بنایا ہے۔ تاہم اگر ان ری ایکٹنٹس (Mg اور O₂) کو ایک بند برتن میں رکھ کر گرم کیا جائے تو ری ایکٹنٹس کا کل ماس پروڈکٹس کے ماس کے برابر ہوگا۔

کیمیکل ری ایکشن کے دوران گیس کا جتنا

اگر ڈائیکسیڈ آکسائیڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ اور ماربل چپس کے درمیان ایک کھلے برتن میں ری ایکشن کیا جائے تو پروڈکٹس کا ٹوٹل ماس ظاہری طور پر ری ایکٹنٹس سے کم ہوگا۔ ماس میں یہ بظاہر کمی ری ایکشن کے دوران کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کے بننے سے ہوئی ہے جو بنتے ہی ہوا میں شامل ہو جاتی ہے۔



اگر ری ایکشن کو آگے بڑھایا جائے تو ری ایکٹنٹس کے ارتکاز آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے کیونکہ ری ایکشن کے دوران یہ اشیا استعمال ہو رہی ہیں۔ اسی وقت پروڈکٹس کے ارتکاز میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جائے گا حتیٰ کہ ری ایکشن کے مکمل ہونے پر یہ ارتکاز زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گے۔






16.3 ری ایکشن کے دوران ٹمپریچر میں تبدیلی

(Change in Temperature during a Chemical Reaction)

کیمیکل ری ایکشنز کے دوران اکثر اوقات ٹمپریچر میں تبدیلیاں آتی ہیں کیونکہ ری ایکشنز یا ایکسو تھرک (Exothermic) ہوتے ہیں یا اینڈو تھرک (Endothermic)۔ ایکسو تھرک ری ایکشنز میں انرجی باہر نکلتی ہے جس سے ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ یہ نکلنے والی انرجی پھر بیرونی ماحول میں جذب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب اُن بجھا چونا (Quick Lime CaO) پانی سے ری ایکشن کرتا ہے تو بجھا ہوا چونا یا سلیکڈ لائم (Slaked Lime) بنتا ہے اور اس دوران بہت سی انرجی خارج ہوتی ہے۔



اسی طرح اینڈو تھرک ری ایکشنز میں انرجی جذب ہونے کی وجہ سے بیرونی ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب امونیم کلورائیڈ یا امونیم نائٹریٹ کو پانی میں حل کیا جائے تو ہیٹ انرجی جذب ہوتی ہے اور استعمال ہونے والا برتن ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ری ایکشن کا ٹمپریچر بڑھانے سے اس کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے ری ایکشنز کے ریٹس (Rates) ٹمپریچر کے 10°C تک بڑھ جانے سے تقریباً دو گنا ہو جاتے ہیں۔ کھانے پکانے کے لیے ہم اشیاء کو گرم کرتے ہیں تاکہ اس دوران وقوع پذیر ہونے والے ری ایکشنز کی رفتار بڑھ جائے۔ کیمیکل ری ایکشنز سے خوراک میں موجود اجزاء ٹوٹ جاتے ہیں اور خوراک کھانے کے قابل ہو جاتی ہے۔

16.4 ری ایکشن کے ریٹس پر مختلف عوامل کے اثرات

(Factors Affecting the Rates of Reaction)

کولیون تھیوری کے مطابق سارے وہ عوامل جو فی سیکنڈ کامیاب کولیون کی تعداد کو تبدیل کرتے ہیں ری ایکشن کے ریٹ کو بھی تبدیل کریں گے۔ ذیل میں درج پیرا فکس میں چند ایسے عوامل تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں۔

1۔ ری ایکٹنٹس کے ارتکاز کے اثرات

کسی ری ایکشن کے وقوع پذیر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں حصہ لینے والے ری ایکٹنٹس ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ اسی وجہ سے ری ایکشنز اکثر اوقات ایک ہی فیز (Phase) میں کیے جاتے ہیں تاکہ اُن کے درمیان ری ایکشن کو یقینی بنایا جاسکے۔ مثال کے طور پر ری ایکٹنٹس ایک ہی سلوشن میں حل کیے جاتے ہیں یا پھر ان کو گیس حالت میں ملایا جاتا ہے۔

جب ری ایکٹنٹس ایک ہی فیز میں موجود ہوں تو اُن میں موجود ذرات کا ملنا مالکچو لرسط پر ممکن ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ آسانی سے ایک دوسرے سے ٹکرا بھی سکتے ہیں۔ یونٹ والیوم میں ری ایکٹنٹس کے ذرات جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہی کامیاب کولیون کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ری ایکشن کا ریٹ بھی زیادہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئلہ کا ہوا میں جلنا جس میں آکسیجن 21% ہوتی ہے مقابلتا اتنا تیز نہیں ہوتا جتنا خالص آکسیجن میں تیز ہوتا ہے۔ اسی طرح لائم سٹون جب ہائڈروکلورک ایسڈ کے مختلف ارتکاز کے ساتھ ری ایکشن کرتا ہے تو ان ری ایکشنز کے ریٹس بھی مختلف ہوتے ہیں۔






16.1

سرگرمی

آئیے ہم ایک ایسا تجربہ کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ ہائڈروکلورک ایسڈ کا ارتکاز تبدیل ہونے سے ری ایکشن کاربٹ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ شکل (16.2) کے مطابق ایک کوئیکل فلاسک میں جسکا پینڈا بالکل سیدھا ہو، اس میں ایک ٹیوب لگائیں جو آگے ایک سرخ کے ساتھ منسلک ہو۔ فلاسک میں لائٹ سٹون کے ٹکڑے خاصی زیادہ تعداد میں لیں اور ایک مولر ہائڈروکلورک ایسڈ کی کچھ مقدار ڈالیں۔ ایسڈ کے ڈالنے ہی ری ایکشن شروع ہو جائے گا جس کے دوران بننے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس سرخ میں جمع ہوتا شروع ہو جائے گی۔ سرخ میں دی گئی سکیل سے براہ راست بننے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کا والیوم دیکھا جاسکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس تجربہ کے دوران کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور ان حالات کو تبدیل نہیں ہونے دینا۔ مثلاً ایک مولر ہائڈروکلورک ایسڈ کا والیوم کلکٹ ہوگا، تجربہ کا ٹیوب بھی ایک جیسارہے گا، لائٹ سٹون کا ماس اور اس کے ٹکڑوں کا سائز اور اس کے پھرنے کو ہلانے کی رفتار سب ایک جیسے رہیں گے۔ اس تجربہ کو پھر دہرایا جائے گا اور اس بار ہم دو مولر ہائڈروکلورک ایسڈ کا پہلے تجربہ جتنا والیوم لیں گے اور بننے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کا والیوم پھر نوٹ کریں گے۔



جاننے والی باتیں

ری ایکشن کافی جلد گیس کو سمجھنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہم ری ایکشن کی کٹھیشز کو کنٹرول کر کے ان کو تیز یا آہستہ کر سکتے ہیں۔

تجربہ کے آغاز میں ارتکاز جتنا زیادہ ہو گا ری ایکشن کی رفتار اتنی ہی تیز ہوگی پس جتنا زیادہ ایسڈ کا ارتکاز ہو گا اتنی زیادہ ہی ایٹیکشن کو لیون ہوگی۔

2- ری ایکشنز اگر گیس حالت میں ہوں

اگر کسی ری ایکشن میں سارے ری ایکٹنٹس گیس حالت میں ہوں تو ان کے ارتکاز میں تبدیلی ان کے پریشر میں تبدیلی سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہائڈروجن گیس اور کلورین گیس کے درمیان وقوع پذیر ہونے والے ری ایکشن کا ریٹ ڈگنا ہو جائے گا اگر کلورین گیس کا پریشر بھی ڈگنا کر دیں گے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دوسرے ری ایکٹنٹ ہائڈروجن کی مقدار دونوں تجربات میں بہت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ ری ایکشن کے ریٹ پر اثر انداز نہ ہو۔


3- ٹھوس اشیا کی سطح کے ایریا کا اثر (Effect of Surface Area of Solids)

جب ٹھوس اشیا ری ایکشنز میں حصہ لیتی ہیں تو ان ری ایکشنز کے ریٹس کا انحصار ان ٹھوس اشیا کی سطح کے ایریا پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ری ایکشنز ان کی سطح پر ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ سطح کا ایریا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ان کے ذرات کے آپس میں ملنے کے امکانات زیادہ ہوں گے اور اتنا ہی ری ایکشن کاربٹ بھی زیادہ ہوگا۔ اشیا اگر بڑے ٹکڑوں کی شکل میں ہوں گی تو ان کے ری ایکشن کاربٹ کم ہوگا اور جب ان اشیا کو پاؤڈر کی شکل میں استعمال کیا جائے گا تو ری ایکشن کاربٹ بہت زیادہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاؤڈر شکل میں





سطح کا ایریا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایلمینیم کو ایک ورق کی شکل میں گرم سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے ساتھ ملا یا جائے تو ری ایکشن بہت آہستہ وقوع پذیر ہوتا ہے اس کے برعکس اگر ایلمینیم پاؤڈر حالت میں استعمال کریں گے تو سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کا ٹھنڈا ایکوس سلوشن بھی ری ایکشن شروع کر دیتا ہے اور ہائیڈروجن گیس بنتا شروع ہو جاتی ہے۔



اس طرح اگر کٹڑی کا بڑا ٹکڑا جلا یا جائے تو وہ آہستہ چلتی ہے جبکہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیزی سے جلتے ہیں۔

4۔ ٹمپریچر کا اثر (Effect of Temperature)



دلچسپ معلومات


کافی ٹمپریچر کی مدد سے ہم نہ صرف ری ایکشن کی پیڈ بڑھاتے ہیں بلکہ رد عمل کی پیداوار کو بھی کم کرتے ہیں۔

یہ بات ہر روز ہی مشاہدے میں آتی ہے کہ ٹمپریچر بڑھنے سے ری ایکشنز کے ریش بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کھانا زیادہ ٹمپریچر پر جلدی پک جاتا ہے۔ اسی طرح آئرن کی آکسائیڈیشن کم ٹمپریچر پر بہت سست ہوتی ہے جبکہ ٹمپریچر بڑھنے سے بہت تیزی سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ بہت سی مثالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 10°C ٹمپریچر بڑھنے سے ری ایکشنز کے

ریش تقریباً دو گنا ہو جاتے ہیں۔ کو لیون تھیوری کے مطابق ری ایکشن کا ٹمپریچر بڑھانے سے اس میں حصہ لینے والے ری ایکٹنٹس کے ذرات کی کافی نیٹک انرجی بڑھتی ہے جس کے نتیجے میں کو لیون کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور ری ایکشن کاریت بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔

5۔ کیٹالسٹ کے اثرات (Effect of Catalyst)

کیٹالسٹ ایک ایسی شے ہے جس کی موجودگی سے ری ایکشن کے ریت میں تبدیل آ جاتی ہے لیکن یہ شے بذاتہ خود ری ایکشن کے دوران استعمال نہیں ہوتی۔ اس کا کردار صرف اتنا ہے کہ ری ایکشن کی ایکٹیویشن انرجی کو خاصا کم کر کے اس کے ریت کو بڑھا دیتا ہے۔ جب ری ایکشن کی ایکٹیویشن انرجی کم ہو جاتی ہے تو ری ایکشنز کے ذرات کی زیادہ سے زیادہ تعداد ٹکرا کر ہائی انرجی اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں



فہم (16.3) ری ایکشن کا راستہ کیٹالسٹ کی غیر موجودگی اور موجودگی میں

جہاں پر ان کی انرجی کافی بڑھ جاتی ہے اور یہ ری ایکشن کو آگے لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اس سے ری ایکشن کاریت بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہائیڈروجن گیس، ایتھین (Ethene) گیس سے ری ایکشن کرتی ہے تو پلائیمیم کو کیٹالسٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مشاہدہ میں یہ بات آتی ہے کہ ری ایکشن میں حصہ لینے والی یہ دونوں گیسیں پلائیمیم کی سطح پر جذب ہو جاتی ہیں جن سے ان میں موجود کیمیکل بانڈز کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح میٹل کی سطح ان دونوں کے درمیان ری ایکشن وقوع پذیر ہونے کی وجہ بنتی ہے۔ فہم (16.3) میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔

کیٹالسٹ کی موجودگی میں ایکٹیویشن انرجی میں خاصی کمی کی بدولت

زیادہ سے زیادہ ذرات اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹکرا کر پروڈکٹس میں تبدیل ہو جائیں۔





16.2 قوری جانچ

6- انزائمز بطور کیٹالسٹ (Enzymes as Catalysts)

- 1- عام طور پر کیٹالسٹ کو پاؤڈر شکل میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟
- 2- کامیاب کولیون کی تعداد کو آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟

انزائمز حیاتیاتی کیٹالسٹ ہیں۔ بنیادی طور پر یہ پروٹینز (Proteins) کے مالیکیولز ہیں جن کی مدد سے ہمارے جسم میں بعض

مخصوص ری ایکشنز وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ان انزائمز میں موجود ایکٹو سائٹس (Active Sites) سے ری ایکشنز کے مالیکیولز جڑ جاتے ہیں جن سے ان میں موجود کچھ مخصوص بانڈز کمزور ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ری ایکشن کی ایکشن کو آگے بڑھائیں۔ انزائمز میں موجود ایکٹو سائٹس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک مخصوص ری ایکٹنٹ کے ساتھ ہی جڑ سکتی ہیں۔ اس لیے ایک مخصوص انزائم ایک مخصوص ری ایکٹنٹ کے ری ایکشن میں ہی کیٹالسٹ کے طور پر کام کر سکتا ہے اور کسی دوسرے ری ایکٹنٹ کی صورت میں یہ بے اثر ہو جاتا ہے۔

مشق

A کثیر الانتخابی سوالات: صحیح جواب پر (✓) کریں۔

- (i) ری ایکشن میں حصہ لینے والے مرکبات کے درمیان کولیون فی یونٹ والیوم کی تعداد کو کہتے ہیں:
 - (الف) کولیون انرجی (ب) ایکٹیویشن انرجی (ج) کولیون فریکوینسی (د) کولیون فورس
- (ii) اگر ری ایکشن کی انرجی ایکٹیویشن انرجی سے زیادہ ہو تو ری ایکشن کیسے وقوع پذیر ہوگا؟
 - (الف) ست (ب) تیز (ج) اثر نہیں ہوگا (د) فوری
- (iii) درج ذیل میں سے کون کیٹالسٹ کی موجودگی میں ری ایکشن کے ریٹ میں اضافے کی وضاحت کرتا ہے:
 - (الف) کیٹالسٹ ری ایکشن کے مالیکیولز کو اضافی انرجی فراہم کرتا ہے
 - (ب) کیٹالسٹ ایک متبادل راستہ فراہم کرتا ہے جو ایکٹیویشن انرجی کو کم کرتا ہے
 - (ج) کیٹالسٹ کولیون فریکوینسی میں اضافہ کرتا ہے
 - (د) کیٹالسٹ کولیون فریکوینسی کو کم کرتا ہے
- (iv) ان میں سے کون سی عبارت درست ہے؟
 - (الف) ایکٹیویشن انرجی کے برابر یا اس سے زیادہ توانائی کے ساتھ کولیونز ری ایکشن کا باعث بنتے ہیں۔
 - (ب) کولیون فریکوینسی کاری ایکشن کے ریٹ سے کوئی تعلق نہیں۔
 - (ج) تمام کولیونز ری ایکشن کے وقوع پذیر ہونے کا باعث بنتے ہیں۔
 - (د) ایکٹیویشن انرجی سے کم توانائی کے ساتھ کولیونز ری ایکشن کا باعث بنتے ہیں۔
- (v) جب کوئی ری ایکشن آگے بڑھتا ہے تو ری ایکٹنٹس اور پروڈکٹس کا ارتکاز کس طرح تبدیل ہوتا ہے؟
 - (الف) ری ایکٹنٹس کے ارتکاز بڑھتے ہیں اور پروڈکٹس کے ارتکاز کم ہوتے ہیں۔
 - (ب) ری ایکٹنٹس کے ارتکاز کم ہوتے ہیں جب کہ پروڈکٹس کے ارتکاز بڑھتے ہیں۔
 - (ج) ری ایکٹنٹس اور پروڈکٹس دونوں کے ارتکاز کم ہوتے ہیں۔
 - (د) ری ایکٹنٹس اور پروڈکٹس دونوں کے ارتکاز بڑھتے ہیں۔





B مختصر جوابی سوالات:

- 16.1 کامیاب کولیون کسے کہتے ہیں؟
- 16.2 درجہ حرارت میں اضافے سے ری ایکشن کے ریٹ میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے؟
- 16.3 ایکٹیویشن انرجی کی تعریف کریں۔
- 16.4 خالص آکسیجن کی نسبت ہوا میں سلفر آہستہ کیوں چلتی ہے؟
- 16.5 ری ایکشن میں استعمال ہونے والے کیمیکل کوانٹٹیوں کو ترجیحی طور پر پاؤڈر کی شکل میں کیوں لیا جاتا ہے؟
- 16.6 ری ایکشن کے آغاز میں ری ایکشن کاربٹ اکثر تیز کیوں ہوتا ہے؟
- 16.7 میگنیشیم کمرے کے درجہ حرارت پر ہوا کے ساتھ ری ایکشن نہیں کرتا لیکن زیادہ درجہ حرارت پر بہت تیزی سے ری ایکشن کرتا ہے جس سے انتہائی سفید روشنی خارج ہوتی ہے۔ وضاحت کریں۔
- 16.8 ری ایکشن کے دوران انرجی مل (Hill) پر چڑھنے کے بعد ری ایکشنز کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟

C تعمیری فکر پر مبنی سوالات:

- 16.1 آپ کن طریقوں سے ری ایکشنز کے ذرات کے درمیان کامیاب کولیونز کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں؟
- 16.2 ایک ایسے ری ایکشن کی مثال دیں جس کے دوران ماس بڑھ جاتا ہے؟
- 16.3 ہائڈروجن سیٹ حاصل کرنے کے لیے مائیکرو لائز انرجی کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟
- 16.4 V_2O_5 کیمیکل کوانٹٹی کی موجودگی سے درج ذیل ری ایکشن کی ایکٹیویشن انرجی کس طرح کم ہوتی ہے؟
- $$2 SO_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2 SO_{3(g)}$$
- 16.5 کسی انزائم کے بطور کیمیکل عمل کرنے کی وضاحت کریں۔
- 16.6 $60^\circ C$ پر ہونے والے ری ایکشن کو کیسے روکا جاسکتا ہے؟

D تفصیلی سوالات:

- 16.1 ری ایکشن کے ریٹ پر سطح کے رقبے کے اثر کی وضاحت کریں۔
- 16.2 ری ایکشن کے ریٹ کے بارے میں کولیون تھیوری کے اہم نکات کی وضاحت کریں۔
- 16.3 ری ایکشن کے ریٹ کو متاثر کرنے والے درج ذیل عوامل کی وضاحت کریں۔
- (الف) ری ایکشنز کے ارتکاز کا اثر۔
- (ب) درجہ حرارت کا اثر جس پر ری ایکشن وقوع پذیر ہوتا ہے۔
- 16.4 بیالوجیکل کیمیکل کوانٹٹی کے طور پر ہمارے جسم میں انزائمز کے کردار کے بارے میں بتائیں۔




ری ایکشن کائی نیٹکس

Reaction Kinetics

حاصلاتِ تعلیم:

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ:

- کولیون تھیوری کو ذرات کی تعداد فی یونٹ والیوم، ذرات کے درمیان تصادم کی فریکوئنسی، ذرات کی حرکی توانائی اور ایکٹیویشن انرجی کے لحاظ سے بیان کریں۔
- بیان کریں کہ کیپالسٹ کسی بھی ری ایکشن کی شرح کو بڑھاتا ہے، ایکٹیویشن انرجی کم کرنے کے ساتھ ری ایکشن کے لیے متبادل راستہ فراہم کرتا ہے اور ری ایکشن کے اختتام پر غیر تبدیل شدہ رہتا ہے۔
- ایسے طبی حوالہ کی وضاحت کریں جو ری ایکشن کے ریٹ سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ بشمول ری ایکشن کے دوران ماس میں تبدیلی، درجہ حرارت میں تبدیلی اور گیس کا بننا۔
- دیے گئے ڈیٹا (جن میں گراف بھی شامل ہیں) کی مدد سے ری ایکشن کے ریٹ کے بارے میں تحقیق کریں۔
- کولیون تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے ری ایکشن کے ریٹ پر بدلے ہوئے اثر کا ذریعہ کسی ٹھوس کی سطح کا رقبہ، درجہ حرارت، کیپالسٹ کی موجودگی (بشمول انزائم) کے اثرات کی وضاحت کریں۔
- خوراک کی صنعت کے لیے کیمیکل کائی نیٹکس کی اہمیت کی وضاحت کریں جس کی مدد سے ہم فصلوں کی کٹائی اور پکی ہوئی اشیاء کے توڑنے کے اوقات اور ان کی محفوظ نقل و حرکت کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں۔



ری ایکشن کا ٹینیٹکس (Reaction Kinetics)

کسی کیمیکل ری ایکشن کا ریٹ (Rate) دراصل اُس کی وہ رفتار ہے جس سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ کیمیکل ری ایکشنز صرف اُس صورت میں ہی مفید ثابت ہوتے ہیں اگر وہ مناسب رفتار سے چلیں۔ اس باب میں ہم کیمیکل ری ایکشنز جس رفتار سے وقوع پذیر ہوتے ہیں اُس کا مطالعہ کریں گے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیمیکل ری ایکشن کے ریٹ پر کون کون سے عناصر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان باتوں کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مالیکیولر سطح پر ری ایکشنز کیسے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔

17.1 ری ایکشنز کے ریٹ کے بارے میں کولیون تھیوری

(Collision Theory of Reaction Rate)

ایک کیمیکل ری ایکشن صرف اُس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب اُس میں حصہ لینے والے ذرات (ایٹمز، مالیکیولز یا آئنز) آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ذرات کے درمیان جو کولیون ہوتے ہیں اُن میں بہت ہی کم کولیون پروڈکٹس بننے کے موجب بنتے ہیں۔ ان کولیون کی اکثریت سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا سوائے اس کے ذرات آپس میں ٹکرانے کے بعد واپس اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ جن کولیون کی وجہ سے ری ایکشن وقوع پذیر ہوتا ہے اُن کو ایفیکٹیو کولیون (Effective Collisions) کہتے ہیں۔

کسی ری ایکشن کے ریٹ کا انحصار ایفیکٹیو کولیون کی تعداد پر ہے اور ایفیکٹیو کولیون کا انحصار درج ذیل باتوں پر ہے۔

1- یونٹ والیوم میں پارٹیکلز کی تعداد (The Number of Particles Per Unit Volume)

یونٹ والیوم میں ذرات کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ایفیکٹیو کولیون کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں ری ایکشنز کا ارتکاز جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ تعداد میں ان میں موجود مالیکیولز آپس میں ٹکرائیں گے۔

2- کولیون کی فریکوئنسی (The Frequency of Collisions)


اگر ایک سیکنڈ میں ہونے والے کولیون زیادہ ہوں گے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان کے درمیان ایفیکٹیو کولیون بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو مالیکیولز کی رفتار بھی زیادہ ہوگی اور ایک سیکنڈ میں ہونے والی کولیون بھی زیادہ ہوں گے۔ اس طرح کولیون کی تعداد بڑھنے سے ایفیکٹیو کولیون کی تعداد بھی بڑھ جائے گی۔

3- ذرات کی کائیٹیک انرجی (The Kinetic energy of the particles)

ذرات کی کائیٹیک تھیوری کے مطابق تمام قسم کے مادہ میں موجود چھوٹے چھوٹے ذرات مستقل حرکت میں ہیں اور ان کی اس حرکت کا انحصار اُن میں موجود کائیٹیک انرجی کی مقدار پر ہے۔ اگر کسی شے کا ٹمپریچر بڑھایا جائے تو اس میں موجود ذرات کی کائیٹیک انرجی بھی بڑھ جاتی ہے جس کے نتیجے میں یہ ذرات تیزی سے حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حرکت کرنے میں اس تیزی کی وجہ سے ان ذرات کے آپس میں کولیون بھی بڑھ جاتے ہیں۔

4- ایکٹیویشن انرجی (Activation Energy)

کولیون تصوری کے مطابق ٹکرانے والے ذرات صرف اسی وقت آپس میں ایکٹو کولیون کا موجب بنتے ہیں جب ان کے پاس اتنی انرجی موجود ہو جو ری ایکٹنٹس کے مالیکولز میں پائے جانے والے بانڈز کو توڑ سکے۔ انرجی کی یہ کم از کم مقدار جو کسی ری ایکشن کو شروع کرنے کا باعث بنتی ہے اس کو ایکٹیویشن انرجی کہتے ہیں۔



عام طور پر کسی خاص ٹیپر پچ پر ری ایکٹنٹس کے مالیکولز کے پاس انرجی کی اوسط مقدار ہوتی ہے۔ ان مالیکولز میں بہت کم مقدار میں موجود مالیکولز کی انرجی اوسط انرجی سے زیادہ ہوتی ہے۔ مالیکولز صرف اسی صورت میں ری ایکشن میں حصہ لیتے ہیں جب مالیکولز کی چھوٹی سی تعداد کی اوسط انرجی میں اتنی زیادتی ہو کہ درکار ایکٹیویشن انرجی سے بڑھ جائے تاکہ وہ ری ایکشن کے وقوع پذیر ہونے کا باعث بن جائیں۔

جب ری ایکٹنٹس کے ذرات کولیون کے لیے ایک دوسرے کے

قریب آتے ہیں تو ان کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے اور ان کی کافی ٹھیک انرجی، پوٹینشل انرجی میں تبدیل ہو کر اس میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے شکل (17.1) میں ری ایکشن کے راستہ اور اس کی پوٹینشل انرجی کے مابین ایک گراف بنایا گیا ہے۔ جب ری ایکٹنٹس کے ذرات جن کی انرجی خاصی زیادہ ہو، آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ پوٹینشل انرجی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسی حالت اختیار کر لیتے ہیں جس کو ہائی انرجی سٹیٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ری ایکٹنٹس، پروڈکٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سسٹم کی پوٹینشل انرجی ایک بار پھر کم ہو جاتی ہے۔

17.1 فوری جانچ

- 1- آپ کولیون فریکوئنسی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟
- 2- ری ایکٹنٹس کے ذرات کے درمیان کولیون کے بعد کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

ری ایکشنز جس طریقے سے مکمل ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایکٹیویشن انرجی کا علم بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح ری ایکشنز جس طریقے سے پروڈکٹس میں تبدیل ہوتے ہیں اس راستے کو ری ایکشن میکانیزم (Mechanism) کہتے ہیں۔

17.2 کیمیکل ری ایکشن کے دوران ماس کا تبدیل ہو جانا

(Change in Mass during a Chemical Reaction)



کیمیکل ری ایکشن کے مکمل ہونے سے پہلے اور بعد میں اس میں حصہ لینے والی اشیاء کا ماس مستقل رہتا ہے۔ ایسا ہونا قانون بقائے مادہ کے تحت ضروری ہے۔ تاہم بعض ری ایکشنز کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مکمل ہونے پر ان کے ماس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ایسا اکثر ان ری ایکٹنٹس میں ہوتا ہے جن میں ری ایکٹنٹس یا پروڈکٹس میں کوئی گیس موجود ہو۔

اگر کسی ری ایکشن کو کھلے برتن میں کیا جائے جہاں گیسیں باہر بھی نکل سکتی ہیں اور اندر بھی داخل ہو سکتی ہیں تو ظاہری طور پر ری ایکشن کے دوران ماس میں تبدیلی آ سکتی ہے اگر اس ری ایکشن کے نتیجہ میں گیس جذب ہو رہی ہو یا باہر نکل رہی ہو۔ مثال کے طور پر، اگر ری ایکشن کے دوران گیس باہر نکل رہی ہو تو ہم ماس میں کمی کا مشاہدہ کریں گے اور اس دوران اگر گیس جذب ہو رہی ہو تو ظاہری طور پر ماس بڑھ جائے گا۔

اگر میگنیشیم سے بنا ہوا رین کسی کھلے کرو سیل (Crucible) میں رکھ کر جلایا جائے تو پروڈکٹ یعنی MgO کا ماس زیادہ ہوگا۔ ماس میں زیادتی کی وجہ یہ ہے کہ میگنیشیم نے ہوا میں موجود آکسیجن سے ری ایکشن کر کے یہ حاصل بنایا ہے۔ تاہم اگر ان ری ایکشنس (O_2 اور Mg) کو ایک بند برتن میں رکھ کر گرم کیا جائے تو ری ایکشنس کا کل ماس پروڈکٹس کے ماس کے برابر ہوگا۔

کیمیکل ری ایکشن کے دوران گیس کا جتنا

اگر ڈائیٹیوٹ ہائیڈروکلورک ایسڈ اور ماربل چپس کے درمیان ایک کھلے رتن میں ری ایکشن کیا جائے تو پروڈکٹس کا ٹوٹل ماس ظاہری طور پر ری ایکشنس سے کم ہوگا۔ ماس میں یہ بظاہر کمی ری ایکشن کے دوران کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کے بننے سے ہوئی ہے جو بننے ہی ہوا میں شامل ہو جاتی ہے۔




اگر ری ایکشن کو آگے بڑھایا جائے تو ری ایکشنس کے ارتکاز آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے کیونکہ ری ایکشن کے دوران یہ اشیاء استعمال ہو رہی ہیں۔ اسی وقت پروڈکٹس کے ارتکاز میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جائے گا حتیٰ کہ ری ایکشن کے مکمل ہونے پر یہ ارتکاز زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گے۔ شکل (17.2) میں گراف سے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔

17.3 ری ایکشن کے دوران ٹمپریچر میں تبدیلی

(Change in Temperature during a Chemical Reaction)

کیمیکل ری ایکشنز کے دوران اکثر اوقات ٹمپریچر میں تبدیلیاں آتی ہیں کیونکہ ری ایکشنز یا ایکسو تھرمک (Exothermic) ہوتے ہیں یا اینڈو تھرمک (Endothermic)۔ ایکسو تھرمک ری ایکشنز میں انرجی باہر نکلتی ہے جس سے ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ یہ نکلنے والی انرجی پھر بیرونی ماحول میں جذب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب آن بجھا چونا (Quick Lime CaO) پانی سے ری ایکشن کرتا ہے تو بجھا ہوا چونا یا سلیکڈ لائم (Slaked Lime) بنتا ہے اور اس دوران بہت سی انرجی خارج ہوتی ہے۔



اسی طرح اینڈو تھرمک ری ایکشنز میں انرجی جذب ہونے کی وجہ سے بیرونی ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب امونیم کلورائیڈ یا امونیم نائٹریٹ کو پانی میں حل کیا جائے تو ہیٹ انرجی جذب ہوتی ہے اور استعمال ہونے والا برتن ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ری ایکشن کا ٹمپریچر بڑھانے سے اس کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے ری ایکشنز کے ریٹس (Rates) ٹمپریچر کے $10^\circ C$ تک بڑھ جانے سے تقریباً دو گنا ہو جاتے ہیں۔ کھانے پکانے کے لیے ہم اشیاء کو گرم کرتے ہیں تاکہ اس دوران دقو پذیر ہونے والے ری ایکشنز کی رفتار بڑھ جائے۔ کیمیکل ری ایکشنز سے خوراک میں موجود اجزاء ٹوٹ جاتے ہیں اور خوراک کھانے کے قابل ہو جاتی ہے۔

17.4 ری ایکشن کے ریش پر مختلف عوامل کے اثرات

(Factors Affecting the Rates of Reaction)

کولیون تھیوری کے مطابق سارے وہ عوامل جو فی سیکنڈ کامیاب کولیون کی تعداد کو تبدیل کرتے ہیں ری ایکشن کے ریٹ کو بھی تبدیل کریں گے۔ ذیل میں درج پیرا گرافس میں چند ایسے عوامل تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں۔

1- ری ایکٹنٹس کے ارتکاز کے اثرات

کسی ری ایکشن کے وقوع پذیر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں حصہ لینے والے ری ایکٹنٹس ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ اسی وجہ سے ری ایکشنز اکثر اوقات ایک ہی فیز (Phase) میں کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان ری ایکشن کو یقینی بنایا جاسکے۔ مثال کے طور پر ری ایکٹنٹس ایک ہی سلوشن میں حل کیے جاتے ہیں یا پھر ان کو گسی حالت میں ملایا جاتا ہے۔ جب ری ایکٹنٹس ایک ہی فیز میں موجود ہوں تو ان میں موجود ذرات کا ملنا مالکیو لرسط پر ممکن ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ آسانی سے ایک دوسرے سے ٹکرا بھی سکتے ہیں۔ یونٹ والیوم میں ری ایکٹنٹس کے ذرات جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہی کامیاب کولیون کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ری ایکشن کا ریٹ بھی زیادہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئلہ کا ہوا میں جلنا جس میں آکسیجن 21% ہوتی ہے مقابلہ اتنا تیز نہیں ہوتا جتنا خالص آکسیجن میں تیز ہوتا ہے۔ اسی طرح لائٹ سٹون جب ہائڈروکلورک ایسڈ کے مختلف ارتکاز کے ساتھ ری ایکشن کرتا ہے تو ان ری ایکشنز کے ریش بھی مختلف ہوتے ہیں۔

17.1 سرگرمی

آئیے ہم ایک ایسا تجربہ کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ ہائڈروکلورک ایسڈ کا ارتکاز تبدیل ہونے سے ری ایکشن کا ریٹ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ شکل (17.3) کے مطابق ایک کوئیکل فلاسک میں جسکا پینڈا بالکل سیدھا ہو، اس میں ایک ٹیپ لگائیں جو آگے ایک سرخ کے ساتھ شلک ہو۔ فلاسک میں لائٹ سٹون کے ٹکڑے خاصی زیادہ تعداد میں لیں اور ایک مولر ہائڈروکلورک ایسڈ کی کچھ مقدار ڈالیں۔ ایسڈ کے ڈالتے ہی ری ایکشن شروع ہو جائے گا جس کے دوران بننے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس سرخ میں جمع ہونا شروع ہو جائے گی۔ سرخ میں دی گئی سکیل سے براہ راست بننے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کا والیوم دیکھا جاسکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس تجربہ کے دوران کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور ان حالات کو تبدیل نہیں ہونے دینا۔ مثلاً ایک مولر ہائڈروکلورک ایسڈ کا والیوم گنٹھ ہوگا، تجربہ کا ٹیپ پھر بھی ایک جیسا رہے گا، لائٹ سٹون کا ماس اور اس کے ٹکڑوں کا سائز اور اس کے پھر کو ہلانے کی رفتار سب ایک جیسے رہیں گے۔ اس تجربہ کو پھر دہرایا جائے گا اور اس بار ہم دو مولر ہائڈروکلورک ایسڈ کا پہلے تجربہ جتنا والیوم لیں گے اور بننے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کا والیوم پھر نوٹ کریں گے۔





جاننے والی باتیں ✓

ری ایکشن کا ٹیٹیکس کو سمجھنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہم ری ایکشن کی کینڈیشنز کو کنٹرول کر کے ان کو تیز یا آہستہ کر سکتے ہیں۔

ری ایکشن کے ریٹ میں پڑنے والے فرق کو معلوم کرنے کے لیے پھر وقت (سیکنڈ یا منٹس میں) اور بننے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کے درمیان گراف بنایا جائے گا جو کہ شکل (17.4) میں دکھایا گیا ہے۔

حاصل ہونے والے گراف کی شکل ایک کرو (Curve) کی مانند ہے۔ اس گراف کی مدد سے وقت کے ایک خاص وقفے میں ری ایکشن کاربیٹ معلوم کرنے کے لیے اس کرو (Curve) پر ایک لائن لگائیں گے جس کو ٹینجٹ (Tangent) کہتے ہیں۔ اس تجربہ کے نتائج سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ری ایکشن کاربیٹ شروع میں بہت تیز ہوتا ہے جو کہ پھر ہائڈروکلورک ایسڈ کے ارتکاز میں کمی آنے کی وجہ سے پھر بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ اور جب تمام ہائڈروکلورک استعمال ہو جاتا ہے تو ری ایکشن بھی وہاں رک جاتا ہے۔ شکل (17.5) میں دکھائی گئے دو گرو دراصل دو تجربات کو ظاہر کرتے ہیں جو ایک اور دو مولر ہائڈروکلورک ایسڈ کو استعمال کر کے کیے گئے ہیں۔

ہائڈروکلورک ایسڈ کا ارتکاز جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی گرو شروع میں زیادہ ڈھلوان (Steeper) والا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائڈروکلورک ایسڈ کا ارتکاز جتنا زیادہ ہوگا اتنے ہی مالیکیولز کی تعداد زیادہ ہوگی جس سے کامیاب کولیون بھی بڑھیں گے اور اس طرح ری ایکشن کاربیٹ بھی زیادہ ہوگا۔




2- ری ایکشنز اگر کیسی حالت میں ہوں

اگر کسی ری ایکشن میں سارے ری ایکٹنٹس کیسی حالت میں ہوں تو ان کے ارتکاز میں تبدیلی ان کے پریشر میں تبدیلی سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہائڈروجن گیس اور کلورین گیس کے درمیان وقوع پذیر ہونے والے ری ایکشن کاربیٹ ڈگنا ہو جائے گا اگر کلورین گیس کا پریشر بھی ڈگنا کر دیں گے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دوسرے ری ایکٹنٹس ہائڈروجن کی مقدار دونوں تجربات میں بہت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ ری ایکشن کے ریٹ پر اثر انداز نہ ہو۔


3- ٹھوس اشیا کی سطح کے ایریا کا اثر (Effect of Surface Area of Solids)

جب ٹھوس اشیا ری ایکشن میں حصہ لیتی ہیں تو ان ری ایکشنز کے ریش کا انحصار ان ٹھوس اشیا کی سطح کے ایریا پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ری ایکشنز ان کی سطح پر ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ سطح کا ایریا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ان کے ذرات کے آپس میں ملنے کے

امکانات زیادہ ہوں گے اور اتنا ہی ری ایکشن کاریٹ بھی زیادہ ہوگا۔ اشیاء اگر بڑے ٹکڑوں کی شکل میں ہوں گی تو ان کے ری ایکشن کاریٹ کم ہوگا اور جب ان اشیاء کو پاؤڈر کی شکل میں استعمال کیا جائے گا تو ری ایکشن کاریٹ بہت زیادہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاؤڈر شکل میں سطح کا ایریا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایلومینیم کو ایک ورق کی شکل میں گرم سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے ساتھ ملایا جائے تو ری ایکشن بہت آہستہ وقوع پذیر ہوتا ہے اس کے برعکس اگر ایلومینیم پاؤڈر حالت میں استعمال کریں گے تو سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کا ٹھنڈا ایکو س سلوشن بھی ری ایکشن شروع کر دیتا ہے اور ہائیڈروجن گیس بنتا شروع ہو جاتی ہے۔



اس طرح اگر لکڑی کا بڑا ٹکڑا جلایا جائے تو وہ آہستہ جلتی ہے جبکہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیزی سے جلتے ہیں۔



4۔ نمبر پچھڑ کا اثر (Effect of Temperature)

یہ بات ہر روز ہی مشاہدے میں آتی ہے کہ نمبر پچھڑ بڑھنے سے ری ایکشن کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کھانا زیادہ نمبر پچھڑ پر جلدی پک جاتا ہے۔ اسی طرح آئرن کی آکسائیڈیشن کم نمبر پچھڑ پر بہت سست ہوتی ہے جبکہ نمبر پچھڑ بڑھنے سے بہت تیزی سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ بہت سی مثالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 10°C نمبر پچھڑ بڑھنے سے ری ایکشن کے ریٹ تقریباً دو گنا ہو جاتے ہیں۔ شکل (17.6) میں دکھایا گیا ہے گراف اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ نمبر پچھڑ کے بڑھنے سے ری ایکشن کے ریٹ کیوں بڑھ جاتے ہیں۔


دلچسپ معلومات

کافی فیکس کی مدد سے ہم نہ صرف تعاملات کی جیلڈ بڑھاتے ہیں بلکہ رد عمل کی پیداوار کو بھی کم کرتے ہیں۔

تھیوری (Collision Theory) کے مطابق کسی ری ایکشن کے ریٹ کا انحصار ری ایکشن کے درمیان کامیاب کولیون کی فریکوئنسی یا سیکنڈ کولیون کی تعداد پر ہے۔ جب کسی ری ایکشن کا نمبر پچھڑ بڑھایا جاتا ہے تو اس میں حصہ لینے والے ری ایکشن کے ذرات کی کافی فیکس انرجی بھی بڑھ جاتی ہے۔ کافی فیکس انرجی بڑھنے سے ان ذرات کی حرکت بھی تیز ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں کامیاب کولیون کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے جس سے پھر ری ایکشن کاریٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔

5۔ کیٹالسٹ کے اثرات (Effect of Catalyst)

کیٹالسٹ ایک ایسی شے ہے جس کی موجودگی سے ری ایکشن کے ریٹ میں تبدیل آ جاتی ہے لیکن یہ شے بذاتِ خود ری ایکشن کے دوران استعمال نہیں ہوتی۔ اس کا کردار صرف اتنا ہے کہ ری ایکشن کی ایکٹیویشن انرجی کو خاص کم کر کے اس کے ریٹ کو بڑھا دیتا ہے۔ جب ری ایکشن کی ایکٹیویشن انرجی کم ہو جاتی ہے تو ری ایکشن کے ذرات کی زیادہ سے زیادہ تعداد ٹکرا کر ہائی انرجی اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں



شکل (17.7) ری ایکشن کا راستہ کیپٹالسٹ کی غیر موجودگی اور موجودگی میں

جہاں پر ان کی انرجی کافی بڑھ جاتی ہے اور یہ ری ایکشن کو آگے لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اس سے ری ایکشن کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہائڈروجن گیس، ایتھین (Ethene) گیس سے ری ایکشن کرتی ہے تو پلائٹیم کو کیپٹالسٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مشاہدہ میں یہ بات آئی ہے کہ ری ایکشن میں حصہ لینے والی یہ دونوں گیسیں پلائٹیم کی سطح پر جذب ہو جاتی ہیں جن سے ان میں موجود کیمیکل بانڈز کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح میٹل کی سطح ان دونوں کے درمیان ری ایکشن وقوع پذیر ہونے کی وجہ بنتی ہے۔ شکل (17.7) میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔

کیپٹالسٹ کی موجودگی میں ایکٹیویشن انرجی میں خاصی کمی کی بدولت زیادہ سے زیادہ ذرات اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹکرا کر پروڈکٹس میں تبدیل ہو جائیں۔

فوری جانچ 17.2

- 1- عام طور پر کیپٹالسٹ کو پاؤڈر شکل میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟
- 2- کامیاب کولیون کی تعداد کو آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟
- 3- کسی ری ایکشن کے دوران پروڈکٹس کے ارتکاز میں کیسے تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے؟ گراف کی مدد سے اس کی وضاحت کریں۔

6- انزائمز بطور کیپٹالسٹ (Enzymes as Catalysts)

انزائمز حیاتیاتی کیپٹالسٹ ہیں۔ بنیادی طور پر یہ پروٹینز (Proteins) کے مالیکیولز ہیں جن کی مدد سے ہمارے جسم میں بعض مخصوص ری ایکشنز وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ان انزائمز میں موجود ایکٹیو سائٹس (Active Sites) سے ری ایکشنز کے مالیکیولز جڑ جاتے ہیں جن سے ان میں موجود کچھ مخصوص بانڈز کمزور ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ری ایکشن کو آگے بڑھائیں۔

انزائمز میں موجود ایکٹیو سائٹس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک مخصوص ری ایکٹنٹ کے ساتھ ہی جڑ سکتی ہیں۔ اس لیے ایک مخصوص انزائم ایک مخصوص ری ایکٹنٹ کے ری ایکشن میں ہی کیپٹالسٹ کے طور پر کام کر سکتا ہے اور کسی دوسرے ری ایکٹنٹ کی صورت میں یہ بے اثر ہو جاتا ہے۔

17.5 خوراک کی صنعت میں کیمیکل کائی ٹیکنکس کی اہمیت


(Importance of Chemical Kinetics in Food Industry)

ری ایکشنز کے ریٹس اور ان پر مختلف عوامل کے پڑنے والے اثرات کا مطالعہ خوراک کی صنعت میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔

دلچسپ معلومات

خون میں موجود گلوکوز کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے ایسے سنسرز (Sensors) استعمال ہوتے ہیں جن میں انزائمز ہوتے ہیں۔ ان کو بائیوسنسرز (Biosensors) کہتے ہیں۔

مختلف پھلوں اور سبزیوں کے پکنے اور ان کے خراب ہونے میں حصہ لینے والے ری ایکشنز کے ریٹس کا مطالعہ کیا گیا ہے اور اس مطالعہ کی روشنی میں ہم ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جن سے پھلوں اور سبزیوں کے خراب ہونے کی رفتار کو کم از کم کیا جاسکے۔ خوراک سے متعلق سائنس دان اشیاء کے خراب ہونے، ان کو سنسور کرنے اور ان کی نقل و حمل کے درمیان ہونے والے ری ایکشنز کے ریٹس کا مطالعہ کر کے ایسے حالات تجویز کر سکتے ہیں جن سے ان اشیاء کو




زیادہ سے زیادہ دیر تک محفوظ رکھا جاسکے۔ اس دوران ان اشیاء میں جوری ایکشنز وقوع پذیر ہوتے ہیں ان میں انزائمز کی مدد سے ہونے والے ری ایکشنز، آکسائیڈیشن ری ایکشنز اور مائیکروبز (Microbes) کی وجہ سے ہونے والے ری ایکشنز شامل ہیں۔

پھلوں اور سبزیوں کے پکنے کے دوران جوری ایکشنز وقوع پذیر ہوتے ہیں ان میں مختلف انزائمز بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان ری ایکشنز کی مدد سے سٹارچ (Starches) کو شوگرز (Sugars) میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ مزید یہ ری ایکشنز ان اشیاء میں موجود مختلف عضلات کو نرم کر دیتے ہیں اور ان اشیاء میں مخصوص رنگ اور خوشبو شامل کر دیتے ہیں۔ انزائمز کی مدد سے ہونے والے ان ری ایکشنز کے ریٹس کے مطالعہ کی بدولت کسان اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ کب اشیاء کو اٹائی کے لحاظ سے بہترین ہوں گی اور اپنے ماخذ (Source) سے توڑنے کے لیے تیار ہوں گی۔

مثال کے طور پر پھلوں میں بننے والی ایتھین (Ethene) کے بننے کی رفتار سے یہ بات معلوم کی جاسکتی ہے کہ کونسا وقت ان پھلوں کے پکنے کے لیے بہترین ہوگا۔

خوراک میں قدرتی طور پر موجود مختلف انزائمز اس خوراک کو خراب کرنے کا موجب بنتے ہیں جس سے خوراک کے سطح، اسکی خوشبو اور غذائی قدر و قیمت میں فرق آ جاتا ہے۔ ان انزائمز کی وجہ سے ہونے والے ری ایکشنز کے ریٹس کا مطالعہ کر کے ہم اس بات کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں کہ خوراک کے خراب ہونے کے عمل کو خاصی حد تک روکا جاسکے۔



چربی (Fats) کے آکسائیڈیشن ری ایکشنز کی کائی ٹیکس کے مطالعہ سے ہم یکن میں آنے والی خرابی کو روک سکتے ہیں۔

17.3
فوری جانچ

- 1- کسی فروٹ کے پکنے کے بہترین وقت کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟
- 2- بعض پھل اور سبزیوں کی نسبت گرمیوں میں کیوں جلد خراب ہو جاتی ہیں؟



A کثیر الانتخابی سوالات:

صحیح جواب پر (✓) کریں۔

- (i) ری ایکشن میں حصہ لینے والے مرکبات کے درمیان کو لیون فی یونٹ والیوم کی تعداد کو کہتے ہیں:

(الف) کو لیون انرجی
(ب) ایکٹیویشن انرجی
(ج) کو لیون فریکٹیوٹی
(د) کو لیون فورس
- (ii) اگر ری ایکشنز کی انرجی ایکٹیویشن انرجی سے زیادہ ہو تو ری ایکشن کیسے وقوع پذیر ہوگا؟

(الف) ست
(ب) تیز
(ج) اثر نہیں ہوگا
(د) فوری



- (iii) درج ذیل میں سے کون کیا لسٹ کی موجودگی میں ری ایکشن کے ریٹ میں اضافے کی وضاحت کرتا ہے:
- (الف) کیا لسٹ ری ایکشنز کے مالکیولز کو اضافی انرجی فراہم کرتا ہے
- (ب) کیا لسٹ ایک متبادل راستہ فراہم کرتا ہے جو ایکٹیویشن انرجی کو کم کرتا ہے
- (ج) کیا لسٹ کولیون فریکوئنسی میں اضافہ کرتا ہے
- (د) کیا لسٹ کولیون فریکوئنسی کو کم کرتا ہے
- (iv) ان میں سے کون سی عبارت درست ہے:

- (الف) ایکٹیویشن انرجی کے برابر یا اس سے زیادہ توانائی کے ساتھ کولیونز ری ایکشن کا باعث بنتے ہیں۔
- (ب) کولیون فریکوئنسی کاری ایکشن کے ریٹ سے کوئی تعلق نہیں۔
- (ج) تمام کولیونز ری ایکشن کے وقوع پذیر ہونے کا باعث بنتے ہیں۔
- (د) ایکٹیویشن انرجی سے کم توانائی کے ساتھ کولیونز ری ایکشن کا باعث بنتے ہیں۔
- (v) جب کوئی ری ایکشن آگے بڑھتا ہے تو ری ایکشنز کے ایکٹنس اور پروڈکٹس کا ارتکاز کس طرح تبدیل ہوتا ہے:
- (الف) ری ایکشنز کے ارتکاز بڑھتے ہیں اور پروڈکٹس کے ارتکاز کم ہوتے ہیں۔
- (ب) ری ایکشنز کے ارتکاز کم ہوتے ہیں جب کہ پروڈکٹس کے ارتکاز بڑھتے ہیں۔
- (ج) ری ایکشنز اور پروڈکٹس دونوں کے ارتکاز کم ہوتے ہیں۔
- (د) ری ایکشنز اور پروڈکٹس دونوں کے ارتکاز بڑھتے ہیں۔

B مختصر جوابی سوالات:

- 17.1 کامیاب کولیون کیسے کہتے ہیں؟
- 17.2 درجہ حرارت میں اضافے سے ری ایکشن کے ریٹ میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے؟
- 17.3 ایکٹیویشن انرجی کی تعریف کریں۔
- 17.4 خالص آکسیجن کی نسبت ہوا میں سلفر آہستہ کیوں جلتی ہے؟
- 17.5 ری ایکشن میں استعمال ہونے والے کیا لسٹ کو ترجیحی طور پر پاؤڈر کی شکل میں کیوں لیا جاتا ہے؟
- 17.6 ری ایکشن کے آغاز میں ری ایکشن کاریٹ اکثر تیز کیوں ہوتا ہے؟
- 17.7 میگنیشیم کمرے کے درجہ حرارت پر ہوا کے ساتھ ری ایکشن نہیں کرتا لیکن زیادہ درجہ حرارت پر بہت تیزی سے ری ایکشن کرتا ہے جس سے انتہائی سفید روشنی خارج ہوتی ہے۔ وضاحت کریں۔
- 17.8 ری ایکشن کے دوران انرجی ہل (Hill) پر چڑھنے کے بعد ری ایکشنز کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
- 17.9 ایک کیا لسٹ کسی ری ایکشن کی ایکٹیویشن انرجی کو کیسے کم کرتا ہے؟
- 17.10 کسی انزائم کے بطور کیا لسٹ عمل کرنے کی کوئی سی دو خصوصیات بتائیں۔

تعمیری فکر پر مبنی سوالات:

C

- 17.1 آپ کن طریقوں سے ری ایکشنز کے ذرات کے درمیان کامیاب کولیوونز کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں؟
- 17.2 ایک ایسے ری ایکشن کی مثال دیں جس کے دوران ماس بڑھ جاتا ہے؟
- 17.3 ہائز انرجی سٹیٹ حاصل کرنے کے لیے مالکیولز انرجی کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟
- 17.4 V_2O_5 کیپلاسٹ کی موجودگی سے درج ذیل ری ایکشن کی ایکٹیویشن انرجی کس طرح کم ہوتی ہے؟
- $$2 SO_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2 SO_{3(g)}$$
- 17.5 کسی انزائم کے بطور کیپلاسٹ عمل کرنے کی وضاحت کریں۔
- 17.6 $60^\circ C$ پر ہونے والے ری ایکشن کو کیسے روکا جاسکتا ہے؟

تفصیلی سوالات:

D

- 17.1 ری ایکشن کے ریٹ پر سطح کے رقبے کے اثر کی وضاحت کریں۔
- 17.2 ری ایکشن کے ریٹ کے بارے میں کولیوون تصویری کے اہم نکات کی وضاحت کریں۔
- 17.3 ری ایکشن کے ریٹ کو متاثر کرنے والے درج ذیل عوامل کی وضاحت کریں۔
- (الف) ری ایکٹنٹس کے ارتکاز کا اثر۔
- (ب) درجہ حرارت کا اثر جس پر ری ایکشن وقوع پذیر ہوتا ہے۔
- 17.4 خوراک کی صنعت کے لیے کیمیکل حرکیات (Chemical Kinetics) کس طرح اہم کردار ادا کرتی ہیں؟
- 17.5 حیاتیاتی کیپلاسٹ کے طور پر ہمارے جسم میں انزائمز کے کردار کے بارے میں بتائیں۔

نائٹروجن اور سلفر Nitrogen and Sulphur


حاصلات تقلم:

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ:

- معلوم کریں کہ فضا میں موجود نائٹروجن کے آکسائیڈز (NO, NO₂) غیر چلے ہوئے ہائڈروکاربنز کے ساتھ ری ایکشن کرتے ہوئے پر آکسی ایسیٹکسٹکسٹ یا پی ای اے این (PAN) بناتے ہیں جو فوٹو کیمیکل سموگ کا ایک جزو ہے۔
- تیزابی بارش کی تشکیل میں NO اور NO₂ کے براہ راست کردار کو اور فضا میں موجود سلفر ڈائی آکسائیڈ کی آکسائیڈیشن (Oxidation) میں ان کے بطور کیپا لسٹ کردار کی وضاحت کریں۔
- مہر پر اس (Haber Process) میں امونیا بنانے کی علاقائی مساوات کو تحریر کریں۔



- مہر پر اس میں بیان کریں کہ ہائڈروجن کا سورس میتھین (CH₄) اور نائٹروجن کا سورس ہوا (Air) ہے۔
- مہر پر اس کے دوران امونیا بنانے کی کنڈیشنز یعنی 20000 kPa/20 atm، 450°C اور آئرن بطور کیپا لسٹ کا استعمال بیان کریں۔
- کاتلیکٹ پر اس میں سلفر ڈائی آکسائیڈ کو سلفر ٹرائی آکسائیڈ میں تبدیل کرنے کو علاقائی مساوات کے طور پر بیان کریں۔



- کاتلیکٹ پر اس میں استعمال ہونے والی سلفر ڈائی آکسائیڈ (سلفر کا جلنا یا سلفر کے دھات کی روستنگ) اور آکسیجن (ہوا) کا ماخذ بتائیں۔
- کاتلیکٹ پر اس میں سلفر ڈائی آکسائیڈ کو سلفر ٹرائی آکسائیڈ میں تبدیل کرنے کے لیے کنڈیشنز 200 kPa/atm، 450°C اور وینڈیم (V) آکسائیڈ بطور کیپا لسٹ آکسائیڈ بیان کریں۔
- ایمنو ٹیرک آکسائیڈز کے بارے میں بتائیں کہ یہ ایسڈز اور بیسز دونوں کے ساتھ ری ایکشن کر کے سائلز اور پانی بناتے ہیں۔
- آکسائیڈز کی درجہ بندی کریں بطور ایسڈک (CO₂ اور SO₂)، بطور بیسک (CaO اور CuO) اور بطور ایمنو ٹیرک آکسائیڈز (Al₂O₃ اور ZnO)۔
- زیورجہ بندی ان کے مثیلک اور نان مثیلک کردار کی وجہ سے ہے۔
- دھاتوں کی عام کیمیائی خصوصیات کی نشاندہی کریں اور ڈائلیٹوٹ ایسڈز، ٹھنڈے پانی، بھاپ اور آکسیجن کے ساتھ ری ایکشنز تک محدود رہیں۔


18.1 امونیا (Ammonia)

امونیا گیس دنیا میں صنعتی بنانے پر بننے والا ایک اہم کیمیکل ہے۔ یوریا اور دوسرے امونیم سائلز کثرت سے بطور کھاد استعمال ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر کی صنعتوں میں بننے والی 80% امونیا کھادوں کو بنانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ امونیا گیس پلاسٹکس اور ادویات بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اسے ٹھنڈک پیدا کرنے والے مادہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

صنعتی بنانے پر امونیا کو مہر (Haber) کے طریقہ کے مطابق بنایا جاتا ہے جو ایک جرمنی کے کیمسٹ ایف۔ جے مہر (FJ Haber) نے دریافت کیا تھا۔ اس طریقہ میں نائٹروجن اور ہائڈروجن کو بالآخر 1:3 کی نسبت سے 200°C پر ایسٹریکٹ



اور $\text{Fe}/\text{Al}_2\text{O}_3$ کیپالٹ کی موجودگی میں 400°C سے 500°C تک ہیٹ کیا جاتا ہے تو امونیا بنتی ہے۔



اوپر دیے گئے ری ایکشن سے حاصل ہونے والے آمیزہ میں ایکو لبریم حالت پر والیوم کے لحاظ سے 35% امونیا ہوتی ہے۔ اس آمیزہ کو پھر ٹھنڈا کرنے والے کوائلوں (Coils) سے امونیا گیس کو 33.4°C پر مائع امونیا میں تبدیل کیا جاتا ہے اس طرح یہ مائع گیس آمیزہ سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ آمیزہ کے دوسرے اجزاء یعنی نائٹروجن اور ہائیڈروجن گیسوں کو دوبارہ ری ایکشن کرنے والے جیمبر میں بھیج دیا جاتا ہے شکل (18.1)۔

نائٹروجن کا سورس (Source of Nitrogen)

امونیا گیس کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال میں سے نائٹروجن گیس ہوا کی فریکشنل ڈسٹیلیشن (Fractional Distillation) سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے ہوا کو کاربن ڈائی آکسائیڈ سے پاک کیا جاتا ہے اور پھر اس پر 200 اتماسفیئرک پریشر ڈالا جاتا ہے۔ اس دبائی ہوئی ہوا کو پھر ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور اسے ایک بہت چھوٹے سوراخ میں سے گزرا جاتا ہے۔ اس سوراخ سے گزرنے کے بعد یہ ہوا یکدم بھٹکتی ہے اور اس کا ٹھہر چر مزید کم ہو جاتا ہے۔ دبائے اور پھیلانے کا عمل بار بار کرنے سے ہوا بالآخر مائع میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

اس مائع ہوا کی پھر فریکشنل ڈسٹیلیشن (Fractional Distillation) کی جاتی ہے چونکہ نائٹروجن کا بوائلنگ پوائنٹ آکسیجن سے کم ہے اس لیے یہ 196°C پر پہلے بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مائع ہوا میں آکسیجن باقی رہ جاتی ہے۔ علیحدہ کی گئی نائٹروجن گیس کو دوبارہ مائع بنا کر مخصوص سیلنڈرز میں سٹور کر لیا جاتا ہے۔

ہائیڈروجن کا سورس (Source of Hydrogen)

امونیا بنانے کے لیے دوسرے خام مال ہائیڈروجن کو حاصل کرنے کے لیے میتھین (Methane) کو آکسیجن کی محدود مقدار کے ساتھ بخودی آکسیڈائز کیا جاتا ہے تاکہ یہ ساری کی ساری کابن ڈائی آکسائیڈ اور پانی میں تبدیل نہ ہو جائے۔ آکسیجن کی مقدار محدود ہونے کی وجہ سے ری ایکشن کے پروڈکٹس میں ہائیڈروجن اور کاربن مونو آکسائیڈ زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہیں جبکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اس ری ایکشن میں حاصل ہونے والی کاربن مونو آکسائیڈ کا پھر پانی کے ساتھ ری ایکشن کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور مزید ہائیڈروجن حاصل کی جاتی ہے۔

نوری جانچ 18.1


- 1- امونیا گیس بنانے کے بعد اس کو مائع میں کیوں تبدیل کیا جاتا ہے؟
- 2- امونیا گیس کی تیاری میں اتنا زیادہ پریشر کیوں ضروری ہے؟





دلچسپ معلومات

ماحول میں نائٹروجن گیسوں کا 13% مہرہ پروسیس کے ذریعے مہیا کیا جاتا ہے۔



18.2 سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid)


سلفیورک ایسڈ ایک بہت ہی اہم کیمیکل کمپاؤنڈ ہے۔ اس کو نہ صرف لیبارٹری میں بلکہ تقریباً ہر صنعت میں براہ راست یا بالواسطہ کسی نہ کسی سٹیج (Stage) میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صنعتی پیمانے پر سلفیورک ایسڈ کو کنٹیکٹ پروسیس (Contact Process) سے بنایا جاتا ہے۔ اس پروسیس میں ذیل میں درج مراحل آتے ہیں۔

1- سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس کی تیاری (Preparation of Sulphur Dioxide Gas)

دلچسپ معلومات

سلفیورک ایسڈ کو کیمیکلز کا بادشاہ کہتے ہیں کیونکہ یہ تقریباً ہر صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔

سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس یا تو سلفر عنصر کو ہوا میں جلانے سے بنائی جاتی ہے یا پھر سلفر کی کچ دھات، آئرن پائرائٹ، کوہوا کی زیادہ مقدار میں گرم کیا جاتا ہے۔




2- سلفر ڈائی آکسائیڈ کی آکسائیڈیشن (Oxidation of Sulphur Dioxide)

بالکل صاف شفاف اور خشک گیسوں (SO_2 اور O_2) کو پھر ایک کنٹیکٹ چیمبر (Contact Chamber) میں 2 تا 3 لاکھ سینٹی گریڈ اور 450°C ٹمپریچر پر وینڈیم (Vanadium V) آکسائیڈ کنکٹ کے اوپر سے گزارا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ری ایکشن ایک ریورسیبل (Reversible) ری ایکشن ہے پھر بھی ان حالات میں 98% سلفر ڈائی آکسائیڈ، سلفر ڈائی آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔



شکل (18.2)۔

3- کنٹیکٹ چیمبر میں بننے والی سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس کو پھر 98% سلفیورک میں جذب کیا جاتا ہے جس سے اولیم (Oleum) بنتا ہے۔



شکل (18.2) کنٹیکٹ پروسیس





18.2 فوری جانچ

- 1 - FeS_2 سے سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس کیسے بنائی جاتی ہے؟
- 2 - SO_3 بنانے والے ری ایکشن سے پہلے سلفر ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن کو کیوں صاف کیا جاتا ہے؟

4۔ اولیم کو پھر پانی کی ایک مخصوص مقدار سے ملا کر مطلوبہ اریکاز والا سلفیورک ایسڈ بنایا جاتا ہے۔







18.3 آکسائیڈز (Oxides)

مختلف عناصر کے ساتھ آکسیجن کے بائنری (Binary) کمپائونڈز کو آکسائیڈز کہتے ہیں۔ ان آکسائیڈز میں آکسیجن کی آکسائیڈیشن سٹیٹ 2- ہوتی ہے۔ عام طور پر میٹل آکسائیڈز بیسیک (Basic) یا امفیوٹیرک (Amphoteric) ہوتے ہیں جبکہ نان میٹلوں کے آکسائیڈز ایسیڈک (Acidic) ہوتے ہیں۔ بیسیک اور ایسیڈک آکسائیڈز دونوں کو بنانے کے لیے میٹلوں اور نان میٹلوں کو آکسیجن یا پھر ہوا میں گرم کیا جاتا ہے۔ میٹل آکسائیڈز آئینک کمپائونڈز ہیں جن کے بننے کے دوران الیکٹرانز میٹلوں سے آکسیجن کی طرف ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ نان میٹل آکسائیڈز کوویلنٹ کمپائونڈز ہیں اور ان کے بننے کے دوران نان میٹلوں اور آکسیجن کے درمیان الیکٹرانز بانٹے جاتے ہیں۔





i۔ بیسیک آکسائیڈز (Basic Oxides)

آکسیجن جب میٹلوں سے ری ایکشن کرتی ہے تو جو آکسائیڈز بنتے ہیں ان کو پانی میں حل کرنے سے ہائیڈرو آکسائیڈز وجود میں آتے ہیں۔ یہ ہائیڈرو آکسائیڈز سرخ لٹمس کو نیلا کر دیتے ہیں اور جب ان کا ری ایکشن ایسڈ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ سائنس بناتے ہیں۔




ii۔ ایسیڈک آکسائیڈز (Acidic Oxides)

آکسیجن جب نان میٹلوں (S, C, N) کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہے تو ایسیڈک آکسائیڈز بنتے ہیں۔ یہ آکسائیڈز پانی کے ساتھ ری ایکشن کر کے ایسڈ بناتے ہیں جو نیلے لٹمس کو سرخ کر دیتے ہیں۔





ایسٹک آکسائیڈز جب بیس سے ری ایکشن کرتے ہیں تو سولس بنتے ہیں۔



iii- نیوٹرل آکسائیڈز (Neutral Oxides)

نیوٹرل آکسائیڈز ان آکسائیڈز کو کہتے ہیں جو پانی کے ساتھ مل کر نہ ایسڈ اور نہ ہی بیس بناتے ہیں۔ پانی میں ان کے سولوشن نیلے اور سرخ لٹمس دونوں پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ کاربن مونو آکسائیڈ (CO) نائٹروک آکسائیڈ (NO) اور نائٹروس آکسائیڈ (N₂O) نیوٹرل آکسائیڈز کی مثالیں ہیں۔

iv- ایفوفٹریک آکسائیڈز (Amphoteric Oxides)

ایفوفٹریک آکسائیڈز اس وقت بنتے ہیں جب ایسی میٹلو آکسائیڈز سے ری ایکشن کرتی ہیں جو کم الیکٹرو پوزیٹو




یہ آکسائیڈز بطور ایسڈ اور بیس دونوں طرح کے خواص رکھتے ہیں۔ زنک آکسائیڈ اور آلومینیم آکسائیڈ ایسڈ کی موجودگی میں بیس کے خواص ظاہر کرتے ہیں۔



دلچسپ معلومات

پانی ایک ایفوفٹریک شے ہے۔ یہ ایسڈ اور بیس دونوں طرح کے خواص ظاہر کرتا ہے اور ان خواص کا اظہار اس شے پر جس سے یہ ری ایکشن کرے۔

یہی آکسائیڈز الکلیز کی موجودگی میں ایسڈز کے خواص ظاہر کرتے ہیں۔



یہ آکسائیڈز پانی میں نائل پذیر ہیں اور لٹمس پیپر پر ان کو کوئی

اثر نہیں ہوتا۔

18.3 غوری جانچ

- 1- لیڈ آکسائیڈ کو ایفوفٹریک آکسائیڈ کیوں کہتے ہیں؟
- 2- نان میٹلو آکسائیڈز سے ری ایکشن کر کے کوویٹ آکسائیڈز کیوں بناتی ہیں؟

18.4 میٹلو (Metals)

جیریاڈک ٹیبل میں موجود تقریباً تین چوتھائی عناصر میٹلو ہیں۔ میٹلو بہت ہی اہم خواص کی حامل ہیں۔ میٹلو زمین کی کرسٹ (Earth Crust) میں بطور آکسائیڈز، ہائیڈرو آکسائیڈز، کاربائیڈز اور سلفائیڈز وغیرہ کے موجود ہوتی ہیں۔ میٹلو کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے میں موجود الیکٹرانز کو کھو کر کیٹائنز (Cations) بنائیں۔ عام طور پر میٹلو دوسرے عناصر کے ساتھ آئوک بانڈز بناتی ہیں۔






ٹھنڈے پانی کے ساتھ میٹلوں کے ری ایکشنز (Reactions of Metals with Cold Water)

دلچسپ معلومات

اگر خلا میں ایک میٹل کے دو ٹکڑوں جن پر کسی قسم کی تہ نہ جچی ہو، ملا یا جائے تو مستقل طور پر ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ ایسا زمین پر ممکن نہیں کیونکہ زمین کی ہوا کی وجہ سے ان ٹکڑوں کی سطحوں پر آکسائیڈ کی تہ جم جاتی ہے جو کہ ان کو جڑنے سے روکتی ہے۔

بہر یا ڈک ٹیبل کے پہلے اور دوسرے گروپ میں موجود عناصر ٹھنڈے پانی کے ساتھ تیزی سے ری ایکشن کر کے اپنے ہائیڈروآکسائیڈز بناتے ہیں اور ہائیڈروجن گیس خارج کرتے ہیں۔



مگنیشیم تاہم ٹھنڈے پانی سے ری ایکشن کر کے آہستہ آہستہ مگنیشیم ہائیڈروآکسائیڈ اور ہائیڈروجن گیس بناتی ہے۔



میٹلوں کے ساتھ سٹیم کے ری ایکشنز (Reactions of metals with steam)

ایک میٹل جتنی زیادہ ری ایکٹیو (Reactive) ہوگی اتنا ہی تیزی سے سٹیم کے ساتھ ری ایکشن کرے گی۔ ری ایکٹیو میٹلوں مثلاً لیتھیم، سوڈیم، پوٹاشیم اور کالمیم نہایت خطرناک طریقے سے سٹیم کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہیں۔ بیریلیم اور ایلومینیم سٹیم کے ساتھ زیادہ ٹھنڈے پانی (700°C کے لگ بھگ) پر ری ایکشن کر کے اپنے اپنے آکسائیڈز بناتی ہیں اور ہائیڈروجن خارج کرتی ہیں۔





مگنیشیم، آئرن اور زنک سٹیم سے دھیمے انداز میں ری ایکشن کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے اپنے آکسائیڈز کے ساتھ ہائیڈروجن خارج کرتی ہیں۔



آکسیجن کے ساتھ میٹلوں کے ری ایکشنز (Reactions of metals with oxygen)


میٹلوں آکسیجن کے ساتھ ری ایکشن کر کے میٹل آکسائیڈز بناتی ہیں۔ یہ ری ایکشن کتنی آسانی سے وقوع پذیر ہوتا ہے اس کا انحصار میٹل کی ری ایکٹیوٹی (Reactivity) اور حالات پر ہے۔

سوڈیم ہوا میں زرد شعلے سے جلتی ہے اور سوڈیم آکسائیڈ اور سوڈیم پیر آکسائیڈ بناتی ہے۔





میکینیم، سٹرانٹیم (Strontium) اور بیریم ہوائیں اپنے اپنے مخصوص رنگوں کے ساتھ جلتی ہیں اور اپنے اپنے آکسائیڈز بناتی ہیں۔



شعلے کا رنگ	میل
تیز سفید رنگ	میکینیم
سفید شعلہ جس میں سرخ رنگ کی آمیزش	کلیئم
گہرا سرخ رنگ	سٹرانٹیم
ذری مائل ہبز رنگ	بیریم



فعل (18.3) سٹرانٹیم کا شعلہ

فعل (18.4) بیریم کا شعلہ

ڈائیلیٹس ایسڈ کے ساتھ میٹلوں کے ری ایکشنز (Reactions of metals with dilute acids)

میل جتنی زیادہ ری ایکٹیو ہوگی اتنی ہی تیزی کے ساتھ یہ ڈائیلیٹس ایسڈ سے ری ایکشن کرے گی۔ سوڈیم اور پوٹاشیم بڑی تیزی اور خطرناک طریقے سے ڈائیلیٹس ایسڈ کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہیں اور اپنے اپنے سائنس بناتی ہیں اور ہائیڈروجن گیس خارج کرتی ہیں۔



غوری جانچ 18.4

1- حیرم اور پانی کے درمیان ہونے والے ری ایکشن کی مساوات لکھیں۔

2- ایلمینیم اور زنک پانی کے ساتھ کیسے ری ایکشن کرتے ہیں۔

ہیریاڈک نمیل میں موجود دوسرے گروپ کے عناصر بھی ڈائیلیٹس ایسڈ کے ساتھ ری ایکشن کر کے سائنس بناتے ہیں۔ تاہم میکینیم میل ہائیڈروجن آکسائیڈ کو ریڈیوس کر کے ہائیڈروجن گیس بناتی ہے۔ اس گروپ میں جیسے جیسے ہم نیچے موجود عناصر کی طرف آتے ہیں تو یہ ری ایکشن اتنا ہی تیز ہوتا جاتا ہے۔



18.5 فضائی آلودگی پھیلانے میں نائٹروجن کے آکسائیڈز کا کردار

(Role of oxides of nitrogen in spreading air pollution)

فضا میں موجود بنیادی آلودگی پھیلانے والی اشیاء میں نائٹروجن، سلفر اور کاربن کے آکسائیڈز کے علاوہ بعض ہائیڈروکاربنز بھی شامل ہیں۔ بنیادی آلودگی پھیلانے والی یہ اشیاء پھر دوسرے درجے کی آلودگی کا باعث بننا شروع ہو جاتی ہیں اور ایسا فضا میں وقوع پذیر ری ایکشنز






دلچسپ معلومات

فضائی آلودگی سالانہ 7 سے 8 ملین اموات کا باعث بنتی ہے جو کہ بچوں کی صحت کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔

کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ دوسرے درجے کی آلودگی پھیلانے والی ان اشیاء میں اوزون (Ozone)، پراکسی ایسیٹائل نائٹریٹ (Peroxyacetyl nitrate PAN) اور سلفیورک ایسڈ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سارے کمپائونڈز نہ صرف کے ذریعے ہیں بلکہ فضا میں ان کے ارتکاز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔

نائٹروجن کے آکسائیڈز جن کی فضا میں موجودگی خطرناک ہے ان میں NO اور NO₂ شامل ہیں۔ مجموعی طور پر ان آکسائیڈز کو NO_x سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نائٹروجن کے یہ آکسائیڈز قدرتی اور انسانی دونوں ذرائع سے فضا میں داخل ہوتے ہیں۔ نائٹروجن کے آکسائیڈز بنانے کے قدرتی ذرائع میں بادلوں کی گرج چمک شامل ہے۔ بجلی کی اس کڑک کی وجہ سے فضا میں موجود نائٹروجن اور آکسیجن ری ایکشن کر کے نائٹریک آکسائیڈ بناتی ہیں جو کہ بننے کے فوراً بعد آکسیجن کی مدد سے نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔




فضا میں نائٹروجن کے آکسائیڈز داخل کرنے کے اضافی ذرائع میں گاڑیوں میں فوسل ایندھن کا جلنا، بعض صنعتی ذرائع اور بجلی بنانے والے پاور پلانٹس شامل ہیں۔ ان ذرائع کے علاوہ کھیتی باڑی سے منسلک بعض سرگرمیاں اور فصلوں میں کھادوں کا استعمال بھی ہوا میں نائٹروجن کے آکسائیڈز شامل کرنے کا موجب ہو سکتے ہیں۔ صبح اور شام کے اوقات میں ٹریفک کا جھوم اور بعض صنعتی سرگرمیاں فضا میں نائٹروجن کے آکسائیڈز کی مقدار بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ یہ عموماً انسانی سے بخارات میں تبدیل ہونے والے آرگینک کمپائونڈز یعنی وولٹائل آرگینک کمپائونڈز (Volatile Organic Compounds VOCs) بھی ہوا میں شامل کرتے ہیں۔

سورج سے آنے والی بالائے بنفشی شعاعیں (Ultraviolet Radiation) جب نائٹروجن کے آکسائیڈز اور VOCs سے ملتی ہیں تو بہت پیچیدہ ری ایکشنز کی بدولت ثانوی آلودگی والے عناصر تشکیل پاتے ہیں ان میں اوزون، ایلمڈی ہائیڈرائڈ (Aldehydes) اور PAN شامل ہیں۔

نائٹروجن کے آکسائیڈز ایک ثانوی آلودگی کا موجب بھی بنتے ہیں اس آلودگی کو ایسڈ رین (Acid Rain) کہتے ہیں۔ نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ (NO₂) پانی اور فضا میں موجود دوسرے کیمیکلز سے ری ایکشن کر کے نائٹریک ایسڈ اور نائٹریس (Nitrous) ایسڈ کے بخارات بناتے ہیں۔

ایسڈز کے یہ بخارات پھر پانی کے بخارات سے مل کر زمین پر ایسڈ رین کی شکل میں گرتے ہیں۔ نائٹروجن کے آکسائیڈز فضا میں موجود ایک اور آلودہ شے سلفر ڈائی آکسائیڈ کو سلفیورک ایسڈ میں تبدیل کرنے کے لیے کیپالسٹ کا رول بھی ادا کرتے ہیں۔ سلفیورک ایسڈ، ایسڈ رین ہی کا ایک جزو ہے۔

- 1- انسانی صحت پر نائٹروجن کے آکسائیڈز کے معر اثرات کون سے ہیں؟
- 2- نائٹروجن کے آکسائیڈز فضا کو کیسے آلودہ کرتے ہیں؟





ایسڈرین کی pH 5.6 سے تھوڑی کم ہوتی ہے۔ ایسڈرین ہمارے ماحولیاتی نظام (Ecosystem) کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ نہ صرف کہ مادی اشیا کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے بلکہ اس سے جانداروں کو سانس کی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔

مشق

A کثیر الانتخابی سوالات:

صحیح جواب پر (✓) کریں۔

- (i) امونیا کی پیداوار کے لیے ری ایکشن کا درجہ حرارت زیادہ رکھنے کی وجہ ہے:
- (الف) ری ایکشن کی ایکٹیویشن انرجی بہت زیادہ ہے۔ (ب) ری ایکشن کی ایکٹیویشن انرجی بہت کم ہے۔
(ج) نائٹروجن اور ہائیڈروجن دونوں گیس ہیں۔ (د) کم درجہ حرارت پر نائٹروجن اور ہائیڈروجن مائع میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔
- (ii) H_2SO_4 کی صنعتی پیداوار کے لیے استعمال ہونے والا کونٹیکٹ پراسس SO_2 اور O_2 میں موجود کثافتوں کے لیے حساس ہے کیونکہ کثافتیں:
- (الف) کپالائٹ کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں۔ (ب) H_2SO_4 کے خالص پن کو متاثر کرتی ہیں۔
(ج) SO_2 کا آکسیجن کے ساتھ ری ایکشن نہیں ہونے دیتیں۔ (د) ری ایکشن کے ریٹ کو قابل ذکر حد تک کم کر دیتی ہیں۔
- (iii) کونسا آکسائیڈ نیوزل ہونے کی خصوصیات رکھتا ہے؟
- (الف) Al_2O_3 (ب) SO_2 (ج) CO_2 (د) NO
- (iv) فضائیں موجود ثانوی (Secondary) آلودہ ذرات کون سے ہیں؟
- (الف) نائٹروجن کے آکسائیڈز (ب) سلفر کے آکسائیڈز
(ج) اوزون اور پی اے این (PAN) (د) کاربن کے آکسائیڈز
- (v) سلفیورک ایسڈ کی تیاری کے دوران SO_2 پانی کے بجائے H_2SO_4 میں جذب کی جاتی ہے۔ کیونکہ:
- (الف) SO_2 پانی کے ساتھ ری ایکشن نہیں کرتی۔
(ب) SO_2 کا پانی کے ساتھ ری ایکشن بہت زیادہ ایکسوٹرمک ہوتا ہے۔ جس سے سلفیورک ایسڈ ایک دھند کی مانند پیدا ہوتا ہے جسے کنڈینس (Condense) کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
(ج) یہ H_2SO_4 کی بہتر پیداوار فراہم کرتی ہے۔
(د) SO_2 کا پانی کے ساتھ ری ایکشن دھماکے کا سبب بن سکتا ہے۔
- (vi) کون سے آکسائیڈز بنتے ہیں جب آکسیجن دھاتوں کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہے؟
- (الف) ایسڈک (ب) بیسک (ج) غیر جانبدار (د) بیسک اور ایسڈک دونوں
- (vii) ایسڈرین (Acid Rain) کے اہم اجزاء ہیں:
- (الف) H_2SO_4 اور HNO_3 (ب) H_2SO_3 اور HNO_2 (ج) HCl اور H_2SO_4 (د) ایسڈک ایسڈ اور HNO_3





B مختصر جوابی سوالات:

- 18.1 نائٹروجن ہوا سے کیسے حاصل کی جاتی ہے؟
- 18.2 ہائڈروجن میتھین سے کیسے بنائی جاتی ہے؟
- 18.3 SO_2 کو SO_3 میں آکسائیڈ ایز کرنے کے لیے کون سی کنڈیشن مطلوب ہوتی ہیں؟
- 18.4 CO_2 کو ایسڈک آکسائیڈ جبکہ CO کو نیوٹرل آکسائیڈ کیوں کہا جاتا ہے؟
- 18.5 نائٹروجن کے آکسائیڈز سے کون سے ثانوی آلودہ ذرات پیدا ہوتے ہیں؟

C تعمیری فکر پر مبنی سوالات:

- 18.1 امونیا کو ایک اہم کیمیائی کیوں سمجھا جاتا ہے؟
- 18.2 ہوا میں موجود SO_2 کیسے SO_3 میں تبدیل ہوتی ہے؟
- 18.3 کار کے انجن میں فوسل فیولز کا جلنا نائٹروجن کے آکسائیڈز بناتا ہے۔ وضاحت کریں۔
- 18.4 فوسل فیولز SO_2 کیسے پیدا کرتے ہیں؟

D تفصیلی سوالات:

- 18.1 صنعتی پیمانے پر امونیا کی تیاری کی وضاحت کریں۔
- 18.2 سلفیورک ایسڈ کی پیداوار کے لیے کونٹیکٹ پراسس کا تفصیلی جائزہ دیں۔
- 18.3 ایسڈک اور بیسک آکسائیڈز کی تشکیل اور خصوصیات کی وضاحت کریں۔
- 18.4 تیزابی بارش اور پی اے این (PAN) کی تشکیل ہیں نائٹروجن کے آکسائیڈز کے کردار کی وضاحت کریں۔



اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ:

- خشک کارسلفیٹ استعمال کرتے ہوئے پانی کی موجودگی کے لیے کیمیکل ٹیسٹ کی چھان بین کریں۔
- میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ کی مدد سے پانی کے خالص پن کو کیسے معلوم کیا جاتا ہے۔
- کشید کیا گیا پانی اور نلکے میں آنے والے پانی میں کیا فرق ہے اور ان کے کیمسٹری میں استعمال کا جائزہ لیں۔
- بیان کریں کہ قدرتی ذرائع سے حاصل ہونے والے پانی میں مفید اور نقصان دہ مادے ہو سکتے ہیں۔ جن میں کچھ مثالیں درج ذیل ہیں:
 - (الف) حل شدہ آکسیجن
 - (ب) دھاتی کمپاؤنڈز
 - (ج) پلاسٹکس
 - (د) فضلہ
 - (ه) نقصان دہ جراثیم
 - (و) کھادوں سے حاصل ہونے والے نائٹریٹس
 - (س) کھادوں اور صابن سے حاصل ہونے والے فاسفیٹس
- اس بات کی وضاحت کریں کہ پانی میں قدرتی طور پر پائے جانے والے کچھ مادے ممکنہ طور پر نقصان دہ ہو سکتے ہیں جن میں سے کچھ مثالیں درج ذیل ہیں:
 - (الف) کچھ دھاتی کمپاؤنڈز جو زہریلے ہوتے ہیں۔
 - (ب) کچھ پلاسٹکس جو آبی حیات کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔
 - (ج) فضلہ جو نقصان دہ جراثیموں پر مشتمل ہوتا ہے جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔
 - (د) نائٹریٹس اور فاسفیٹس جو پانی میں سے آکسیجن نکال لیتے ہیں اور آبی حیات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ (یوٹروفیکیشن پراسس کی تفصیل کی ضرورت نہیں)
- گھریلو وافر سٹائی کے ٹریٹمنٹ (Treatment) کی وضاحت کریں۔ اس میں درج ذیل مثالیں شامل ہیں:
 - (الف) سالڈز کو دور کرنے کے لیے سیڈی میٹیشن اور فلٹریشن
 - (ب) ڈائلٹنڈ اور بو کو دور کرنے کے لیے کاربن کا استعمال
 - (ج) جراثیموں کو تلف کرنے کے لیے کلوری نیشن کرنا
- پانی سے پیدا ہونے والی مختلف بیماریاں اور ان سے بچاؤ کے اقدامات بیان کریں۔
- آلودہ پانی کے زندگی پر منفی اثرات اور بچاؤ کے طریقے بیان کریں۔
- یوریا، امونیم سلفٹ اور نائٹریٹس کھاد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، وضاحت کریں۔
- پودوں کی بھرتوشو وٹا کے لیے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم کے متوازن فراہم کرنے کے لیے این پی کے (NPK) کھادوں کے استعمال کی وضاحت کریں۔

19.1 پانی (Water)

اس دنیا میں ہر قسم کے جاندار کے لیے پانی ایک ضروری شے ہے۔ تمام جانداروں کے جسموں میں وافر مقدار میں پانی موجود ہوتا ہے۔ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے انہیں ہر روز پانی کی ضرورت بھی ہے۔ بہت سے کیمیکل ری ایکشنز کے تجزیہ کے لیے اور بہت سی اشیاء کے خالص پن کو چیک کرنے کے لیے خالص پانی کی ضرورت ہے اس سلسلے میں خالص پانی کو شناخت کرنا ایک اہم قدم ہے۔



پانی کے لیے ٹیسٹ (Test of Water)



فصل (19.1) پانی کا ٹیسٹ

خوراک اور ادویات بنانے کی صنعتوں کے لیے صاف اور خالص پانی کا استعمال نہایت ضروری ہے کیونکہ اس سے ان تیار کی گئی اشیاء کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے اور ان کے محفوظ استعمال پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر پانی کے خالص پن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔

ہائڈریٹڈ کاپر (II) سلفیٹ ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) نیلے رنگ کا ایک کپاؤنڈ ہے لیکن جب اسے خاصا گرم کیا جائے تو یہ کپاؤنڈ اپنے پانی کے مالکیوں کو کھو کر بے رنگ ہو جاتا ہے۔ پانی کے بغیر ملنے والے اس کپاؤنڈ کو این ہائڈریٹس (Anhydrous) کا پر سلفیٹ کہتے ہیں۔ اگر اس این ہائڈریٹس کپاؤنڈ پر پانی کا قطرہ ڈالا جائے تو یہ فوراً سفید رنگ سے نیلا ہو جاتا ہے شکل (19.1)۔



یہ بڑا حساس ٹیسٹ ہے اور اگر پانی کی مقدار بہت کم بھی ہو تو بھی یہ ٹیسٹ اُس کی شناخت کر لیتا ہے۔

19.2 پانی کا خالص پن (Purity of Water)

خالص پانی معیاری ٹمپرچر اور پریشر پر 100°C پر ابلتا ہے جبکہ 0°C پر منجمد ہو جاتا ہے۔ اگر پانی میں کثافتیں موجود ہوں تو یہ دونوں فزیکل خواص تبدیل ہو جاتے ہیں۔

- 1- پانی کے خالص پن کو چیک کرنے کے لیے معیاری ٹمپرچر اور پریشر پر اس کا بوائلنگ پوائنٹ معلوم کیا جاتا ہے۔ اگر پانی کا کوئی سیمپل 100°C پر اُبلے تو وہ سیمپل خالص ہوگا۔ کثافتوں کی موجودگی میں پانی کا بوائلنگ پوائنٹ تھوڑا سا بڑھ جائے گا۔
- 2- پانی کے خالص پن کو چیک کرنے کا ایک اور ٹیسٹ کسی سیمپل کا میلنگ پوائنٹ معلوم کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے سیمپل کے پانی کو منجمد کر کے اس کا میلنگ پوائنٹ معلوم کیا جاتا ہے۔ اگر یہ 0°C پر پگھل جائے تو پانی خالص ہے جبکہ اگر اس کا میلنگ پوائنٹ 0°C سے کم ہو تو اس سیمپل میں کثافتیں موجود ہیں۔

- 3- پانی میں موجود کثافتیں اس کے بوائلنگ پوائنٹ کو بڑھا دیتی ہیں جبکہ اس کا میلنگ پوائنٹ کم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں خواص معیاری

19.1 فوری جانچ

فریڈنگ پوائنٹ کی مدد سے پانی کے خالص پن کو کیسے چیک کرتے ہیں۔

ٹمپرچر اور پریشر پر مخصوص دلیوز رکھتے ہیں۔ بلندی پر یا بیرونی پریشر کم ہونے سے یہ دلیوز تبدیل ہو جاتی ہیں۔

19.3 ڈسٹلڈ پانی اور عام نلکے سے حاصل ہونے والے پانی میں فرق

(Difference between Distilled Water and Tap Water)

ہمارے گھروں، دوکانوں یا دفتروں میں سپلائی ہونے والا پانی نلکوں کے ذریعے سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ پانی ہمیں زیر زمین ذخائر،

دریاؤں، جھیلوں اور تالابوں سے حاصل ہوتا ہے۔





فلکوں کے ذریعے حاصل ہونے والے پانی میں مختلف قسم کی معدنیات مثلاً کیلشیم اور میگنیشیم کے سائٹس موجود ہوتے ہیں اور ان معدنیات کی موجودگی کا انحصار ان کے ذخائر پر ہے۔ اس پانی میں کلورین اور فلورین کے سائٹس بھی ہوتے ہیں جو اس پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ حل شدہ معدنیات اور دوسرے آئنز کی موجودگی کی وجہ سے یہ پانی بجلی کا کنڈکٹر ہوتا ہے۔ اس کی pH کی حد 6.5 سے 8.5 تک ہے اور اس کا بھی انحصار اس کے ذخائر پر ہے جس سے یہ حاصل کیا جاتا ہے۔

ڈسٹیلیشن کے بعد حاصل کیا ہوا پانی ڈسٹیلڈ واٹر کہلاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پانی کو گرم کر کے بھاپ میں تبدیل کرتے ہیں اور پھر اس بھاپ کو ٹھنڈا کر کے دوبارہ پانی بنا لیتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے پانی میں موجود حل شدہ ساری کثافتیں، جراثیم اور آلودگی نکل جاتی ہیں اور صاف پانی حاصل ہوتا ہے۔

یہ صاف پانی لیبارٹریوں، میڈیکل سے متعلق طریقہ کار اور ادویات کی صنعتوں میں استعمال ہونے کے لیے بہترین ہے۔ اس کا صاف ہونا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کی مدد سے جو سائنسی پینا کٹیں، میڈیکل کے آلات کو جراثیم سے پاک کرنا اور اشیا کو زنگ سے بچانے جیسے کام احسن طریقہ سے سرانجام پائیں گے۔

فوری جانچ 19.2
تکے سے ملنے والا پانی بجلی کا کنڈکٹر ہوتا ہے جبکہ کشید شدہ پانی نان کنڈکٹر۔ ایسا کیوں ہے؟

کشید شدہ پانی میں صرف پانی کے مالکیولز موجود ہوتے ہیں جبکہ یہ پانی بیکٹیریا، آئنز، گیس اور آلودگی سے پاک ہوتا ہے۔ اس کی pH 7 ہوتی ہے۔ اگرچہ پینے کے لیے یہ محفوظ ہے لیکن اس میں انسانی جسم کے لیے ضروری معدنیات نہیں موجود ہوتیں۔ آئنز کی غیر موجودگی کی وجہ سے یہ پانی بجلی کا کنڈکٹر نہیں ہوتا ہے۔

19.4 قدرتی ذخائر سے حاصل کیے گئے پانی میں مختلف کمپاؤنڈز

(Substances Present in Water Obtained from Natural Sources)

قدرتی ذخائر مثلاً دریاؤں، جھیلیوں اور زیر زمین ذخائر سے حاصل کردہ پانی میں بہت سے کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مفید بھی ہوتے ہیں اور ضرر رساں بھی۔

پانی میں موجود مفید اشیا (Useful Substances)

حل شدہ آکسیجن (Dissolved Oxygen)

قدرتی پانی میں ہوا میں موجود آکسیجن ڈیفیوژن کے عمل کے ذریعہ داخل ہوتی ہے۔ یہ فوٹوسنتھیسز کے عمل کے دوران پانی میں اُگے پودوں اور اعلیٰ (Algae) کے ذریعے بھی پانی میں داخل ہوتی ہے۔ پانی میں موجود مختلف حشرات سانس لینے کے لیے اسی آکسیجن کو استعمال کر کے زندہ رہتے ہیں۔ ماحولیاتی نظام کی صحت اور تنوع کا انحصار پانی کے ذخیرہ میں حل شدہ اسی آکسیجن کی مقدار پر ہوتا ہے۔





پانی میں موجود نقصان دہ اشیاء اور پانی کی کوالٹی پر ان کے اثرات

(Harmful Substances and their Effects on the Quality of Water)

(i) نقصان دہ مائکروبز (Harmful Microbes)

مختلف انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے تازہ پانی کے اہم ذرائع جن میں زمین کی سطح پر اور اس کے اندر موجود پانی شامل ہیں آلودہ ہو جاتے ہیں۔ صنعتوں کا ضائع شدہ پانی، زرعی بہاؤ (Agricultural Runoff)، کچرے کے ڈھیر، انسانی اور جانوروں کے فضلہ جات جب قدرتی پانی کے ساتھ ملتے ہیں تو اس میں بیکٹریا، وائرس اور مختلف پیراسائٹس (Parasites) جیسے نقصان دہ حشرات شامل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ویسٹ وائرٹریٹس پلانٹس اور ناقص سیوریج سے نکلنے والا گندہ پانی قریب ہی موجود پانی کے ذخائر میں امراض پیدا کرنے والے جراثیم داخل کر دیتے ہیں۔ جراثیموں سے پھر کھجش، ٹائی فائڈ، یرقان اور ہیضہ جیسی متعدی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔

(ii) بھاری میٹلوں اور ان کے کمپاؤنڈز (Heavy Metals and their Compounds)

بھاری میٹلوں مثلاً لیڈ، مرکری، کیڈمیم اور کرومیم اور ان کے کمپاؤنڈز بہت سے ذرائع سے پانی میں شامل ہوتے ہیں۔ صنعتوں سے نکلنے والے گندے پانی میں یہ بھاری میٹلوں اور ان کے کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں اور جب یہ گندہ پانی دریاؤں یا دوسرے پانی کے ذخائر میں داخل ہوتا ہے تو یہ ساری گندگی ان میں شامل کر دیتا ہے اسی طرح کان کنی کی سرگرمیوں اور زراعت میں استعمال ہونے والی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے بھی سطح زمین اور اس کے اندر موجود پانی میں بھاری میٹلوں اور ان کے کمپاؤنڈز شامل ہو جاتے ہیں۔ پانی میں اگر بھاری میٹلوں اور ان کے کمپاؤنڈز موجود ہوں تو اس کے پینے سے انسانی جسم میں موجود اہم اعضاء مثلاً گردے اور جگر متاثر ہوتے ہیں اور ان سے مختلف قسم کے ذہنی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ پانی میں آرسینک اور کیڈمیم کی موجودگی سے مختلف قسم کے کینسرز (Cancers) ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔

(iii) پلاسٹکس (Plastics)

پلاسٹک کے بہت چھوٹے ذرات نہ صرف نلکے کے پانی میں بلکہ بوتلوں میں میہا کے جانے والے پانی میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ پلاسٹک کے یہ چھوٹے ذرات اُس وقت پانی کے ذخائر میں داخل ہوتے ہیں جب بارش کے پانی یا پھر گندے پانی میں موجود پلاسٹک کا کچرہ ان ذخائر سے ملتا ہے۔ پلاسٹک کے چھوٹے ذرات انسانی جسم میں موجود پیچھے پھڑوں اور خون میں بھی پائے گئے ہیں۔ ان ذرات سے انسان کا دفاعی سسٹم اور تولیدی نظام دونوں متاثر ہوتے ہیں۔

(iv) نائٹریٹس اور فاسفیٹس (Nitrates and Phosphates)

قدرتی پانی میں نائٹریٹس اور فاسفیٹس پہاڑوں کی توڑ پھوڑ کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ یہ انسانی سرگرمیوں مثلاً زراعت میں استعمال ہونے والی کھادوں، صفائی والے کیمیکلز اور صنعتوں کے گندے پانی کے ذریعے بھی پانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پودوں، جانداروں کو زندہ رکھنے کے لیے یہ اہم غذائی اجزاء ہیں۔ تاہم پانی میں کمپاؤنڈز کی مقدار زیادہ ہو جائے تو پانی کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے اور یہ یوٹروفیکیشن (Eutrophication) کا باعث بھی بنتے ہیں۔

یوٹروفیکیشن ایک ایسے عمل کا نام ہے جو کسی پانی کے ذخیرے میں اُس وقت شروع ہوتا ہے جب اس میں نائٹروجن اور فاسفورس جیسے






غذائی اجزاء کی مقدار بہت زیادہ ہوجاتی ہے۔ ان قدرتی اجزاء کی زیادہ مقدار کی وجہ سے اٹلی اور دوسرے پانی میں اُگنے والے پلانٹس کی بہتات ہوجاتی ہے۔ اٹلی اُگنے کی بہتات سے پانی میں جذب آکسیجن کی مقدار کم ہوجاتی ہے جس سے سمندری حیات کو نقصان پہنچتا ہے اور پورا ماحولیاتی نظام متاثر ہوتا ہے۔

19.5 گھروں میں سپلائی ہونے والے پانی کی صفائی

(Treatment of Domestic Water Supply)

قدرتی ذرائع سے حاصل کیے گئے پانی میں زیادہ تر تین قسم کی کثافتیں ہوتی ہیں۔

- 1- حل شدہ کثافتیں 2- معلق کثافتیں 3- جرثوے (Microorganisms)
- ان کثافتوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جن میں سیڈیمینٹیشن (Sedimentation)، فلٹریشن (Filtration)، عمل کشید اور مائع کلورین ملانا شامل ہیں۔



1- سیڈیمینٹیشن

قدرتی پانی میں نائل پذیر کثافتوں میں مٹی، پودوں کے ذرات، ریت اور دوسرے غیر نامیاتی مادے شامل ہیں۔ ان کثافتوں کے ذرات کا سائز بڑا ہوتا ہے اور ان کو اکثر سیڈیمینٹیشن کے عمل سے علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے قدرتی طور پر حاصل کیے گئے پانی کو مخصوص سیڈیمینٹیشن والے ٹینکس (Sedimentation Tanks) میں ڈالا جاتا ہے جہاں پانی کو چند گھنٹوں کے لیے کھڑا رکھتے ہیں شکل (19.2)۔

2- فلٹریشن

قدرتی پانی میں موجود چھوٹے ذرات جو سیڈیمینٹیشن سے باہر نہیں نکالے جاسکتے، ان کو فلٹریشن کے عمل سے نکالا جاتا ہے اس مقصد کے لیے پانی کو ریت کی تہہ میں سے اور بجری کی تہہ میں سے گزرا جاتا ہے۔ جس سے یہ ذرات انہی تہوں میں سے گزر کر علیحدہ ہوجاتے ہیں۔

یہ جاننا ضروری ہے۔



مختلف ذرائع سے حاصل کیے گئے پانی کو مختلف طریقوں سے صاف کیا جاتا ہے۔

3- کلوری نیشن (Chlorination)

استعمال کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ پانی کو جرثوموں سے پاک کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے سارے نقصان دہ جرثوے مثلاً بیکٹیریا اور مائیکروبز (Microbes) کو لازمی طور پر ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے زیادہ تر مائع کلورین پانی میں شامل کرتے ہیں جو کہ ان جرثوموں کو ختم کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔

4- پانی میں سے آنے والی بو ختم کرنا (Removal of Odours)

پانی میں سے آنے والی بو اور اس کا ممکن ذائقہ ختم کرنے کے لیے اس کو ایکٹیویٹڈ کاربن یعنی چارکول میں سے گزرا جاتا ہے جو بہت





سے غیر نامیاتی مادوں کو جذب کر لیتی ہے۔ انہی مادوں کی وجہ سے پانی میں سے بو آتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی وجود میں آتا ہے۔ پانی میں موجود بو کو ختم کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جسے ایئریشن (Aeration) کہتے ہیں اور اس طریقہ میں پانی اور ہوا کا ملاپ کیا جاتا ہے۔

19.6 پانی میں موجود آلودگی کے اثرات (Effects of Pollutants Present in Water)

پانی میں پانی جانے والی آلودگی سے انسانی صحت، ماحولیاتی نظام، پانی میں رہنے والی مخلوقات اور ایسی صنعتیں جن کے لیے صاف شفاف پانی کا استعمال بہت ضروری ہے سب متاثر ہوتے ہیں۔

آلودگی کے منفی اثرات کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے (How to Control the Negative Effects of Pollutants)

پانی میں موجود آلودگی نہ صرف آبائی ماحولیاتی نظام کو یوٹروفیکیشن کے عمل کے ذریعے متاثر کرتی ہے بلکہ جانوروں کے ممکن بھی تباہ کر دیتی ہے۔ فصلیں اگانے کے لیے اگر آلودہ پانی استعمال کیا جائے تو نہ صرف اُن کی پیداوار کم ہو جاتی ہے بلکہ یہ خوراک کے اجزا کو بھی آلودہ کر دیتی ہے۔

ذیل میں درج اقدامات اٹھانے سے پانی کی آلودگی پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

- 1- سیوریج اور صنعتوں سے نکلنے والے گندے پانی کو پانی کے ذخائر میں شامل کرنے سے پہلے اُس میں سے ساری آلودہ اشیاء کو نکالنا چاہیے۔
- 2- پلاسٹکس کی پیداوار کو کم از کم رکھنے کے لیے اس کو ری سائیکل (Recycle) کر کے بار بار استعمال کرنا چاہیے۔
- 3- صفائی کرنے والے کیمیکلز، چربی، مختلف قسم کے تیلوں اور گریس کو بھی گندے نالوں میں نہیں پھینکنا چاہیے۔
- 4- زراعت میں کیڑے مار دویات اور کھادوں کا کم سے کم استعمال کیا جائے۔
- 5- عوامی مہم چلا کر عام آدمی کو پانی کی آلودگی کے مضر اثرات کے بارے میں مطلع کرنا۔
- 6- پانی میں موجود آلودگی کو ختم کرنے کے لیے قوانین کا نفاذ اور اُن پر عمل درآمد کرنا۔

فوری جانچ 19.3

- 1- آلودگی کی کونسی شکل پانی میں موجود مخلوقات کے لیے ضرور ہلاک ہے۔
- 2- پانی میں موجود آلودگی کی شناخت کیسے کرتے ہیں۔

آلودہ پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں (Water-borne Diseases)

ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (WHO) نے اندازہ لگایا ہے کہ دنیا میں موجود 80 فیصد بیماریاں آلودہ پانی استعمال کرنے اور صفائی کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ پانی میں آلودگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں ہیضہ، ثانی فائبر، ملیریا، اٹلیاں آنا اور کوڑھ شامل ہیں۔ اس دنیا میں ہر سال 50 کروڑ لوگ آلودہ پانی استعمال کرنے کی وجہ سے ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لاکھوں لوگ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو اندھا کر دیتی ہے۔ اس بیماری کو ٹراکوما (Trachoma) کہتے ہیں اور یہ بیماری خاص طور پر ترقی پزیر ملکوں میں چھوٹے اور بڑے بچوں میں بہت عام ہے۔ جگر کی بیماریاں خاص طور پر وائرس سے پھیلنے والی رقان آلودہ پانی پینے سے ہی ہوتا ہے۔

آلودہ پانی کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام (Prevention of Water-borne Diseases)

- 1- آلودہ پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کو روکنے کے لیے ذیل میں درج ہدایات پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔
- 1- ہمیشہ صاف پانی پئیں جو گھٹاؤں سے پاک ہو۔ پانی کو اُبال کر پیئیں تاکہ اس میں موجود جراثیم مر جائیں۔





2- حفظانِ صحت کے اصول اپنائیں، خاص طور پر اپنے جسم اور ہاتھوں کو صاف رکھیں۔ صفائی ستھرائی کو ہر وقت یقینی بنائیں۔

19.7 پودوں کی نشوونما کے لیے ضروری اہم عناصر (Elements Essential for Plant Growth)

پودے صحت مند نشوونما کے لیے مٹی سے غذائی اجزاء جذب کرتے ہیں۔ ایسے اہم عناصر جو پودوں کی نشوونما کے لیے ضروری ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک حصے کو مائکرو نیوٹریٹس (Micro-nutrients) اور دوسرے کو میکرو نیوٹریٹس (Macro-nutrients) کہتے ہیں۔

مائکرو نیوٹریٹس (بہت کم مقدار میں اہم عناصر) (Micro-nutrients (Trace elements))

پودوں کی نشوونما کے لیے جو غذائی اجزاء بہت کم مقدار میں ضروری ہیں ان کو مائکرو نیوٹریٹس کہتے ہیں۔ ان میں بورون، کاپر، آئرن، مینگانیز، زنک، مولبڈینم (Molybdenum) اور کلورین شامل ہیں۔ ان اہم عناصر کی بہت ہی معمولی مقدار پودوں کی صحت مند نشوونما کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اگر یہ اہم عناصر زیادہ مقدار میں استعمال کریں تو پودوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ عام طور پر ان کی مقدار 6 گرام سے 200 گرام فی ایکڑ تک استعمال کی جاتی ہے۔

مائکرو نیوٹریٹس

پودوں کی نشوونما کے لیے یہ غذائی اجزاء زیادہ مقدار میں درکار ہیں ان اہم عناصر میں نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاشیم، میگنیشیم، کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن شامل ہیں۔ عام طور پر ان کی مقدار 5 کلوگرام سے 200 کلوگرام فی ایکڑ ہوتی ہے۔

19.8 کھادیں (Fertilizers)

کھادیں ایسے کپاؤنڈز ہیں جو زمین میں ضروری اہم عناصر کی کمی کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تاکہ پودے اچھی طرح اُگ سکیں۔ ان کھادوں میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم (NPK) کے کپاؤنڈز استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ کھادیں زمین کی زرخیزی بڑھاتی ہیں اور سابقہ فصلوں کی وجہ سے زمین میں جن کیمیکل اہم عناصر کی کمی ہو جاتی ہے اس کو پورا کرتی ہیں۔

اچھی کھاد کی ضروری خصوصیات (Essential Qualities of a Good Fertilizer)

پودوں کو درکار اہم عناصر کا ہر کپاؤنڈ بطور کھاد استعمال نہیں ہو سکتا۔ بطور کھاد استعمال ہونے کے لیے کپاؤنڈز میں درکار اہم عناصر ایسی صورت میں ہونے چاہیں جو پانی میں جلد حل ہو سکیں تاکہ پودے ان کو استعمال کر سکیں۔ بطور کھاد استعمال ہونے والے کپاؤنڈز کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین میں کچھ دیر برقرار رہ سکے اور جلد تحلیل نہ ہو۔ جبکہ اُس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب اُسے سنور کیا جائے تو ہوا میں سے پانی جذب نہ کرے اور نہ ہی وقت کے ساتھ سخت پتھر کی طرح ہو جائے۔

اچھی کھاد کے لیے درکار خواص

- 1- اس میں موجود غذائی اجزاء والے اہم عناصر پودوں کے لیے فوری فراہم ہونے چاہیں۔
- 2- اس کو پانی میں جلد حل ہونا چاہیے تاکہ زمین کے اندر جذب ہو سکے۔





- 3- پودوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہونا چاہیے۔
- 4- اس کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے۔
- 5- اس کو جلد تحلیل نہیں ہو جانا چاہیے تاکہ لمبے عرصے تک پودے کو فراہم ہوتا رہے۔
- 6- اس کو زمین کی pH نہیں تبدیل کرنی چاہیے۔
- 7- پانی سے یا بارش سے اس کو ایسی فارم میں تبدیل ہونا چاہیے جس کو پودا آسانی سے جذب کر سکے۔

19.9 کھادوں کی درجہ بندی (Classification of Fertilizers)

دلچسپ معلومات

بائیو فیرٹلائزرز (Biofertilizers) ماحول دوست کھادیں ہیں۔ پودے کی نشوونما کے لیے یہ زمین کو ضروری غذائی اجزاء اور مائکروبز (Microbes) فراہم کرتی ہیں۔ بائیو فیرٹلائزرز زمین کو صحت مند بناتی ہیں اور اس کی ساخت کی اصلاح کرتی ہیں۔ یہ حیاتی تنوع (Biodiversity) کو بڑھاتی ہیں اور پودوں کے لیے نقصان دہ کیمیکلز کو کم کرتی ہیں۔

کھادوں کی درجہ بندی اس بنیاد پر کی جاتی ہے کہ ان میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم میں سے کونسا ایلیمینٹ زمین کو مہیا کیا جاتا ہے۔ اس درجہ بندی سے ذیل میں درج کھادیں استعمال میں لائی جاتی ہیں۔

- 1- نائٹروجنس کھادیں (Nitrogenous fertilizer)
- 2- فاسفیک کھادیں (Phosphatic fertilizer)
- 3- پوٹاشیم کھادیں (Potassium fertilizer)

نائٹروجنس کھادیں (Nitrogenous fertilizer)

یہ کھادیں پودوں کو یا زمین کو نائٹروجن مہیا کرتی ہیں۔ نائٹروجنس کھادیں پودے کی نشوونما کے پہلے مرحلے کے لیے درکار ہیں اور ان سے پودے کے تنے اور پتوں کی نشوونما ہوتی ہے۔ یہ پروٹینز (Proteins) کا ایک اہم تجزیہ ہیں، پتوں کو سبز رنگ دیتی ہیں، پودوں کی کوالٹی کو بہتر کرتی ہیں اور ان سے حاصل ہونے والی شے کی مقدار کو بڑھاتی ہیں۔ نائٹروجن کھادوں کی چند مثالیں، امونیم سلفیٹ، کیمشیم سیاناماڈ (Calcium Cyanamide)، امونیم نائٹریٹ، امونیم کلورائیڈ اور یوریا ہیں۔

امونیم نائٹریٹ کھاد میں نائٹروجن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں نائٹروجن تقریباً 46% ہے اور یہ کھاد نائٹروجن کا سب سے زیادہ ارتکاز رکھتی ہے۔ پاکستان میں یہ کھاد بہت زیادہ استعمال میں لائی جاتی ہے۔

یوریا کھاد فصلوں کے لیے مفید ہے سوائے چاول کی فصل کہ، کیونکہ اس فصل میں پانی کی زیادتی کی وجہ سے مائکروبیل بیکٹیریا (Microbial bacteria)، یوریا کو نائٹروجن گیس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کھاد کو چونے کے پتھر کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کھاد ہوا سے پانی جذب کرتی ہے۔

فاسفیک کھادیں (Phosphatic Fertilizers)

یہ کھادیں زمین کو یا پودوں کو فاسفورس فراہم کرتی ہیں۔ فاسفورس کھاد پودوں کی ابتدائی نشوونما میں بہتری لاتی ہے اور نشوونما کے آخری





مرحل میں بیج اور پھل بننے کے عمل کو تیز کرتی ہے۔ بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے معاونت کرتی ہے۔ فاسفورس رکھنے والی مختلف کھادوں کے اجزائے ترکیبی مختلف ہونے کی وجہ سے پانی میں ان کی حل پذیری بھی مختلف ہوتی ہے۔ سپر فاسفیٹ، کیلشیم سپر فاسفیٹ $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ اور ٹریپل فاسفیٹ (ڈائی امونیئم فاسفیٹ $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$) پانی میں حل ہو جاتی ہیں اور یہ فاسفورس مہیا کرنے والی سب سے اچھی کھادیں ہیں۔

پوٹاشیم کھادیں (Potassium Fertilizers)

یہ کھادیں زمین کو یا پودوں کو پوٹاشیم مہیا کرتی ہیں۔ پودوں میں سٹارچ، شوگر اور ریشے والے مادے بنانے کے لیے پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کھادیں صحت مند جڑیں بنا کر پودوں کو مضبوط کرتی ہیں اور انہیں بیماریوں سے لڑنے کے قابل بناتی ہیں۔ یہ کھادیں مختلف قسم کے اناج، پھل اور بیج پکانے میں مددگار ہیں۔ پوٹاشیم کھادیں تمباکو، کافی، آلو اور مکی کی فصلوں کے لیے خاص طور پر بہت مددگار ہیں۔ پوٹاشیم کلورائیڈ، پوٹاشیم سلفیٹ اور پوٹاشیم نائٹریٹ، پوٹاشیم کھادوں کی اہم مثالیں ہیں۔

19.4 فوری جانچ

1۔ ایسی کون سی کھاد ہے جس میں نائٹروجن کا ارتکاز سب سے زیادہ ہوتا ہے۔

مشق

A کثیر الانتخابی سوالات:

صحیح جواب پر (✓) کریں۔

- (i) ڈسٹلڈ پانی کی pH ہوتی ہے:
 - (الف) 6.5 (ب) 7.0 (ج) 8.5 (د) 7.5
- (ii) پانی میں ناخشوار بدبو کو دور کیا جاسکتا ہے:
 - (الف) کلورین کے ذریعے
 - (ب) ایکٹیویٹڈ چارکول کے ذریعے
 - (ج) سیڈیمیمینٹیشن (Sedimentation) کے ذریعے
 - (د) فیلٹریشن کے ذریعے
- (iii) قدرتی پانی میں نقصان دہ جراثیموں کے ذرائع ہیں:
 - (الف) انسانوں اور جانوروں کا فضلہ
 - (ب) کھیتوں میں استعمال ہونے والی کھادیں
 - (ج) صنعتوں سے خارج ہونے والا پانی
 - (د) چٹانوں میں موجود جراثیم
- (iv) فضا میں موجود کون سی گیسیں ڈیفیوژن کے ذریعے قدرتی پانی میں جذب ہوتی ہیں؟
 - (الف) CO_2 اور O_2 (ب) CO_2 اور N_2 (ج) N_2 اور O_2 (د) CO_2 اور N_2 , O_2
- (v) کھاد جو چاول کی فصل کے لیے نقصان دہ ہے:
 - (الف) سوپر فاسفیٹ (ب) امونیئم نائٹریٹ (ج) یوریا (د) پوٹاشیم سلفیٹ





(vi) وہ کھادیں جو پودوں کی بیماریوں کے خلاف مزاحمت کو بڑھاتی ہیں اور جڑوں کی صحت مند نشوونما سے پودوں کو مضبوط بناتی ہیں:

- (الف) نائٹروجن کی کھادیں
(ب) فاسفیٹ کی کھادیں
(ج) پوٹاشیم کی کھادیں
(د) میگنیشیم کی کھادیں

B مختصر جوابی سوالات:

- 19.1 پانی کے خالص پن کو جانچنے کے دو طریقوں کے نام لکھیں۔
19.2 تل کے پانی اور ڈسٹلڈ پانی میں بنیادی فرق کیا ہے؟
19.3 لیبارٹری میں پانی کیسے ڈسٹل کیا جاتا ہے؟
19.4 پانی میں موجود فائدہ مند اور نقصان دہ اجزاء کے نام بتائیں۔
19.5 پانی میں موجود نقصان دہ میکٹیر یا اور دیگر جراثیموں کو کیسے تلف کیا جاتا ہے؟
19.6 سیڈیم پھیٹیشن اور فلٹریشن میں کیا فرق ہے؟
19.7 پانی سے پیدا ہونے والی تین بیماریوں کے نام بتائیں۔
19.8 نائٹروجن عنصر والی کھادیں زمین میں کیوں ڈالی جاتی ہیں؟
19.9 ٹراکوما کون سی بیماری ہے؟

C تعمیری فکر پر مبنی سوالات:

- 19.1 روزمرہ زندگی میں پلاسٹکس کے استعمال کے منفی اثرات بیان کریں۔
19.2 پانی میں موجود حل شدہ کثافتوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ بتائیں۔
19.3 یوریا کو اچھی نائٹروجن کھاد کیوں سمجھا جاتا ہے؟

D تفصیلی سوالات:

- 19.1 گھروں میں مہیا کرنے والے پانی کو پینے کے قابل کیسے بنایا جاسکتا ہے؟
19.2 پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کون سے حفاظتی اقدامات کرنے چاہئیں؟
19.3 کھاد کسے کہتے ہیں؟ اچھی کھاد کی اہم خصوصیات کا ذکر کریں۔
19.4 نائٹروجن، فاسفیٹک اور پوٹاشیم کھادیں کیوں اہم ہیں؟
19.5 پانی میں موجود آلودگی کے منفی اثرات سے کیسے بچا جاسکتا ہے؟



آرگینک کیمسٹری

Organic Chemistry

حاصلاتِ تعلیم:

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ:

- آرگینک مالکیولز کو بطور سیدھی چین، براؤنچ چین یا سائیکلک (Cyclic) کے طور پر بیان کریں۔
- بیان کریں کہ سٹرکچرل فارمولا، مالکیول میں موجود ایٹمز کی ترتیب کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ بشمول درج ذیل مالکیولز:
 $CH_2=CH_2$, CH_3CH_2OH , CH_3COOCH_3
- مالکیولز کے سٹرکچرل فارمولا دکھیں اور سٹرکچرل فارمولا سے مالکیولز کی شناخت کریں۔
- ہومولوگس سیریز میں موجود مرکبات کے جنرل فارمولا کی تشریح کریں جن میں الکنز، الکیٹنز، الکائنز، الکوہلو اور کاربوکسلیک ایسڈز شامل ہیں۔
- سٹرکچرل آکسومرزم کی تعریف کریں اور بتائیں کہ یہ ایسے کیا وائز ہیں جن کے مالکیولر فارمولا ایک جیسے لیکن سٹرکچرل فارمولا مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں درج ذیل کیا وائز شامل ہیں:



- فنکشنل گروپ (Functional group) کی انٹرم یا ایٹمز کے گروپ کے طور پر شناخت کریں جو ایک ہومولوگس سیریز کی کیمیائی خصوصیات کا تعین کرتا ہے۔ ہومولوگس سیریز میں، الکوہلو، ایلڈز، امینز، کینیڈز، فینولز، کاربوکسلیک ایسڈز، امائڈز، امائڈز اور امائڈز شامل ہیں۔
- ہومولوگس سیریز کی درج ذیل عمومی خصوصیات تحریر کریں:
- (الف) ایک ہی فنکشنل گروپ کا ہونا۔
- (ب) ایک ہی جنرل فارمولا کا ہونا۔
- (ج) ایک سے دوسرے ذکن میں CH_2 گروپ کا فرق۔
- (د) طبعی خصوصیات میں ایک ہی رجحان کو ظاہر کرنا۔
- (ه) مشترکہ کیمیائی خصوصیات کا ہونا۔

- بیان کریں کہ سچو ریڈمرکب ایسے مالکیولز پر مشتمل ہوتا ہے جس میں تمام کاربن ایٹمز کے مابین سنگل بانڈز ہوتے ہیں۔
- بیان کریں کہ آن سچو ریڈمرکب ایسے مالکیولز پر مشتمل ہوتا ہے جس میں کاربن ایٹمز کے درمیان ایک یا ایک سے زیادہ سنگل بانڈز نہیں ہوتے۔
- آن براؤنچ الکنز (Alkanes)، الکیٹنز (Alkenes)، الکوہلو اور کاربوکسلیک ایسڈز کے نام اور فارمولا تحریر کریں۔ بشمول:
- نیوٹ-1، این، نیوٹ-2، این، پروپین-1، اول، پروپین-2، اول، نیوٹین-1، اول، نیوٹین-2، اول
- ایسے کیمیائی ناموں کے ساتھ موجود مرکب کی قسم بتائیں جس کا اختتام این-ایٹین، آئن، اول، یا ایک ایسڈ پر ہوتا ہے یا پھر دیے گئے مالکیولر فارمولا، سٹرکچرل فارمولا یا ڈسپلےڈ (displayed) فارمولا کی مدد سے مرکب کی قسم بتائیں۔
- آن براؤنچ الکوہلو اور کاربوکسلیک ایسڈز سے بننے والے آن براؤنچ الکیٹنز کے نام بتائیں اور ان کے ظاہری فارمولا دکھیں۔ ایسے الکیٹنز میں کاربن ایٹمز چار سے زیادہ نہیں ہونے چاہئیں۔



ایک آرگینک کپاؤنڈز میں بنیادی طور پر کاربن ایٹمز ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے اور دوسرے ایلیمنٹس سے کوویڈنٹ بانڈز کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ کاربن ایٹمز کے علاوہ، آرگینک کپاؤنڈز کی اکثریت میں ہائڈروجن بھی ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ آکسیجن، نائٹروجن، سلفر اور ہیلوجنز بھی ان کپاؤنڈز میں ہو سکتے ہیں۔ تاریخی طور پر اور روایتوں کے مطابق کچھ کاربن کے کپاؤنڈز ایسے ہیں جن کا مطالعہ ان آرگینک (Inorganic) کپاؤنڈز کی طرح کیا جاتا ہے۔ ان میں آکسائیڈز، کاربائیڈس اور ہائڈروجن کاربائیڈس وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح آرگینک کیمسٹری کی تعریف ہم اس طرح کریں گے کہ یہ کیمسٹری کی وہ برانچ ہے جس میں کاربن اور ہائڈروجن سے بنے کپاؤنڈز یعنی ہائڈروکاربنز اور ان سے حاصل کردہ کپاؤنڈز کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

20.1 آرگینک کپاؤنڈز کی درجہ بندی (Classification of Organic Compounds)

دلچسپ معلومات

آرگینک کیمسٹری مخصوص خواص کی حامل نئی مادی اشیا بنانے کے لیے مرکزی کردار ادا کرتی ہے مثال کے طور پر پلیمرز اور ادویات۔

آرگینک کپاؤنڈز کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم انفرادی طور پر ہر کپاؤنڈ کا مطالعہ کریں۔ اس لیے ان کے مطالعہ میں سہولت کے لیے آرگینک کپاؤنڈز کی درجہ بندی مختلف گروپس اور سب گروپس (Sub-groups) میں کی گئی ہے۔ ان کی درجہ بندی عمومی طور پر درج ذیل طریقے سے کی جاتی ہے۔


اوپن چین یا اے سائیکلک کپاؤنڈز (Open Chain or Acyclic Compounds)

کلوزڈ چین یا سائیکلک (یارنگ) کپاؤنڈز (Closed Chain or Cyclic (Ring) Compounds)


(i) اوپن چین یا اے سائیکلک کپاؤنڈز

اس قسم کے کپاؤنڈز میں کاربن ایٹمز ایک چین کی شکل میں منسلک ہوتے ہیں۔ یہ چینز بغیر انچز کے یا برا انچز والی دونوں طرح کی ممکن ہیں۔ ان اوپن چین کپاؤنڈز اور کچھ طرح کے رنگ کپاؤنڈز کو الیفیٹک (Aliphatic) کپاؤنڈز بھی کہتے ہیں۔


سیدھی چین والے یا بغیر برانچ کے کپاؤنڈز۔



برانچ والے کپاؤنڈز



2- میتھائل پروپین



2,2- ڈائی میتھائل پروپین

(ii) کلوزڈ چین والے یا کلوزڈ چین کپاؤنڈز

ان کپاؤنڈز میں ایک یا زیادہ کاربن ایٹمز کی کلوزڈ چین یا رنگز (Rings) ہوتے ہیں اس لیے ان کو کلوزڈ چین والے یا رنگ کپاؤنڈز

کہتے ہیں۔





اگر رنگ صرف کاربن ایٹمز سے مل کر بنا ہو تو اسے کاربو سائیکلک (Carbocyclic) کہاؤنڈز کہیں گے۔ تاہم اگر رنگ میں کاربن ایٹمز کے علاوہ دوسرے ایٹمز بھی شامل ہوں گے تو ان کو ہائٹرو سائیکلک (Heterocyclic) کہاؤنڈز کہیں گے۔

کاربو سائیکلک کہاؤنڈز کی ذیل میں درج مزید درجہ بندی کی گئی ہے۔

دلچسپ معلومات


کاربن ایٹم کی چار بانڈز بنانے کی صلاحیت لامحدود قسم کے مالکیول بناتی ہے جو آکریک کیمسٹری کو بہت مفید بناتی ہے۔

1۔ ایلک سائیکلک کہاؤنڈز (Alicyclic Compounds)

2۔ ایروہیکلک کہاؤنڈز (Aromatic Compounds)


(1) ایلک سائیکلک کہاؤنڈز (Alicyclic Compounds)

ایسے کاربو سائیکلک کہاؤنڈز جن میں رنگ تین یا زیادہ کاربن ایٹمز سے بنا ہو اور وہ ایلک فیکلک کہاؤنڈز سے مشابہت رکھتے ہوں ان کو ایلک سائیکلک کہاؤنڈز کا نام دیا گیا ہے۔ سپورینڈ ایلک سائیکلک کہاؤنڈز کا جنرل فارمولہ C_nH_{2n} ہے۔ چند مخصوص ایلک سائیکلک کہاؤنڈز درج ذیل ہیں۔



(2) ایروہیکلک کہاؤنڈز (Aromatic Compounds)

ایروہیکلک کہاؤنڈز بہت سی قسموں کے ہیں۔ ان میں سادہ ترین وہ ہیں جن میں ایک بینزین (Benzene) رنگ ہوتا ہے۔ بینزین رنگ چھ کاربن ایٹمز سے مل کر بنتا ہے جس میں متبادل سنگل اور ڈبل بانڈز (Alternate Single and Double Bonds) ہوتے ہیں۔ عام طور پر ان بانڈز کو ایک دائرے کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے رنگ کہاؤنڈز جن میں متبادل ڈبل بانڈز موجود ہوں وہ بھی ایروہیکلک کہاؤنڈز میں شامل کیے جاتے ہیں۔



20.1 فوری جانچ

- 1۔ سائیکلو ہیکسین (Cyclohexane) اور بینزین (Benzene) میں کیا فرق ہے؟
- 2۔ ایسے کہاؤنڈز کی دو مثالیں دیں جن میں کاربن کی جگہ میں براہی یا براہی ہوں۔





20.2 سٹرکچرل فارمولا (Structural Formula)

کسی کمپاؤنڈ کا سٹرکچرل فارمولا اُس میں موجود ایٹمز اور بانڈز میں پائے جانے والی ترتیب کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ فارمولا اس حد تک معلومات فراہم کرتا ہے کہ مالیکیول کی ساخت کا واضح طور پر پتہ چل جائے۔ عام روایت یہ ہے کہ جب مالیکیول میں موجود ایٹمز کی ترتیب ظاہر کی جائے تو سنگل بانڈز کو حذف کر دیتے ہیں اور صرف اہم بانڈز یعنی ڈبل اور ٹریپل بانڈز دکھائے جاتے ہیں۔ نیز ایک جیسے گروہس اور کچھ دوسرے گروہس کو بریکٹ میں ظاہر کرتے ہیں۔

سٹرکچرل فارمولا کو لکھنے کے کئی طریقے ہیں اور طلباء کو ان سب طریقوں کی پہچان ہونی چاہیے۔

ڈسپلےڈ فارمولا یا مکمل سٹرکچرل فارمولا (Displayed Formula or Full Structural Formula)

یہ فارمولا مالیکیول کی تفصیلی ترتیب ظاہر کرتا ہے جس میں ایٹمز کی نسبی پوزیشنز (Relative Positions)، ان کی تعداد اور ان کے درمیان پائے جانے والے بانڈز ظاہر کیے جاتے ہیں۔ ایٹمز کے درمیان موجود بانڈز کو چھوٹی لائنوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

کنڈینسڈ سٹرکچرل فارمولا (Condensed Structural Formula)

اس فارمولا میں بھی ایٹمز کے درمیان بانڈز کو لائنوں سے ظاہر کیا جاتا ہے لیکن کاربن-کاربن ہائڈروجن بانڈز کو حذف کر لیتے ہیں۔

مثیل 20.1 ڈسپلےڈ اور کنڈینسڈ سٹرکچرل فارمولا

کمپاؤنڈ	ڈسپلےڈ فارمولا	کنڈینسڈ سٹرکچرل فارمولا
ایٹھین (Ethane)	$ \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H} - \text{C} - \text{C} - \text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array} $	$\text{CH}_3 - \text{CH}_3$
ایٹھین (Ethene)	$ \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H} - \text{C} = \text{C} - \text{H} \end{array} $	$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$
ایٹھین (Ethyne)	$ \text{H} - \text{C} \equiv \text{C} - \text{H} $	$\text{HC} \equiv \text{CH}$
پروپین (Propane)	$ \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H} - \text{C} - \text{C} - \text{C} - \text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array} $	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
بوتین (Butane)	$ \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \text{H} - \text{C} - \text{C} - \text{C} - \text{C} - \text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array} $	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$





کٹینسڈ سٹرکچرل فارمولہ	ڈیپیکٹ فارمولہ	کمپاؤنڈ
$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	$\begin{array}{c} \text{H} & & \text{H} & \text{H} \\ & \diagdown & & \\ \text{C} = & \text{C} - & \text{C} - & \text{C} - \text{H} \\ & & & \\ & \text{H} & \text{H} & \text{H} \end{array}$	بیوٹ-1-این (But-1-ene)
$\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$	$\begin{array}{c} & & & \text{H} \\ & & & \\ \text{H} & \diagdown & \text{C} = & \text{C} - & \text{C} + \text{H} \\ & & & & \\ & \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \end{array}$	بیوٹ-2-این (But-2-ene)
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$	$\begin{array}{c} & \text{H} & \text{H} \\ & & \\ \text{H} - & \text{C} - & \text{C} - \text{O} - \text{H} \\ & & \\ & \text{H} & \text{H} \end{array}$	ایتھانول (Ethanol)
$\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{OH} \end{array}$	$\begin{array}{c} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & & \\ \text{H} - & \text{C} - & \text{C} - & \text{C} - \text{H} \\ & & & \\ & \text{O} & \text{H} & \text{H} \\ & \\ & \text{H} \end{array}$	پروپانول (Propanol)
$\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{OH} \end{array}$	$\begin{array}{c} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & & \\ \text{H} - & \text{C} - & \text{C} - & \text{C} - \text{H} \\ & & & \\ & \text{H} & \text{O} & \text{H} \\ & & \\ & & \text{H} \end{array}$	پروپین-2-اول (Propan-2-ol)
$\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{OH} \end{array}$	$\begin{array}{c} & \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & & & \\ \text{H} - & \text{C} - & \text{C} - & \text{C} - & \text{C} - \text{H} \\ & & & & \\ & \text{O} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & \\ & \text{H} \end{array}$	بیوٹانول (Butanol)
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{OH} \end{array}$	$\begin{array}{c} & \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & & & \\ \text{H} - & \text{C} - & \text{C} - & \text{C} - & \text{C} - \text{H} \\ & & & & \\ & \text{H} & \text{O} & \text{H} & \text{H} \\ & & \\ & & \text{H} \end{array}$	بیوٹین-2-اول (Butan-2-ol)
$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{OH} \end{array}$	$\begin{array}{c} & \text{H} & \text{O} \\ & & \\ \text{H} - & \text{C} - & \text{C} - \text{O} - \text{H} \\ & \\ & \text{H} \end{array}$	ایتھنوائک ایسڈ (Ethanoic acid)
$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C} - \text{OH} \end{array}$	$\begin{array}{c} & \text{H} & \text{H} & \text{O} \\ & & & \\ \text{H} - & \text{C} - & \text{C} - & \text{C} - \text{O} - \text{H} \\ & & \\ & \text{H} & \text{H} \end{array}$	پروپینوائک ایسڈ (Propanoic acid)
$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{O} - \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} & \text{H} & \text{O} & \text{H} \\ & & & \\ \text{H} - & \text{C} - & \text{C} - & \text{O} - & \text{C} - \text{H} \\ & & & \\ & \text{H} & & \text{H} \end{array}$	میٹھائل ایتھانوائٹ (Methyl ethanoate)





20.2 خوری جانچ

پینٹین-2-اول، متھائل پینٹانوائیٹ، ہیپٹ-2-این اور پینٹین (Pentane) کے ڈسپلڈ اور کنڈینسڈ سٹرکچرل فارمولہ لکھیں۔

20.3 ہومولوگس سیریز (Homologous Series)

آرگنک کمپاؤنڈز کی درجہ بندی بطور مختلف فیملیز بھی کی گئی ہے۔ ہر فیملی میں ملتے جلتے آرگنک کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں جن کی ساخت اور کیمیائی خواص میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ ان مختلف فیملیز کو ہومولوگس سیریز کہتے ہیں۔

ہومولوگس سیریز کے خواص (Characteristics of a Homologous Series)

ہومولوگس سیریز میں موجود اراکین کے مشترک خواص درج ذیل ہیں۔

- ایک ہومولوگس سیریز کے تمام اراکین کو ایک ہی جنرل فارمولا سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الکنز (Alkanes) جنہیں سچور ایٹڈ ہائڈروکاربنز (Saturated Hydrocarbons) بھی کہتے ہیں ان کو C_nH_{2n+2} کے جنرل فارمولا سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں n اس رکن میں موجود کاربن ایٹموں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض دوسرے اراکان کے جنرل فارمولا نیچے دیے گئے ہیں۔

ہومولوگس سیریز	جنرل فارمولا
الکنز (Alkenes)	C_nH_{2n}
الکائنز (Alkynes)	C_nH_{2n-2}
الکوحل (Alcohols)	$C_nH_{2n+1}OH$
کاربوکسیک ایسڈز (Carboxylic acids)	$C_nH_{2n+1}COOH$

20.3 خوری جانچ

- ایسے کاربوکسیک ایسڈ کا مالیکیولر فارمولا لکھیں جن میں تین کاربن ایٹمز موجود ہوں ($n = 3$)۔
- ایک ایسی الکول کا مالیکیولر فارمولا لکھیں جس میں چار کاربن ایٹمز موجود ہوں۔

- ایک ہومولوگس سیریز کے ہر رکن میں آپس میں CH_2 گروپ کا فرق ہوتا ہے اور اس طرح ان کے مالیکیولر ماس میں 14 یونٹس کا فرق ہوتا ہے۔
- ایک ہومولوگس سیریز کے ہر رکن میں ایک جیسا فنکشنل (Functional) گروپ ہوتا ہے۔ مثلاً کاربوکسیک ایسڈ سیریز میں ہر رکن کے پاس $COOH$ فنکشنل گروپ ہوگا۔
- ہومولوگس سیریز کے ہر رکن میں جب ایک ہی فنکشنل گروپ ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سب اراکان کے کیمیائی خواص ایک جیسے ہوں گے۔
- ہومولوگس سیریز کے اراکان کے طبعی خواص مثلاً میلنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ، ڈینسٹی اور حل پذیری مالیکیولر ماسز کے بڑھنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہیں۔
- ہومولوگس سیریز کے اراکان کو ملتے جلتے طریقوں سے بنایا جاسکتا ہے۔


20.4 آئسو میریزم (Isomerism)

ایسے کمپاؤنڈز جن کے مالیکیولر فارمولا ایک جیسے ہوں لیکن ان کے سٹرکچرل فارمولا اور خواص میں فرق ہو تو ان کو آئسومرز (Isomers) کہتے ہیں اور اس مظہر کو سٹرکچرل آئسو میریزم (Structural Isomerism) کا نام دیا گیا ہے۔





یوٹین (C_4H_{10} , Butane) ایک سادہ ترین ہائڈروکاربن ہے جس کے سٹرکچرل آئسومرز موجود ہیں۔ میتھین، اتھین اور پروپین ان سب کو ایک ہی سٹرکچرل فارمولا سے ظاہر کیا جاسکتا ہے اس لیے ان میں سٹرکچرل آئسومیریزم موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یوٹین یا اس سے بڑے ہائڈروکاربنز کے سٹرکچرل فارمولا کا مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ ان میں موجود ایٹمز کو ایک سے زیادہ طریقوں سے ترتیب دے سکتے ہیں اور ان سب طریقوں میں ان ایٹمز کی ویلنسیز (Valencies) بھی ایک جیسی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مالیکیولر فارمولا رکھنے والے کمپاؤنڈز میں موجود ایٹمز دو یا اس سے زیادہ طریقے سے ترتیب دیے جاسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوٹین مالیکیول میں موجود ایٹمز ذیل میں درج دو مختلف طریقوں سے ترتیب دیے جاسکتے ہیں۔




اس حقیقت کو تجربات کی مدد سے ثابت کیا گیا ہے کہ ایک مالیکیولر فارمولا یعنی C_4H_{10} رکھنے والے کمپاؤنڈز دو طرح کے ہیں ان کے فزیکل خواص بھی مختلف ہیں۔

جیسے جیسے سچورینڈ ہائڈروکاربن میں کاربن ایٹمز کی تعداد بڑھتی ہے اس کے ممکن آئسومرز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ پانچ کاربن رکھنے والی میتھین (Pentane) کے تین آئسومرز ہیں اور جب ہائڈروکاربن میں کاربن ایٹمز کی تعداد تیس تک پہنچتی ہے تو اس کمپاؤنڈ کے آئسومرز کی تعداد ارب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سٹرکچرل آئسومرز صرف سچورینڈ ہائڈروکاربنز میں ہی موجود نہیں ہیں بلکہ آرکیٹک کمپاؤنڈز کی ساری ہومولوگس سیریز اور ان سے حاصل کردہ کمپاؤنڈز میں سٹرکچرل آئسومرز موجود ہیں۔



20.5 فنکشنل گروپ (Functional Group)

فنکشنل گروپ ایک ایسا گروپ ہے جس میں موجود ایک ایٹم یا ایٹمز کا گروپ اُس آرکیٹک کمپاؤنڈ کے خواص کا تعین کرتا ہے۔ مثال کے طور پر الکوحل فیملی سے منسلک خواص کی وجہ اُن میں ہائڈروکسل (Hydroxyl) گروپ ($-OH$) کی موجودگی ہے۔ اس ہائڈروکسل گروپ کو فنکشنل گروپ کہتے ہیں۔





کچھ اہم فنکشنل گروپس کی تفصیل درج ذیل ہے۔


(a) ہائڈروکسل گروپ (Hydroxyl Group -OH)

یہ گروپ جس فیملی میں موجود ہوتا ہے اُن کو الکوحلو کہتے ہیں۔





آکریبی ہائیڈروکسل گروپ ہینزین (Benzene) رنگ سے منسلک ہوتا اس ہومولوگس سیریز کا نام فینولز (Phenols) ہوگا۔



(b) ایلڈی ہائیڈ گروپ (Aldehyde Group) $(-\text{C}(=\text{O})-\text{H})$

یہ گروپ آکریک کمپائونڈز کی ایک ایسی فیملی میں موجود ہے جس کو ایلڈی ہائیڈز (Aldehydes) کہتے ہیں۔





(c) کیٹون گروپ (Ketone Group) $(\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{R})$ where R is an alkyl group

جس ہومولوگس سیریز میں کیٹون فنکشنل گروپ موجود ہے اس کے ارکان کو کیٹونز (Ketones) کہتے ہیں۔



(d) کاربوکسل گروپ (Carboxyl Group) $(-\text{C}(=\text{O})-\text{OH})$




یہ گروپ کاربوکسلک ایسڈ ہومولوگس سیریز میں ہوتا ہے۔



(e) امائنو گروپ (Amino Group) $(-\text{NH}_2)$

یہ گروپ کمپائونڈز کی ایسی سیریز میں موجود ہے جن کو ایلی فٹک امینز (Aliphatic amines) یا ایرومیٹک

امینز (Aromatic amines) کہتے ہیں۔




ایلی فٹک امین (Aniline)





(f) امائیڈ گروپ (Amide Group)

یہ گروپ ایسڈ امائیڈ فیملی میں موجود ہے۔



(g) ایسٹر گروپ (Amide Group)

ایسٹر گروپ رکھنے والی فیملی کو کاربوکسیک ایسٹرز (Carboxylic Esters) کہتے ہیں۔

20.4 فوری جانچ

- 1- فینولز (Phenols) الکوحلو (Alcohols) سے کس طرح مختلف ہیں۔
- 2- ایلڈی ہائیڈ (Aldehyde) فنکشنل گروپ اور کیٹون (Ketone) فنکشنل گروپ میں کون سی بات مشترک ہے۔



(Ethyl ethanoate or Ethyl acetate)



(Methyl ethanoate or Methyl acetate)

20.6 آرگینک کمپائونڈز کے نام (Naming Organic Compounds)

پیشہ 20.2: IUPAC سسٹم کے مطابق روٹس کے نام

روٹ کا نام	کاربن ایسٹھائیٹ تعداد
میٹھ (Meth-)	1
ایٹھ (Eth-)	2
پروپ (Prop-)	3
بیوٹ (But-)	4
پینٹ (Pent-)	5
ہیکس (Hex-)	6
ہپٹ (Hept-)	7
آکٹ (Oct-)	8
نون (Non-)	9
ڈیک (Dec-)	10

شروع شروع میں آرگینک کیمیا دانوں نے جو آرگینک کمپائونڈ بنائے تو جو نام انھوں نے تجویز کیے انھیں کامن یا ٹریویل نام (Common or Trivial Names) کہتے ہیں۔ اکثر استعمال میں آنے والے یہ نام نہ صرف سادہ ہیں بلکہ آسانی سے استعمال میں آجاتے ہیں۔ تاہم جب بہت زیادہ تعداد میں آرگینک کمپائونڈز بننا شروع ہو گئے جن میں سے بعض بہت پیچیدہ بھی تھے تو ان سب کو انفرادی طور پر کو من نام دینا ممکن نہ رہا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انٹرنیشنل یونین آف پورائیٹھائیٹ کیمسٹری (IUPAC) نے آرگینک کمپائونڈز کو باقاعدہ نام دینے کا طریقہ نکالا۔ نام دینے کے اس طریقے کو IUPAC نومن کلیچر (Nomenclature) کہتے ہیں۔

(i) الکنیز (Alkanes)

ایسے آرگینک کمپائونڈز جن میں صرف کاربن اور ہائیڈروجن کے ایسٹھائیٹ موجود ہوں ان کو ہائیڈروکاربنز کہتے ہیں۔ ایسے ہائیڈروکاربنز جن میں کاربن ایسٹھائیٹ کی چاروں ویلینسیز (Valencies) سنگل بانڈز بنانے کے لیے استعمال ہو چکی ہوں ان کو سیچورائیٹھائیٹ ہائیڈروکاربنز یا





الکئیز (Alkanes) کہتے ہیں۔ جبکہ ایسے ہائڈروکاربنز جن میں کم از کم ایک ڈبل یا ٹریپل بانڈ ہو ان کو آن سچورینڈ (Unsaturated Hydrocarbons) کہتے ہیں۔ سچورینڈ ہائڈروکاربنز یا الکئیز میں ایک یا زیادہ کاربن ایٹمز موجود ہوتے ہیں اور ان میں سیدھی چین یا برانچوں والی چین دونوں ہو سکتی ہیں۔

میتھین (CH_4) سادہ ترین سچورینڈ ہائڈروکاربن ہے۔

IUPAC سسٹم کے مطابق آرگینک کمپاؤنڈ کے نام کے تین حصے ہیں۔

- ۱۔ رُوت (Root): نام کا یہ حصہ مالیکول میں موجود کاربن ایٹمز کی سب سے لمبی مسلسل چین (Longer Continuous Chain) میں کاربن ایٹمز کی تعداد بتاتی ہے۔ دس کاربن ایٹمز تک کے مالیکولز کے رُٹس (Roots) کے نام ٹیبل (20.2) میں دیے گئے ہیں۔
- ۲۔ سٹفکس (Suffix): نام کے اس حصے کو رُٹ کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور آرگینک کمپاؤنڈ کی فیملی کے بارے میں مطلع کرتا ہے۔
- ۳۔ پری فیکس (Prefix): نام کے اس حصے کو رُٹ سے پہلے لکھا جاتا ہے اور یہ اس گروپ یا ان گروپس کے بارے میں بتاتا ہے جو سیدھی چین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔

ٹیبل (20.3) میں چند الکئیز کے مالیکولر فارمولاز ڈسپلےڈ فارمولاز (Displayed Formulas) یا کنڈینسڈ (Condensed) سٹرکچرل مارمولاز دکھائے گئے ہیں۔

ٹیبل 20.3: الکئیز کے فارمولاز



$\begin{array}{c} H \\ \\ H-C-H \\ \\ H \end{array}$	CH_4	میتھین (Methane)
$\begin{array}{c} H & H \\ & \\ H-C & -C-H \\ & \\ H & H \end{array}$	C_2H_6 CH_3-CH_3	ایتھین (Ethane)
$\begin{array}{c} H & H & H \\ & & \\ H-C & -C & -C-H \\ & & \\ H & H & H \end{array}$	C_3H_8 $CH_3-CH_2-CH_3$	پروپین (Propane)
$\begin{array}{c} H & H & H & H \\ & & & \\ H-C & -C & -C & -C-H \\ & & & \\ H & H & H & H \end{array}$	C_4H_{10} $CH_3-(CH_2)_2-CH_3$	بیوٹین (Butane)
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	C_5H_{12}	پینٹین (Pentane)
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	C_6H_{14}	ہیکزین (Hexane)
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	C_7H_{16}	ہپٹین (Heptane)
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	C_8H_{18}	آکٹین (Octane)
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	C_9H_{20}	نونین (Nonane)
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	$C_{10}H_{22}$	ڈیکین (Decane)





(ii) الکائل گروپ (Alkyl Group)

جب الکٹین کا مالیکیول بہت سے موجود ہائڈروجن ایٹمز میں سے ایک ایٹم کھو دیتا ہے تو الکائل گروپ بنتا ہے۔ مثلاً



عام طور پر الکٹین کو R-H جبکہ الکائل گروپ کو R- سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

نام دینے کے IUPAC سسٹم کی وضاحت کے لیے ذیل میں درج کمپاؤنڈ کو نام دیتے ہیں۔




(a) اس کمپاؤنڈ میں موجود سب سے لمبی کاربن کی چین کی نشاندہی کریں۔

(b) اس کمپاؤنڈ کی فیملی کی شناخت کریں۔

اس کمپاؤنڈ میں سب سے لمبی کاربن کی چین میں چار کاربن ایٹمز ہیں اور اس کمپاؤنڈ کا تعلق ہائڈروکاربنز کی فیملی الکینز کے ساتھ



ہے۔ اس لیے اس کا روٹ ہیوٹ (But-) اور سٹکس این (ane) ہوگا۔ اس طرح آرگینک کمپاؤنڈ کا نام ہیوٹین (Butane) ہوگا۔



سب سے لمبی کاربن کی لڑی ہیوٹین (Butane)

20.5 فوری جانچ

IUPAC سسٹم کے مطابق ذیل میں درج کمپاؤنڈ کو نام دیں۔



(iii) الکینز (Alkenes)

ایسے ہائڈروکاربنز جن میں کم از کم ایک کاربن-کاربن ڈبل بانڈ موجود ہو تو انہیں الکینز کہتے ہیں۔

الکینز کو الکینز کی طرح ہی نام دیے جاتے ہیں لیکن ان کے لیے سٹکس (Suffix) این-ene استعمال کیا جاتا ہے۔ الکینز کو نام

دینے کے لیے ذیل میں درج نقاط کے مطابق چلیں۔


۱۔ کمپاؤنڈ میں موجود سب سے لمبی کاربن ایٹمز کی چین کی شناخت کریں جس میں ڈبل بانڈ سے منسلک دونوں کاربن ایٹمز شامل ہوں۔

۲۔ چین میں موجود کاربن ایٹمز کو اس سرے سے گنتا شروع کریں جہاں سے ڈبل بانڈ والی کاربن ایٹمز نزدیک ترین ہو۔







الکلیز اور ان کے نام




بوت-1-این (But-1-ene)



بوت-2-این (But-2-ene)



پینٹ-1-این (Pent-1-ene)



پینٹ-2-این (Pent-2-ene)

(iv) الکوحلو (Alcohols)

الکلیز کے مونو ہائڈروکسی ڈیریویٹوز (Monohydroxy Derivatives) کو الکوحلو کہتے ہیں۔ الکوحل کا جنرل فارمولا ROH ہے۔ IUPAC سسٹم کے مطابق الکوحلو کو نام دینے کے لیے ذیل میں درج قوانین پر عمل کرتے ہیں۔

(i) کاربن ایٹمز کی سب سے لمبی چین کو جس میں وہ کاربن ایٹم بھی شامل ہو جس کے ساتھ ہائڈروکسل گروپ منسلک ہے بطور پیرنٹ (Parent) ہائڈروکاربن منتخب کیا جاتا ہے۔ اس الکنین (Alkane) کے آخری حرف (ای) e- کو اول (ol) سے بدل دیتے ہیں۔

(ii) کاربن ایٹمز کی چین میں موجود کاربن ایٹمز کی تعداد کو اس سرے سے گنتے ہیں جہاں سے وہ کاربن ایٹم نزدیک ترین ہو جس کے ساتھ ہائڈروکسل گروپ لگا ہوا ہے۔

(iii) ہائڈروکسل گروپ کی پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے کاربن ایٹم کا نمبر اس کے ساتھ لگاتے ہیں جس کے ساتھ یہ منسلک ہو۔

چند سادہ الکوحلو کے نام اور ان کے کنڈینسڈ فارمولا ذیل 20.4 میں دکھائے گئے ہیں۔

$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	CH_3OH	الکوحل
پروپائل الکوحل	ایتھائل الکوحل	میٹھائل الکوحل	کامن نام
پروپین-1-اول	ایتھانول	متھانول	IUPAC کے مطابق نام
$\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	$\text{CH}_2(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	$\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$	الکوحل
آکسو پروپائل الکوحل	این-بیوٹائل الکوحل	آکسو پروپائل الکوحل	کامن نام
بیوٹین-2-اول	بیوٹین-1-اول	پروپین-2-اول	IUPAC کے مطابق نام

(v) کاربوکسلیک ایسڈز (Carboxylic Acids)

ایسے آرگینک کمپاؤنڈز جن میں کاربوکسل ($-\text{COOH}$) فنکشنل گروپ موجود ہو انہیں کاربوکسلیک ایسڈز کہتے ہیں۔ ان کو عام طور پر فٹی ایسڈز (Fatty acids) بھی کہتے ہیں کیونکہ ان میں سے کچھ کاربوکسلیک ایسڈز فٹس (Fats) یا چربی سے لیے جاتے ہیں۔ ان کا جنرل فارمولا RCOOH ہے۔

کاربوکسلیک ایسڈز کے IUPAC نام ان الکلیز سے حاصل کیے جاتے ہیں جن میں اتنے ہی ایٹمز موجود ہوں جتنے کاربوکسلیک





ایسڈز میں پائے جاتے ہیں۔ الکین (Alkane) کے نام کا آخری حرف ای (e) تبدیل کر کے اوک ایسڈ (Oic acid) لکھ دیتے ہیں۔ کاربوسک ایسڈز کے کا سن اور IUPAC نام ٹیل (20.5) میں دکھائے گئے ہیں۔

ٹیل 20.5 کاربوسک ایسڈز کے نام

CH ₃ CH ₂ CH ₂ COOH	CH ₃ CH ₂ COOH	CH ₃ COOH	HCOOH	کاربوسک ایسڈ
بیوٹانک ایسڈ	پروپونک ایسڈ	ایسیک ایسڈ	فارک ایسڈ	کا سن نام
بیوٹانوائک ایسڈ	پروپانوائک ایسڈ	ایسٹھانوائک ایسڈ	میٹھانوائک ایسڈ	IUPAC نام

دلچسپ معلومات





کاربوسک ایسڈز کے کا سن نام کو ان کے ماخذ کے ساتھ نسبت سے دیا جاتا تھا۔ فارک ایسڈ کو سب سے پہلے سرخ چیونٹوں سے حاصل کیا گیا تھا۔ لاطینی زبان میں فارمیکا (Formica) کا مطلب چیونٹی ہے۔ (ی طرح ایسیک ایسڈ کو سب سے پہلے سرکے سے حاصل کیا گیا تھا۔ سرکے کو لاطینی زبان میں اسیٹیم (Acetum) کہتے ہیں۔

(vi) ایسٹرز (Esters)

ایسٹرز خوشبودار کمپاؤنڈز ہیں۔ عام طور پر انہیں بعض کھانے والے اشیاء کو ذائقہ دار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ R-COOR ایسٹرز کا جنرل فارمولا ہے۔

ایسٹرز بنانے کے لیے ہم الکحل کو ایسڈ کیپا لسٹ کی موجودگی میں کاربوسک ایسڈ سے ری ایکٹ کرتے ہیں۔



ٹیل 20.6 ایسٹرز کے کا سن اور IUPAC نام

HCOOCH ₂ CH ₃	CH ₃ COOCH ₂ CH ₃	CH ₃ COOCH ₃	ایسٹرز
ایسٹھانک فارمیٹ	ایسٹھانک اسیٹٹ	میٹھانک اسیٹٹ	کا سن نام
ایسٹھانک میٹھانوائٹ	ایسٹھانک ایسٹھانوائٹ	میٹھانک ایسٹھانوائٹ	IUPAC نام
CH ₃ CH ₂ CH ₂ COOCH ₃	CH ₃ CH ₂ COOCH ₃	CH ₃ CH ₂ COOC ₂ H ₅	ایسٹر
میٹھانک بیوٹانوائٹ	میٹھانک پروپانوائٹ	ایسٹھانک پروپانوائٹ	کا سن نام
میٹھانک بیوٹانوائٹ	میٹھانک پروپانوائٹ	ایسٹھانک پروپانوائٹ	IUPAC نام





20.6 فوری جانچ

چند ایک آرگنک کپاؤنڈز کے کنڈینسڈ سٹرکچرل فارمولا نیچے دیے گئے ہیں ان کی فیملیز کے نام لکھیں۔

- (i) $\text{CH}_3 - \underset{\text{OH}}{\text{CH}} - \text{CH}_3$ (ii) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}} - \text{CH}_3$
- (iii) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} = \text{CH} - \text{CH}_3$ (iv) $\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ (v) C_3H_6 (vi) C_5H_{12}
- (vii) $\text{H} - \overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}} - \text{H}$ (viii) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}} - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

مشق

A کثیر الانتخابی سوالات:

صحیح جواب پر (✓) کریں۔

(i) $\text{HC} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ مرکب کے لیے درست IUPAC نام لکھیں۔
 CH_2

(الف) 3-یوٹین (ب) 1-یوٹین (ج) 2-یوٹین (د) یوٹین

(ii) نیچے دیے گئے کپاؤنڈز میں سے ہر انچیز چین مرکب کون سا ہے؟

$\text{CH}_2 = \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ (ب) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ (الف)
 CH_3

$\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ (د) $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$ (ج)

(iii) درج ذیل میں سے کس میں استخوانول کا ڈسپلڈ فارمولا دکھایا گیا ہے؟

$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ (ب) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (الف)

$\text{H} \quad \text{H}$ $\text{H} \quad \text{H}$
 $\text{H} - \text{C} - \text{C} - \text{O} - \text{H}$ (د) $\text{H} - \text{C} - \text{C} - \text{OH}$ (ج)
 $\text{H} \quad \text{H}$ $\text{H} \quad \text{H}$

(iv) مندرجہ ذیل میں سے ایلڈی ہائیڈ نکشتل گروپ کی نشاندہی کریں:

$-\text{OH}$ (ب) $-\overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}} - \text{OH}$ (الف)
 O O
 $-\overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}} - \text{H}$ (د) $-\overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}} -$ (ج)





(v) الکانین فیملی کا جنرل فارمولا بتائیں:



(vi) پانچ کاربن ایٹموں والے سچورینڈ ہائڈروکاربن کے لیے کتنے سٹرکچرل آئسومرز ہوں گے؟

2 (الف) 3 (ب) 4 (ج) 5 (د)

(vii) مندرجہ ذیل میں سے کون سا ایٹھائیٹیل پروپائوایٹ کہلائے گا؟



(viii) الکنیز (Alkenes) میں کونسا فنکشنل گروپ موجود ہوتا ہے؟

(الف) کوئی فنکشنل گروپ نہیں (ب) کاربن-کاربن ٹریپل بانڈ
(ج) کاربن-کاربن ڈبل بانڈ (د) کاربن-کاربن-سنگل بانڈ

B مختصر جوابی سوالات:

- 20.1 سچورینڈ اور ان سچورینڈ ہائڈروکاربنز میں کیا فرق ہے؟
20.2 بیوٹین-2-اول کا سٹرکچرل فارمولا تحریر کریں۔
20.3 ایٹھائیٹیل ایمائن کو آرگینک کمپاؤنڈ کیوں کہتے ہیں؟
20.4 ایٹھائیٹیل میتھائیٹیل کا فارمولا تحریر کریں۔
20.5 سٹرکچرل آئسومرزم کی تعریف کریں۔
20.6 $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$ کا IUPAC نام تجویز کریں۔
20.7 کاربوکسل گروپ، امائیڈ فنکشنل گروپ اور ایٹر فنکشنل گروپ میں کیا مشترک ہے؟

C تعمیری فکر پر مبنی سوالات:

- 20.1 ہومولوگس سیریز کے ارکان میں ایک جیسی خصوصیات کیوں ہیں؟
20.2 2-میٹھائیٹیل پروپین کی خصوصیات این-بیوٹین سے کس طرح مختلف ہیں، جبکہ دونوں ایک جیسے کاربن ایٹمز پر مشتمل ہیں؟
20.3 پانچ کاربن ایٹمز پر مشتمل سچورینڈ ہائڈروکاربن کے سٹرکچرل آئسومرز کے سٹرکچرل فارمولا لکھیں۔
20.4 بیوٹین کے آئسومرز کا سٹرکچرل فارمولا تحریر کریں۔
20.5 ایٹھائیٹیل ہائڈ، کیٹون اور کاربوکسلک ایسڈ میں پائے جانے والے فنکشنل گروپ کے درمیان فرق کی وضاحت کریں۔









تفصیلی سوالات:

D

- 20.1 آرگینک کپاؤنڈز کسے کہتے ہیں؟ ان میں موجود کاربن چین کی نوعیت کی بنیاد پر درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے؟
- 20.2 مثالیں دے کر سٹرکچرل فارمولا کی وضاحت کریں۔
- 20.3 ہومولوگس سیریز کی پانچ خصوصیات تحریر کریں۔
- 20.4 الکوئل کو نام دینے کے لیے IUPAC اصول بیان کریں۔
- 20.5 درج ذیل کپاؤنڈز کے نام تحریر کریں۔



WebVersion of PECTAR Textbook
Not for Sale



ہائڈروکاربنز Hydrocarbons

حاصلاتِ تعلیم:

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ:

- وضاحت کریں کہ الکنیز (Alkenes) میں ایک ڈبل کاربن۔ کاربن کو پلٹ ہائڈروجن ہے اور یہ کہ الکنیز ان سچوریتڈ ہائڈروکاربنز ہیں۔
- اونچے درجہ حرارت اور کھپاؤ کی موجودگی میں بڑے الکنین مالکیولز کی کریٹنگ کے ذریعے الکنیز کی تیاری کی وضاحت کریں۔
- بڑے الکنین مالکیولز کی کریٹنگ کی وجہ بیان کریں۔
- برومین کی ایکس سلوشن اور KMnO_4 کے ساتھ ری ایکشنز کے ذریعے سچوریتڈ اور ان سچوریتڈ ہائڈروکاربنز کے درمیان فرق کرنے کا طریقہ بیان کریں۔
- الکنیز کی خصوصیات درج ذیل ایڈیشن ری ایکشنز کے ذریعے بیان کریں۔
- (الف) برومین یا ایکس برومین کے سلوشن کے ساتھ۔ (ب) نیکل بطور کھپاؤ کی موجودگی میں ہائڈروجن کے ساتھ۔
- (ج) ایڈک کھپاؤ کی موجودگی میں ہوائی کے ساتھ اور حاصل شدہ اشیاء کے سٹرکچرل یا ڈسپلےڈ (Displayed) فارمولہ لکھیں۔
- الکنیز کی تیاری کی وضاحت بذریعہ ہیلو جینو الکنز (Halogeno-alkanes) اور الکوہلو کے آکسیدیشن (Elimination) ری ایکشنز سے کریں اور ان کی مساوات لکھیں۔
- الکنز کی شناخت کریں بطور ہائڈروکاربن جو کہ ایک ٹرپل کاربن۔ کاربن کو پلٹ ہائڈروجن پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ کہ الکنز غیر میر شدہ ہائڈروکاربنز ہیں۔
- ویڈنگ کے عمل کے دوران اشیاء تان بطور ایندھن استعمال کرنے کی وضاحت کریں اور پھلوں کے پکنے میں اشیاء تان کے کردار کے بارے میں بتائیں۔
- جزوی کشید کے ذریعے پٹرولیم میں موجود مختلف اجزاء کو الگ کرنے کی وضاحت کریں۔

21.1 الکنیز (Alkenes)

الکنیز ایسے ان سچوریتڈ (Unsaturated) ہائڈروکاربنز کو کہتے ہیں جن میں ایک یا ایک سے زیادہ کاربن۔ کاربن ڈبل ہائڈروجن ہوں۔ ان کو اولیفینز (Olefins) بھی کہتے ہیں۔ ان کا جنرل فارمولہ C_nH_{2n} ہے۔ یہ اپنی انفر اوکی طبعی اور کیمیائی خواص کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی۔ ان کو مختلف اشیاء مثلاً پلاسٹکس اور ایندھن سے متعلق اشیاء بنانے کے لیے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔


الکنیز کی تیاری

الکنیز کو یا تو الکوہلو کی ڈی ہائڈریشن (Dehydration) سے یا پھر الکانل ہیلو آکسائیڈ کی ڈی ہائڈرو ہیلو جینیشن (Dehydrohalogenation) سے بنایا جاتا ہے۔ ڈی ہائڈریشن کا مطلب ہے کسی مالکیول سے پانی کا ایک مالکیول نکالنا اور ڈی ہائڈرو ہیلو جینیشن کا مطلب ہے الکانل ہیلو آکسائیڈ کے مالکیول سے ہائڈروجن ہیلو آکسائیڈ (HX) کا مالکیول نکالنا۔

(i) الکوہلو کی ڈی ہائڈریشن سے

الکوہلو کی ڈی ہائڈریشن کرنے کے لیے مرکب سلفیورک ایسڈ کو بطور ڈی ہائڈرینٹ ایجنٹ (Dehydrating Agent) استعمال

کیا جاتا ہے۔



(ii) الکائل ہیلانڈز کی ڈی ہائڈروہیلوجینیٹیشن سے

الکائل ہیلانڈز کی ڈی ہائڈروہیلوجینیٹیشن کرنے کے لیے پوٹاشیم ہائڈروآکسائیڈ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے پوٹاشیم ہائڈروآکسائیڈ کو استحانول میں حل کیا جاتا ہے۔



دلچسپ معلومات



الکینز قدرتی طور پر بکثرت پائی جاتی ہیں مثال کے طور پر ایتھیلین (Ethylene) پودوں میں موجود ہارمون ہے جو ان کے پھولوں کو لگاتا ہے۔ گاجروں کا اورنج رنگ ایک الکنین p-کیروٹین (p-Carotene) کی وجہ سے ہوتا ہے۔

یہ ری ایکشن ایلی منیشن (Elimination Reactions) ری ایکشنز میں سے ایک ہے۔ ان ری ایکشنز میں سچورینڈ کمپاؤنڈز میں سے ایک مالکیول خارج کر کے ان سچورینڈ کمپاؤنڈز بناتے ہیں۔

(iii) الکنز (Alkanes) کی کریکنگ (Cracking) سے الکنز (Alkenes) کا بننا

کریکنگ کے عمل کے دوران زیادہ مالکیولر ماس والے الکنز کو توڑ کر کم ماس والے الکنز (Alkanes) اور الکنز (Alkenes) بنائی جاتی ہیں۔ اس عمل کو سرانجام دینے کے لیے الکنز کو آکسیجن کی غیر موجودگی اور زیولاٹس (Zeolites) کیپٹلس کی موجودگی میں بہت زیادہ ٹھیک ٹھیک گرم کیا جاتا ہے۔

کریکنگ تجارتی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے کیونکہ اس عمل کی بدولت کم ماس والی الکنز (Alkanes) بنائی جاتی ہیں جو بطور ایندھن استعمال ہوتی ہیں۔ مزید اس عمل کے دوران الکنز مثلاً ایتھین اور پروپین بھی بنتی ہیں جن کو بہت سے تجارتی طور پر اہم کیمیکلز بنانے کے لیے بطور خام مال استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً کیروسین (Kerosene) آئل اور ڈیزل آئل جن میں زیادہ ماس رکھنے والے الکنز موجود ہیں ان کی کریکنگ کر کے پٹرول، الکنز (Alkenes) اور ہائڈروجن بناتے ہیں۔






21.2 الکینز کے اہم ری ایکشنز (Important Reactions of Alkenes)

الکینز بہت ری ایکٹو (Reactive) کمپاؤنڈز مانے جاتے ہیں۔ ان کی کیمیکل ری ایکٹیوٹی (Reactivity) کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایک کاربن۔ کاربن ڈبل بانڈ موجود ہوتا ہے اور اس بانڈ کی موجودگی کی وجہ سے یہ ایسے ری ایکشنز میں حصہ لیتے ہیں جن کو ایڈیشن ری ایکشنز (Addition Reactions) کہتے ہیں۔ ایڈیشن ری ایکشنز ایسے ری ایکشنز کو کہتے ہیں جن میں ری ایکٹنٹس ایک دوسرے میں جمع ہو کر صرف ایک پروڈکٹ بناتے ہیں۔


(i) ہائیڈروجن کی ایڈیشن (Addition of Hydrogen)

نیکل کیپٹالسٹ کی موجودگی میں ہائیڈروجن گیس الکینز میں جمع ہو کر الکینز (Alkanes) بناتی ہے۔




(ii) ہیلوجینز (Halogens) کی ایڈیشن (Addition of Halogens)

ہیلوجینز بڑی سرعت کے ساتھ الکینز میں جمع ہو کر الکائل ڈائی ہیلوائیڈز (Alkyl Dihalides) بناتی ہیں۔ اس ری ایکشن کے لیے کاربن ٹیٹراکلورائیڈ (CCl₄) کو بطور نان پولر سولونٹ (Solvent) استعمال کیا جاتا ہے۔



(iii) پوٹاشیم پرمینگنیٹ کے ساتھ الکینز کی آکسائیڈیشن (Oxidation of Alkenes with KMnO₄)

پوٹاشیم پرمینگنیٹ کے ٹھنڈے اور ڈائیولیٹ ایکوس سلوشن سے ری ایکشن کر کے ایک اہم کمپاؤنڈ ایٹھن گلیکول (Ethylene Glycol) یا ایٹھین-1,2-ڈائی اول (Ethan-1,2-diol) بناتی ہے۔




ہیلوجینیشن اور آکسائیڈیشن دونوں ری ایکشنز سے الکین کو شناخت کیا جاتا ہے۔ برومین کاسرخی مائل براؤن رنگ اور پوٹاشیم پرمینگنیٹ کا بنفشی رنگ دونوں فوری ختم ہو جاتے ہیں جب یہ الکین سے ری ایکشن کرتے ہیں۔ اسی طرح الکینز آئیوڈین کے بنفشی رنگ کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ الکینز (Alkanes) یا سپور ریڈ کمپاؤنڈز اوپر دیے گئے ری ایکشنز میں حصہ نہیں لیتے۔ اسی لیے ان ری ایکشنز کی مدد سے ہم الکینز اور الکینز کے درمیان فرق ظاہر کر سکتے ہیں۔







(iv) ہائڈروجن ہیلائیڈز کی ایڈیشن (Addition Hydrogen Halides)

ہیلوجینز کی طرح ہائڈروجن ہیلائیڈز بھی الکینز کے ڈبل بانڈ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ان ری ایکشنز کو الکینز کی ہائڈروہیلوجینیشن کا نام دیا گیا ہے۔




(v) سلیم یا پانی کی ایڈیشن (Addition of water or steam)

الکینز سلفیورک ایسڈ کے موجودگی میں پانی سے ری ایکشن کرتی ہیں۔ یہ ری ایکشن تقریباً 300°C پر وقوع پذیر ہوتا ہے اور اسے ہائڈریشن ری ایکشن کا نام دیا گیا ہے۔




21.3 الکائینز (Alkynes)

الکائینز ایسے ہائڈروکاربنز کہتے ہیں جن میں کم از کم ایک کاربن-کاربن ٹریپل بانڈ موجود ہو۔ ان کا جنرل فارمولا $\text{C}_2\text{H}_{2n-2}$ ہے۔ الکینز کی طرح ان کو نام دینے کے لیے بھی کاربن کی لگاتار چین جس میں ٹریپل بانڈ بنانے والے دونوں کاربن شامل ہیں اس میں کاربن ایٹمز کی تعداد معلوم کی جاتی ہے۔




ایٹھائن



پروپائن



1-بیوٹائن



بیوٹ-2-این



21.1 ایسیٹیلین گیس

سب سے سادہ ترین الکائین کو ایٹھائن یا ایسیٹیلین لین گیس کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ گیس ویلڈنگ اور میپلز کو کاٹنے جیسے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ جب اس کو آکسیجن کی موجودگی میں جلا یا جاتا ہے تو بہت زیادہ ہیٹ (Heat) پیدا ہوتی ہے۔



ایسیٹیلین لین نارچ میں ایسیٹیلین لین گیس آکسیجن کی موجودگی میں جل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی بناتی ہے۔ آکسی ایسیٹیلین لین شعلے کا بہت بلند ٹمبر پچر کاٹنے اور ویلڈنگ جیسے امور سرانجام دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔





ایسٹنی لین گیس پھلوں کو پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جب ٹھوس کیلشیم کاربائیڈ (Calcium Carbide) ہوا میں موجود نمی سے ری ایکشن کرتا ہے تو ایسٹنی لین گیس پیدا ہوتی ہے جو پھلوں کے پکنے کے عمل کو تیز کرتی ہے اور ان کے رنگ میں تبدیلی لاتی ہے۔


کیا آپ جانتے ہیں؟

ہمارے ملک میں کیلشیم کاربائیڈ کا استعمال ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس گیس سے صحت کے سنگین مسائل مثلاً چکڑا نا، اُلتھی آنا اور جلد کا السر (Ulcer) جیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔

21.4 پٹرولیم کی صفائی (Refining of Petroleum)

اپنی اصلی حالت میں پٹرولیم بہت سے ہائیڈروکاربنز کا ایک آمیزہ ہے جس کو آسانی سے جلا یا نہیں جاسکتا۔ اس کو کارآمد بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں موجود مختلف اجزاء کو علیحدہ کیا جائے۔ اجزاء کو علیحدہ کرنے کے اس عمل کو پٹرولیم کی صفائی (Refining) کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

صفائی کے اس عمل کے دوران پٹرولیم کی جزوی کشید (Fractional Distillation) کی جاتی ہے۔ اس دوران پٹرولیم کو تقریباً 400°C تک گرم کیا جاتا ہے جس سے اس میں موجود مختلف اجزاء علیحدہ ہو جاتے ہیں۔



21.2: پٹرولیم کی صفائی

صفائی کے اس عمل کے دوران سب سے پہلے پٹرولیم کو درکار تیزابی یا بیسیک سلوشن سے نیوٹرلائز کی جاتی ہے۔ اس نیوٹرلائزڈ پٹرولیم کو پھر ایک الیکٹرک بھٹی کی مدد سے 400°C تک گرم کیا جاتا ہے۔ گرم کرنے کے اس عمل کے دوران نکلنے والی گیسوں اور بخارات کو ایک اونچے کسری کشید (Fraction Distillation) کرنے والے چیمبر میں سے گزرا جاتا ہے۔ جیسا کہ شکل 21.2 میں دکھایا گیا ہے۔ اس چیمبر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں موجود تختے میں سوراخ ہیں جن پر متحرک ڈھکن ہوتی ہیں۔

جب پٹرولیم کو گرم کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس میں موجود جل شدہ گیسیں برآمد ہوتی ہیں جو کسری کشید والے چیمبر سے گزر کر شکل 21.2 میں دکھائے گئے راستوں سے باہر نکل جاتی ہیں۔ جیسے جیسے نمبر بچر بڑھتا ہے پٹرولیم سے نکلنے والے ہائیڈروکاربنز کے بخارات کسری کشید والے چیمبر میں اوپر اٹھتے جاتے ہیں اور زیادہ بوائٹنگ پوائنٹس رکھنے والے ہائیڈروکاربنز مائع میں تبدیل ہو کر چیمبر کے زیریں حصے میں موجود راستوں





سے باہر نکل جاتے ہیں۔

پٹرولیم کے وہ اجزاء جن کے پوائنٹس کم ہیں ان کے بخارات جیمبر کے اوپر والے حصے میں مائع میں تبدیل ہو کر باہر نکل جاتے ہیں۔ جن کو پھر ذخیرہ کرنے والے ٹینکس میں جمع کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح علیحدہ ہونے والے اجزاء میں دوسرے اجزاء کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔ ان اجزاء کو پھر دوبارہ کشید کیا جاتا ہے جس سے اجزاء میں دوسرے اجزاء کی آمیزش نسبتاً کم ہو جاتی ہے۔

مشق


A کثیر الانتخابی سوالات:

صحیح جواب پر (✓) کریں۔

(i) مندرجہ ذیل کمپاؤنڈز میں سے کس سے ایڈیشن ری ایکشن کی توقع ہے؟




(ii) درج ذیل ری ایکشن کی قسم کی نشاندہی کریں:



(الف) سب سٹی ٹیوٹن (Substitution) (ب) ریڈکشن (ج) آکسیدیشن (د) ایڈیشن


(iii) کون سا کمپاؤنڈ آتھنیں اورہ KMnO_4 کے درمیان ری ایکشن میں بطور ریڈیوسنگ ایجنٹ کام کرتا ہے؟



(iv) جب پروپین (Propene)، برومین مالکیول کے ساتھ ری ایکشن کرے گی تو کون سا پروڈکٹ بنے گا؟



(v) مندرجہ ذیل ری ایکشن میں خارج ہونے والا مالکیول ہے:



B مختصر جوابی سوالات:

21.1 ایڈیشن ری ایکشن کی دو مثالیں بیان کریں۔

21.2 پوٹاشیم پرمینگنیٹ کے ٹھنڈے ایکوس سلوشن سے آتھنیں کو کیسے آکسیدائز کیا جاتا ہے؟

21.3 ایڈیشن ری ایکشن اور ایڈیشن ری ایکشن میں فرق واضح کریں۔





- 21.4 آکسی لیسٹیلین (Oxyacetylene) شعلہ پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے والے گیس کا نام بتائیں۔
- 21.5 الکیلین کو کیسے شناخت کیا جاتا ہے؟

C تعمیری فکر پر مبنی سوالات:

- 21.1 ڈی ہائڈریشن اور ڈی ہائڈروہیلو جینیشن کی اصطلاحات میں کیا فرق ہے؟
- 21.2 آپ کے پاس دو ٹیسٹ ٹیوبس A اور B ہیں جن میں سچو ریٹڈ اور آن سچو ریٹڈ گیس (الکیلین) ہیں۔ ان دونوں کی شناخت کیسے کریں گے؟
- 21.3 آکسی لیسٹیلین (Oxyacetylene) شعلہ بہت گرم کیوں ہوتا ہے؟
- 21.4 کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ استھائین، KMnO_4 کے ٹھنڈے سلوشن کو بے رنگ کر دے گی؟
- 21.5 کلورین اور ہائڈروجن کلورائیڈ آکسائیڈ کے ساتھ کیسے ایڈکشن میں ری ایکشن دیتی ہیں

D تفصیلی سوالات:

- 21.1 استھائین کی تیاری کے لیے دو طریقے بیان کریں۔
- 21.2 مثالوں کے ساتھ الکیلینز (Alkanes) کی کیریٹنگ کی وضاحت کریں۔
- 21.3 استھائین کے دو استعمال بیان کریں۔



مونو ہائڈروکسی الکینز یا الکوحلز

Monohydroxy Alkanes or Alcohols

حاصلاتِ تعلیم:

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ:


- استحالوں کی تیاری تفصیل کے ساتھ بتائیں جو کہ درج ذیل طریقوں سے تیار ہوسکتی ہے۔
35°C - 25°C پر پیسٹ کی موجودگی اور آکسیجن کی غیر موجودگی میں گلوکوز کے ایکس سلوشن کی فرمیٹیشن کے ذریعے۔ تیزابی کیپلاسٹ کی موجودگی میں 300°C اور 6000kPa/6 atm پر پریشر پرائیوٹیشن اور بھاپ کے درمیان ری ایکشن سے۔ دونوں طریقوں کے فوائد اور نقصانات کا موازنہ بھی کریں۔
- الکوحلوں کی کسمپشن بیان کریں۔
- مختلف صنعتوں جیسے کہ فارماسیوٹیکل، کاسمٹکس اور ایندھن کی پیداوار میں الکوحلوں کے کردار کی وضاحت کریں۔
- روزمرہ زندگی پر الکوحلوں کے بطور سالوینٹ اور بطور جراثیم کش اثرات پر بحث کریں۔

مونو ہائڈروکسی الکینز یا الکوحلوں آرگینک کمپائونڈز کی ایک قسم ہے۔ ان میں سے کچھ الکوحلز زندہ جانداروں میں پائے جانے والے کیپلاسٹ (Catalyst) کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں اور بیوپلارٹری میں تیار کیے جاسکتے ہیں۔
استحال الکوحل (Ethyl Alcohol) یا استحال نول (Ethanol) ہومولوجس سیریز (Homologous series) کا ایک اہم رکن ہے۔ اسے بڑے پیمانے پر مندرجہ ذیل طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے۔

22.1 استحال الکوحل کی تیاری (Manufacture of Ethyl Alcohol (CH₃ CH₂ OH))

پیسٹ کے ذریعے گلوکوز کی فرمیٹیشن (Fermentation of glucose by yeast)

فرمیٹیشن (Fermentation) ایک ایسا ری ایکشن ہے جس میں کوئی مادہ (شے) پیسٹ (Yeast) میں موجود انزائمز (enzymes) کی مدد سے ٹوٹ کر سادہ اجزاء میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دی، ذیل روٹی اور استحال الکوحل کی تیاری فرمیٹیشن (Fermentation) کی مثالیں ہیں۔ گلوکوز کو پیسٹ (Yeast) کی موجودگی میں تقریباً 35°C (سٹیگریڈ) پر استحال الکوحل (Ethyl Alcohol) میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ چاہے سلوشن (Solution) نیوٹرل (Neurtal) ہو یا تیزابی (Acidic) فرمیٹیشن ری ایکشن آکسیجن کی غیر موجودگی (anaerobic condition) میں ہونا ضروری ہے تاکہ استحال الکوحل (Ethyl Alcohol) بن سکے۔ پیسٹ میں موجود انزائم ایک کیپلاسٹ کا کام کرتا ہے۔ گلوکوز کی فرمیٹیشن کی متوازن مساوات اس طرح سے لکھی جاتی ہے۔






کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس اس ری ایکشن کے دوران باہر نکل جاتی ہے اور پیچھے پانی اور استھانول کا آمیزہ رہ جاتا ہے۔ اس ری ایکشن کا درجہ حرارت تقریباً 35°C رکھنا ضروری ہے۔ تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل ہو۔ کم درجہ حرارت ری ایکشن کو سست کر دیتا ہے۔ جبکہ زیادہ درجہ حرارت انزائمز کو آکسیجن کی غیر موجودگی میں غیر فعال بنا دیتا ہے۔ آکسیجن کو اس عمل سے دور رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ استھانول کو استھانونک ایسڈ (Ethanoic acid) میں تبدیل کر دیتی ہے۔ چونکہ زیادہ مقدار میں استھانول پیسٹ کے لیے زہریلا ہوتا ہے۔ اس لیے جب مرکب میں استھانول کی مقدار 15% (فی صد) سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پیسٹ غیر فعال ہو جاتا ہے۔

22.1 فوری جانچ

- ۱۔ فرمیٹھن کے عمل میں پیسٹ کا کیا کردار ہے؟
- ۲۔ کس درجہ حرارت پر پیسٹ (Yeast) میں موجود انزائمز غیر فعال ہو جاتے ہیں؟

اتھنن یا استھانولین کی ہائڈریشن (Hydration of Ethene or Ethylene)

اتھنن کی ہائڈریشن ایک ایڈیشن ری ایکشن ہے۔ اس ری ایکشن میں پانی اتھنن کے ڈبل بانڈ کو توڑ کر اس میں جذب ہو جاتا ہے۔ یہ ری ایکشن اس طرح کیا جاتا ہے کہ اتھنن (Ethene) اور بھاپ کے آمیزے کو گرم فاسفورک ایسڈ (Phosphoric acid) (H_3PO_4) پر گزارا جاتا ہے جو بطور کیتالیسٹ کام کرتا ہے۔ پانی کا ہائڈروجن ایٹم اتھنن (Ethene) کے ایک کاربن ایٹم کے ساتھ اور ہائڈروکسل گروپ (OH) دوسرے کاربن ایٹم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس ایڈیشن ری ایکشن کے دوران ڈبل بانڈ ٹوٹ جاتا ہے اور نتیجے میں سچو ریٹڈ (Saturated) یعنی سیر شدہ کمپاؤنڈ استھانول بنتا ہے۔



حاصل ہونے والا گیس کی شکل کا استھانول پھر ٹنڈا کر کے مائع شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اتھنن کی ہائڈریشن (Hydration) ایک اہم صنعتی ری ایکشن ہے کیونکہ استھانول ایک کثیر المقاصد (versatile) مرکب ہے۔ اس کے بے شمار استعمالات (Application) ہیں۔ جیسے مشروبات، ایندھن اور بطور سولونٹ (Solvent)۔

نمیل 22.1: استھانول کی پیداوار (Production) کے طریقوں کا موازنہ (Comparison of methods of Production of Ethanol)

فرمیٹھن (Fermentation)	اتھنن کی ہائڈریشن (Hydration of Ethene)
یہ ری ایکشن تقریباً 35°C اور عام فضائی دباؤ پر ہوتا ہے۔	یہ ری ایکشن زیادہ درجہ حرارت اور زیادہ دباؤ پر کیا جاتا ہے۔
ری ایکشن میں استعمال ہونے والا خام مال (starting material) قابل تجدید (renewable) ہوتا ہے۔ جیسے گنے کا رس۔	اس طریقے میں استعمال ہونے والا خام مال (starting material) کروڈ آئل (crude oil) حاصل کیا جاتا ہے جو کہ غیر قابل تجدید ذریعہ (non-renewable source) ہے۔





اس ری ایکشن کی رفتار کم ہوتی ہے اور اس کے مکمل ہونے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔	اس ری ایکشن کی رفتار زیادہ ہوتی ہے۔
اس ری ایکشن میں 15% الکوہل بنتی ہے جس کی مقدار بڑھانے کے لیے مزید ڈسٹیلیشن کرنی پڑتی ہے جو توانائی لیتی ہے۔	اس ری ایکشن میں نسبتاً خالص الکوہل بنتی ہے۔
اس طریقے سے حاصل ہونے والا استھانول سستا ہوتا ہے۔	اس طریقے سے حاصل ہونے والا استھانول مہنگا ہوتا ہے۔

22.2 فوری جانچ

- 1۔ فرمیشن کے ری ایکشن کے دوران آکسیجن کو کیوں خارج رکھا جاتا ہے؟
- 2۔ آکسیجن کی تیاری کا کونسا طریقہ قابل تجدید ذریعہ استعمال کرتا ہے؟

22.2 الکوہلو کا جلنا (Combustion of Alcohols)

الکوہلو آتش گیر ہوتی ہیں۔ اس لیے ہوا میں جل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO₂) اور پانی (H₂O) بناتی ہیں اور بہت زیادہ حرارت خارج کرتی ہیں۔ میتھانول (Methanol)، استھانول (Ethanol) اور 1-پروپانول (1-propanol) مکمل طور پر ہوا کی زیادہ مقدار میں جلتے ہیں۔ کیونکہ ان میں ہائیڈروکاربن چین (chain) موجود ہوتی ہے۔ الکوہلو کے مکمل طور پر جلنے (combustion) کی متوازن مساوات درج ذیل ہیں:



جلنے (combustion) کے دوران الکوہلو میں موجود کمزور C-H بانڈز جو C-H₂ گرپ میں ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں اور C=O اور O-H بانڈ بن جاتے ہیں جو کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO₂) اور پانی (H₂O) میں موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکاٹل چین میں CH₂ گرپس بڑھنے کے ساتھ حرارت کا اخراج بھی بڑھ جاتا ہے۔

22.3 فوری جانچ

آکسیجن میں جلنے پر بیوٹانول (Butanol) پروپانول (Propanol) سے زیادہ حرارت کیوں خارج کرتی ہے؟





22.3 صنعتوں میں استھانول کا کردار (Role of Ethanol in Industries)

دواسازی کی صنعت (Pharmaceutical industry)

استھانول الکوحل دواسازی کی صنعت میں مختلف ادویات کی تیاریوں میں ایک عام جزو کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس میں جراثیم کش خصوصیات موجود ہوتی ہیں اور اسے عام طور پر ہینڈ سینیٹائزر (hand sanitizer) اور میتھیلیٹڈ سپرٹ میں بطور جراثیم کش استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف دواسازی مصنوعات میں بطور سولونٹ (solvent) اور پریزروئیٹو (preservative) بھی استعمال ہوتا ہے۔

دلچسپ معلومات

اینڈھن کے طور پر استعمال ہونے والا استھانول پٹرول کے مقابلے میں گرین ہاؤس گیسوں کو 44% سے 52% کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ استھانول NO_x CO_2 اور پارٹیکولیٹ مادوں (particulate matters) جیسے دیگر مضر مادوں میں بھی کمی لاتا ہے۔

استھانول (ethanol) اور آکسوپروپانول (Isopropanol) کچھ منہ کے ذریعے لی جانے والی اور جلد پر لگانے والی ادویات میں بطور فعال جز شامل ہوتے ہیں۔ یہ کئی ادویات کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔

کاسمیٹک انڈسٹری (Cosmetic industry)

استھانول الکوحل کاسمیٹک انڈسٹری میں درج ذیل خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔

- 1- یہ زیادہ وولایٹائل (volatile) (فوری بخارات بننے والا) ہونے کی وجہ سے بہت کم وقت میں غائب ہو جاتا ہے۔
- 2- بدبودور (Deodorizing) کرنے والی اور سوزش (Anti-inflammatory) دور کرنے والی خصوصیات رکھتا ہے۔
- 3- تازگی بخشنے والی (Refreshing) اور جراثیم کش خصوصیات رکھتا ہے۔

استھانول ہیئر سٹائلنگ (Hairstyling) میں استعمال ہونے والی مصنوعات، فاؤنڈیشن کریموں (Foundation Creams)، پرفیومز (Perfumes)، ڈی اوڈورینٹس (Deodorants) اور آفٹر شیو لوشن (After shave lotions) جیسی کاسمیٹک اور حفظانِ صحت کی مصنوعات کا ایک اہم حصہ ہے۔

فیول انڈسٹری (Fuel industry)

الکوحلو کا استعمال پٹرول اور ڈیزل کی بجائے اینڈھن کے طور پر بھی کیا جاتا ہے تاکہ گاڑیاں چلائی جاسکیں۔ پہلے چارابی فینک الکوحلو (Aliphatic alcohols) یعنی میتھانول، استھانول، پروپانول اور بیوٹانول میں ایسے خواص پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں انٹرئل کمبین انجنوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

22.4 روزمرہ کی زندگی میں الکوحلو کے اثرات

(Impacts of Alcohols on Daily Life)

استھانول الکوحل ہر گھر میں فرسٹ ایڈ کٹ (First Aid Kit) کا ایک ضروری حصہ ہے جو میتھیلیٹڈ اسپرٹ (methyalted spirit) کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ میتھیلیٹڈ اسپرٹ زخموں کی ڈریسنگ کے لیے اینٹی سپٹنگ کے طور پر اور سانپ کے کاٹنے کے لیے اینٹی ڈوٹ (Antidot) کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ دنیا کے کئی حصوں میں استھانول کو گاڑیاں چلانے کے لیے اعلیٰ





کارکردگی والے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ استھانول ایک سالوینٹ (Solvent) کے طور پر بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ نسبتاً محفوظ ہے اور ایسے آرگینک کمپاؤنڈز (organic compounds) کو بھی حل کر سکتا ہے جو پانی میں حل نہیں ہوتے۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

مشروب کے طور پر استھانول الکوحل پیگ اور (hangover) (شراب کا نشہ)، الکوحل سے زہر خونی (poisoning)، حادثات اور خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ الکوحل کا طویل مدتی استعمال 200 سے زیادہ مختلف بیماریوں کا سبب بننے کا باعث بن سکتا ہے۔

مشق

A کثیر الانتخابی سوالات:

صحیح جواب پر (✓) کریں۔

- (i) گلوکوز کی فرمٹیشن کے لیے کون سے حالات بہترین ہیں؟
 (الف) 35°C ، تازہ میٹ، آکسیجن کی غیر موجودگی
 (ب) 45°C ، میٹ
 (ج) 45°C ، آکسیجن کی غیر موجودگی
 (د) 35°C ، تازہ میٹ
- (ii) H_3PO_4 کے علاوہ کون سا کیمکلسٹ الکلیفوز کی ہائڈریشن کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے؟
 (الف) NaOH (ب) H_2SO_4 (ج) CH_3COOH (د) Ni
- (iii) الکوحل جس کے جلنے سے سب سے زیادہ حرارت خارج ہوتی ہے:
 (الف) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
 (ب) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
 (ج) CH_3OH
 (د) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
- (iv) استھانول کی کون سی خاصیت اسے کاسمیٹک انڈسٹری میں استعمال کرنے کے لیے موزوں بناتی ہے؟
 (الف) آسان آتش گیر مادہ
 (ب) نہایت غیر مستحکم اور تابدار
 (ج) اینٹی بائیوٹیک / بخار کم کرنے والی دوا
 (د) سکون آور دوا
- (v) درج ذیل الکوحل کا درست نام کیا ہے؟

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ | \quad \quad | \\ \text{OH} \quad \quad \text{CH}_3 \end{array}$$

- (الف) 2- میتھائل پیپٹین - 4-اول
 (ب) 4- میتھائل پیپٹین - 2-اول
 (ج) ہیگن - 2-اول
 (د) ہیگن - 4-اول





(vi) استھانول کی کون سی خوبی اسے زخموں کی صفائی کے لیے موزوں بناتی ہے:

- (الف) سالوینٹ (ب) واپیلٹی (ج) جراثیم کش (د) تابدار

B مختصر جوابی سوالات:

- 22.1 استھانول الکوحل کی کون سی خصوصیات اسے کاسمیک انڈسٹری کے لیے موزوں بناتی ہیں؟
 22.2 فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے استھانول الکوحل کیسے اہم ہے؟
 22.3 فرمٹیشن ری ایکشن کے دو نقصانات بتائیں۔
 22.4 انتھین کی ہائڈریشن کرنے کے لیے کون سی شرائط ضروری ہیں؟

C تعمیری فکر پر مبنی سوالات:

- 22.1 چینی کی صنعت میں استھانول بطور ضمنی پیداوار (By-product) کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟
 22.2 فرمٹیشن کے عمل میں ہم نسبتاً ناخالص الکوحل کیوں حاصل کرتے ہیں؟

D تفصیلی سوالات:

- 22.1 استھانول کی تیاری کے لیے فرمٹیشن ری ایکشن اور انتھین کی کیٹالائٹک ہائڈریشن کا موازنہ کریں۔
 22.2 فرمٹیشن پر اس کے ذریعے استھانول کی تیاری کی وضاحت کریں۔
 22.3 فارماسیوٹیکل اور کاسمیک انڈسٹری میں استھانول کے استعمال کی وضاحت کریں۔



کاربوکسلک ایسڈز Carboxylic Acids

حاصلاتِ قلم:

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ:

- دھاتوں، بھسور اور کاربوئیٹس کے ساتھ کاربوکسلک ایسڈز کے ری ایکشنز کی وضاحت کریں نیز بننے والے سائٹس کے نام اور فارمولے تحریر کریں۔
- درج ذیل کے ساتھ استھانول کی آکسیڈیشن کے ذریعے استھونیک ایسڈ کی تیاری کی وضاحت کریں۔
- ایسڈک پوٹاشیم میگنیت (VII) سلوٹن کے ساتھ اور سرکہ کی پیداوار کے دوران بیکٹیریا کی مدد سے آکسیڈیشن کے ذریعے۔
- ایسٹریٹانے کے لیے ایسڈ کلپا لیسٹ کی موجودگی میں الکول کے ساتھ کاربوکسلک ایسڈ کے ری ایکشن کو بیان کریں۔
- کاربوکسلک ایسڈز اور ایسٹرز کے متعلق استعمال کی وضاحت کریں۔ نیز بطور سالوینٹ، ذائقہ بھڑکرنے اور بطور خوشبو اور پلاسٹکس، ان کے استعمال بیان کریں۔
- روزمرہ زندگی میں ایسٹرز اور کاربوکسلک ایسڈز کے کردار کی وضاحت جس میں بطور خوراک کے تحفظ، کاسٹیکس اور فارماسیوٹیکلز ان کے کردار شامل ہوں۔


آرگینک ایسڈز (organic acids) یا کاربوکسلک ایسڈ (carboxylic acid) آرگینک کمپاؤنڈز کی وہ کلاس ہے جن میں کاربوکسل گروپ (carboxyl group) (-COOH) ہوتا ہے جو ایک الکائل گروپ (alkyl group) یا ہائڈروجن سے منسلک ہوتا ہے۔ انہیں کمزور ایسڈز سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ ان آرگینک ایسڈز (inorganic acids) کے مقابلے میں آسانی سے پروٹون (ہائڈروجن آئن) خارج نہیں کرتے۔ یہ قدرتی طور پر زندہ جانداروں میں پائے جاتے ہیں اور انہیں مصنوعی طور پر بھی تیار کیا جاسکتا ہے۔

(Preparation of Acetic acid or Ethanoic acid)

23.1 ایسیٹک ایسڈ یا استھانوائک ایسڈ کی تیاری

استھانول کی آکسیڈیشن (Oxidation of Ethanol)

استھانول کو تیزاب کی موجودگی میں پوٹاشیم میگنیت (VII) (Acidified Potassium Manganate-VII) کے ذریعے آکسیڈائز کیا جاتا ہے۔ جس سے وہ استھانول میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر مزید آکسیڈیشن کے عمل سے گزر کر استھانوائک ایسڈ دیتا ہے۔ گرم تیزابی پوٹاشیم میگنیت (VII) ایک مؤثر آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور ری ایکشن کے دوران استھانول کو آکسیڈائز (oxidize) کرتا ہے اور اس ری ایکشن کے دوران آکسیڈائزنگ ایجنٹ کا جامنی رنگ بے رنگ ہو جاتا ہے۔





استھانوک ایسڈ کی آکسڈینٹیشن کے ذریعے تیاری

(Preparation of Ethanoic acid by oxidative fermentation)

الکوحلو سے بنی خوراک (Alcoholic food stuff) جیسے کہ اناج، مالٹ، چاول یا آلو کا گودا، فرمٹیشن کے عمل سے گزرنے پر سرکہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ بیکٹیریا کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ اگر کافی آکسیجن فراہم کی جائے تو یہ بیکٹیریا خوراک میں موجود الکوحلو سے سرکہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کیمیکل ری ایکشن کی مساوات درج ذیل ہے:



اس ری ایکشن میں الکوحل کو ایک ٹینک میں ڈال کر سرکہ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ جس میں آکسیجن کی مسلسل سپلائی ہوتی ہے۔ جب آکسیجن بلبوں کی شکل میں ٹینک میں داخل کی جاتی ہے تو مائع کو مسلسل ہلایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے 15 فیصد استھانوک ایسڈ پر مشتمل سرکہ صرف 24 گھنٹوں میں تیار کیا جاسکتا ہے۔

1۔ کیا آپ استھانول کی طرح میتھانول کو بھی KMnO_4 سے آکسڈ ایٹر کر سکتے ہیں؟
2۔ فرمٹیشن اور عام ری ایکشن کے درمیان فرق واضح کریں۔

23.1 فوری جانچ

23.2 بطور ایسڈ زکار بوکسلک ایسڈ کے ری ایکشن

(Reactions of Carboxylic acids as Acids)

(Reactions with metals) دھاتوں کے ساتھ ری ایکشن

عام طور پر کاربوکسلک ایسڈ معدنی ایسڈ کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ایسڈز ہوتے ہیں۔ تاہم بعض کاربوکسلک ایسڈز زیادہ ری ایکٹیو دھاتوں کے ساتھ سخت رکاری سے ری ایکٹ کر کے نمک اور ہائڈروجن گیس خارج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈائیٹیلوٹ استھانوک ایسڈ مگنیشیم دھات کے ساتھ ری ایکٹ کر کے مگنیشیم استھانوئٹ (magnesium ethanoate) اور ہائڈروجن گیس دیتے ہیں/ خارج کرتے ہیں۔



(Reaction with bases) دھاتوں کے ساتھ ری ایکشن

بیک میٹل ہائڈروآکسائیڈ (Metal hydroxides) کاربوکسلک ایسڈز کے ساتھ نیوٹرلائزیشن ری ایکشن دیتے ہیں۔ استھانوک ایسڈ سوڈیم ہائڈروآکسائیڈ (NaOH) کے ساتھ ری ایکشن کر کے سوڈیم استھانوئٹ اور پانی بناتا ہے۔





کاربونیٹس کے ساتھ کاربوکسیک ایسڈ کے ری ایکشنز (Reactions of carboxylic acid with carbonates)

جب ٹھوس سوڈیم کاربونیٹ (Sodium Carbonate) کو استھانویک ایسڈ (Ethanoic Acid) کے ایکوس سلوشن کے ساتھ ملا یا جاتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon Dioxide) گیس کے اخراج کی وجہ سے تیز جھاگ پیدا ہوتی ہے اور سلوشن میں




سنگ مرمر (Marble chips) کے ٹکڑوں کے ساتھ استھانویک ایسڈ آہستہ آہستہ ری ایکشن کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس



23.3 الکوحلوں کے ساتھ کاربوکسیک ایسڈ کے ری ایکشنز (ایسٹریفیکیشن)

(Reactions of Carboxylic acids with Alcohol) (Esterification)

کاربوکسیک ایسڈ اضافی (excess) الکوحلوں کے ساتھ گرم کرنے سے ایسٹرز (Esters) بناتے ہیں۔ اس ری ایکشن میں ارتکاز شدہ سلفیورک ایسڈ کو بطور کیٹالسٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ری ایکشن ایسٹریفیکیشن ری ایکشن کہلاتا ہے۔



- 23.2 فوری جانچ
- ۱۔ کیا استھانویک ایسڈ ایک کمزور تیزاب ہے؟
 - ۲۔ کالشیم کاربونیٹ استھانویک ایسڈ کے ساتھ کس طرح ری ایکٹ کرتا ہے؟

23.4 کاربوکسیک ایسڈ اور ایسٹرز کے صنعتی استعمالات

(Industrial Applications of Carboxylic acid of Esters)

ایسٹریک ایسڈ تیل، گندھک، آئیوین اور پانی جیسے کئی کمپاؤنڈز کو حل کرتا ہے۔ صنعت میں ایسٹریک ایسڈ ریزنز (resins)، پینٹس (Paints) اور لیکرز (Lacquers) کے لیے بطور سالوینٹ استعمال ہوتا ہے۔

(Carboxylic acids and Esters as Solvents)

کاربوکسیک ایسڈ اور ایسٹرز سالوینٹس کے طور پر (Solvents) کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ استھائل ایسٹریک (Ethyl acetate) ایسٹرز (Esters) بھی عام طور پر سالوینٹس کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بعض وولٹائل (Volatile) ایسٹرز (Esters) کو کوئلے، پینٹس، وارنش، کافی (Coffee) سے کیفین نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض وولٹائل (Volatile) ایسٹرز (Esters) کو کوئلے، پینٹس، وارنش، پلاسٹک، ریزنز اور لیکرز کے لیے سالوینٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔





دلچسپ معلومات



خالص ایسٹک ایسڈ کو گلیشیل ایسٹک (glacial acetic acid) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کرسوید (corrosive) اور بے رنگ ٹھوس ہے جو پانی میں مکمل طور پر حل پذیر ہے۔

کاربوکسلک ایسڈز اور ایسٹرز بطور فلیورنگ ایجنٹس (Carboxylic acids and Esters as Flavouring agents)

فلیورنگ ایجنٹس (Flavouring agents) وہ مادے ہیں، جو خوراک میں اضافی ذائقہ یا خوشبو شامل کرنے کے لیے شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ خاص طور پر بچوں میں ناخوشگوار ذائقے والی ادویات کے ذائقے کو چھپانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ آرگینک ایسڈز جیسے کہ ٹارٹریک ایسڈ، سٹرک ایسڈ اور میلک ایسڈ کو صنعت میں عام طور پر فلیور بڑھانے والوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ خوراک کا کھانا ذائقہ بڑی حد تک انہی ایسڈز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بعض خوراک اور مشروبات خاص طور پر سافٹ ڈرنکس کے ذائقے کو بہتر بنانے کے بھی ذمہ دار ہیں۔ ایسٹرز میں خوشگوار خوشبو اور ذائقے ہوتے ہیں۔ انہیں خوراک میں خوشبو اور ذائقے کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

کاربوکسلک ایسڈز اور ایسٹرز بطور مصنوعی فائبر (Carboxylic acids and Esters as synthetic Fibers)

ایسٹرز مصنوعی پولیمر کی تیاری میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک بہت اہم پولیمر، پولیسٹر ہے جو ڈائ اور ڈائی کاربوکسلک ایسڈز کے ری ایکشن سے بنتا ہے۔ ایسٹرز صابن اور ڈیٹرجنٹ کی تیاری میں بھی اہم ہیں۔ کاربوکسلک ایسڈز اور ان سے حاصل کیے گئے کپاؤنڈز عام طور پر مختلف قسم کے پلاسٹکس بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسیٹک ایسڈ، سیلولوز ایسیٹیٹ پلاسٹک (Cellulose acetate plastic) کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ پالمیٹک ایسڈ (Palmitic acid) اور سٹرک ایسڈ (Stearic acid) صابن، کاسمیٹکس، دوا سازی، موم تیلوں اور حفاظتی کوٹنگز کی تیاری میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ اولیک ایسڈ (Oleic acid) صابن اور ڈیٹرجنٹ کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ ایکریک ایسڈ (Acrylic acid) بہت سی لمبی چین والے پولیمرز جنہیں ایکریلیٹس (acrylates) کہا جاتا ہے، کی تیاری کے لیے ایک ابتدائی ریجنٹ ہے۔



شکل 23.1: کاربوکسلک ایسڈز کا روزمرہ زندگی میں استعمال

23.5 روزمرہ کی زندگی میں کاربوکسلک ایسڈز اور ایسٹرز

(Carboxylic acid and Esters in Daily Life)

فوڈ پریزرویٹوز (Food preservatives) وہ کیمیکل کپاؤنڈز ہوتے ہیں جو خوراک میں شامل کیے جاتے ہیں تاکہ مائیکرو آرگنزمز کی افزائش کو روکا جاسکے۔ مثال کے طور پر بینزویک ایسڈ، ایسیٹک ایسڈ، پروپائیونک ایسڈ، میتھائل اور ایسٹرز اور 4-ہائڈروکسی بینزویک ایسڈ۔ ان پریزرویٹوز کی موجودگی میں خوراک کے معیار کو برقرار رکھنے اور شیلف لائف کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ جو






خوراک (کھانوں) کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ ان میں جیمز، جوسز، پھلوں کے جوسز، دودھ اور بہت سی دیگر اشیاء شامل ہیں۔ ایسیٹک ایسڈ اچار میں ایک پریزرویٹو کے طور پر بہت وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔



فصل 23.2: جام، جوس اور اچار

کاربوسک ایسڈز اور ان سے حاصل ہونے والے کمپائونڈز جیسے کہ ایسپرین اور آکسیپروفرن عام طور پر بطور ادویات استعمال ہوتے ہیں۔ بعض کاربوسک ایسڈز کو ادویات کی تیاری میں شامل کرنے سے ان کے زیادہ بہتر طریقے سے جسم میں جذب ہونے، ترسیل اور مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔

سٹرک ایسڈ ایسٹرز بنیادی طور پر پلاسٹک سائزرز (Plasticizers) ہیں۔ جو بہت سی صنعتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ پولی میتھاکریلیٹ (Polymethyl methacrylate) کو شیشے کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اسے پلکسی گلاس (Plexiglass) کا نام دیا گیا ہے۔



فصل 23.3: پلینسٹر

کاربوسک ایسڈ بہت سی گھریلو خوشبودار اشیاء میں پائے جاتے ہیں۔ ان اشیاء کی ایک فہرست ٹیبل 23.1 میں دی گئی ہے۔

ٹیبل 23.1 گھریلو اشیاء میں موجود کاربوسک ایسڈز (Carboxylic acids in house hold items)

آئٹم	کاربوسک ایسڈز
وٹامن سی	اسکاربک ایسڈ (Ascorbic acid)
لیموں	سٹرک ایسڈ (Citric acid)
سرکہ	ایسیٹک ایسڈ (Acetic acid)
سیب، انگور، گاجر	میلک ایسڈ (Malic acid)

ایسٹرز کئی پھلوں کا ایک اہم جزو ہیں اور ان کے ذائقوں کو بہتر بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ عام طور پر ان میں خوشبودار مرکب ہوتی ہے اور وہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی کئی غذائی مصنوعات میں خوشبو کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ درج ذیل جدول ایسٹرز کے نام اور ان سے منسلک ذائقوں کو ظاہر کرتا ہے۔





نمبر 23.2: ایسٹرز اور ان کے ذائقے

ایسٹرز	قلمبرز
میٹھا نل بیوٹائریٹ (Methyl butyrate)	سیب
میٹھا نل بیوٹائریٹ (Ethyl butyrate)	پائن اپیل
امائل ایسیٹیٹ (Amyl acetate)	ناشپاتی، کیلے
آکٹائل ایسیٹیٹ (Octyl acetate)	مالا
میٹھا نل سیلیسیلیٹ (Methyl salicylate)	خوبانی

نوری جانچ 23.3

- 1- پریزیوٹیو کی وضاحت کریں۔
- 2- بعض ترش پھلوں کی مثالیں دیں۔

مشق

A کثیر الانتخابی سوالات:

صحیح جواب پر (✓) کریں۔

- ایسٹر فکشنل گروپ کی نشاندہی کریں:
 - (الف) COOR (ب) COOH (ج) C=O (د) CH_2OH
- تیزابی KMnO_4 کے ذریعے ایسٹھانول کی آکسائیڈیشن کے دوران کون سا عنصر ریڈیوس ہوتا ہے؟
 - (الف) K (ب) آکسیجن (ج) Mn (د) ہائیڈروجن
- ایسٹک ایسڈ کی موجودگی میں کھانے کی اشیاء کی فرمٹیشن کے لیے بیکٹیریا کو افر مقدار میں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس عمل میں آکسیجن کا کیا کردار ہے؟
 - (الف) یہ بیکٹیریا کی ری ایکشن انگیزی کو بڑھاتا ہے۔
 - (ب) یہ ایسٹھانول کو آکسائیڈائز کرتا ہے جو کہ اس عمل کے دوران بنتی ہے۔
 - (ج) یہ بیکٹیریا کی تباہی کو روکتا ہے۔
 - (د) یہ ایسٹک ایسڈ کی آکسائیڈیشن کو روکتا ہے۔
- کون سا آرگنیک ایسڈ کھانے کے جزو کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟
 - (الف) فارمک ایسڈ (ب) آگزالک ایسڈ (ج) پروپیونک ایسڈ (د) ایسٹک ایسڈ
- سیب میں درج ذیل میں سے کون سا ایسڈ موجود ہوتا ہے؟
 - (الف) بٹرک ایسڈ (ب) ٹارٹارک ایسڈ (ج) ایسٹک ایسڈ (د) میلک ایسڈ
- رکن دو اجزاء کے ری ایکشن سے $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOC}_2\text{H}_5$ بنے گا؟
 - (الف) CH_3OH اور $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ (ب) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ اور $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$
 - (ج) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ اور $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ (د) CH_3OH اور $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$





(vii) میٹھانول اور پروپیونک ایسڈ کے ری ایکشن سے بننے والے ایسٹر کا فارمولا کیا ہے؟

- (الف) $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ (ب) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_3$
(ج) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3$ (د) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{O} - \text{CO} - \text{CH}_3$

(viii) ڈائیول اور ڈائی کاربوسلک ایسڈ کے ری ایکشن سے کون سا پولیمر بنتا ہے؟

- (الف) پولی حصین (ب) پولی ایسٹر
(ج) پولی سٹائیرین (د) پولی امائڈ
(ix) کون سا مرکب بطور مصنوعی ریشہ استعمال کیا جاتا ہے؟
(الف) میٹھائیل ایسیٹیٹ (ب) پولی ایسٹر
(ج) ریزن (د) این۔ امائل ایسیٹیٹ

B مختصر جوابی سوالات:

- 23.1 ایسٹریفیکیشن ری ایکشن کسے کہتے ہیں؟
23.2 الکحل کی آکسائیڈیشن میں استعمال ہونے والے آکسائیڈازنگ ایجنٹ کا نام بتائیں۔
23.3 میٹھانول سے ایسٹک ایسڈ کی تیاری میں فرمیکیشن کے دوران وافر مقدار میں آکسیجن کیوں فراہم کی جاتی ہے؟
23.4 مشروبات کی تیاری میں کاربوسلک ایسڈ کے کردار کی وضاحت کریں۔
23.5 ایک عملی مثال بیان کریں جس میں کسی ایسڈ یا ایسٹر کو بطور فلورنگ ایجنٹ (flavouring agent) کے استعمال کیا جاتا ہے۔
23.6 کون سے کاربوسلک ایسڈ ذائقہ بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟
23.7 ایسٹک ایسڈ کی کون سی خاصیت اسے اچار محفوظ کرنے کے لیے موزوں بناتی ہے؟

C تعمیری فکر پر مبنی سوالات:

- 23.1 میٹھانول، پروپیونک ایسڈ کے ساتھ کیسے ری ایکشن کرتا ہے؟
23.2 ایسٹک ایسڈ، Mg اور MgCO_3 کے ساتھ کیسے ری ایکشن کرتا ہے؟
23.3 کاربوسلک ایسڈز بطور سالوینٹ کیسے استعمال ہوتے ہیں؟
23.4 کاربوسلک ایسڈز کا روزمرہ زندگی میں کیا استعمال ہے؟





D تفصیلی سوالات:

- 23.1 فرمعیٹن کے عمل کی وضاحت کریں جو کہ تجارتی پیمانے پر ایسک ایسڈ کی تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے؟
- 23.2 کاربوکسلک ایسڈز اور ایسٹرز کے صنعتی استعمال کی وضاحت کریں۔
- 23.3 فلیورنگ ایجنٹس کسے کہتے ہیں؟ کون سے کاربوکسلک ایسڈز بطور ذائقہ دار ایجنٹ استعمال ہوتے ہیں؟
- 23.4 کاربوکسلک ایسڈز کی دھاتوں اور کاربوئیٹس کے ساتھ ری ایکشنز کی تفصیل بیان کریں۔
- 23.5 روزمرہ زندگی میں ایسٹرز کے استعمال کی وضاحت کریں۔

WebVersion of PECTAA Textbook
Not for Sale



بائیو کیمسٹری Biochemistry

حاصلاتِ تعلیم:

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ:

- غذائیت اور صحت بخش خوراک کی بنیادی باتوں کی اہمیت کی وضاحت کریں۔
- اہم حیاتیاتی مالکیولز، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، لیپڈز، نیوکلیک ایسڈز کے ذرائع اور لو جو ان بالعموم کے لیے ان کی ضروری روزانہ مقدار بتائیں۔
- کاربوہائیڈریٹس بطور ذریعہ توانائی بیان کریں۔
- پروٹینز کو بطور قدرتی پولی امائز کے طور پر بیان کریں اور نیز یہ بھی بیان کریں کہ وہ امائنو ایسڈ مونومرز سے کیسے بنتے ہیں۔ ان کی ساخت کے حعلق بھی بتائیں۔
- پروٹینز کی عمومی ساخت لکھ کر سمجھیں۔
- پروٹینز، لیپڈز اور کاربوہائیڈریٹس کی ساخت اور استعمال کی وضاحت کریں۔
- نیوکلیک ایسڈز کی اہمیت بیان کریں۔
- وٹامنز، ان کے حصول کے ذرائع اور صحت کے لیے ان کی اہمیت بیان کریں۔

بائیو کیمسٹری ایسے کیمیائی مادوں کا مطالعہ ہے جو جانداروں میں ہونے والے ری ایکشنز میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates)، لیپڈز (Lipids) اور پروٹینز (Proteins) خوراک کی وہ تین کلاسز ہیں جو نہ صرف انسانوں کو توانائی فراہم کرتی ہیں بلکہ جسمانی ساخت کے لیے بھی ذمہ دار ہیں۔ لیپڈز اور کاربوہائیڈریٹس یا پروٹینز سے دو گنی توانائی فراہم کرتے ہیں۔

پروٹینز تمام جانداروں میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ جانداروں کے جسم کی جلد، بال، پٹھوں، خون اور تقریباً تمام اعضا کی تشکیل کرتے ہیں۔ وہ زندگی کو رواں دواں رکھنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

فیٹس (چکنائی) اور تیل جانوروں، پودوں اور سمندری جانداروں جیسے مختلف قدرتی ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں۔ جانوروں کی چربی خاص طور پر نشوونما کے خلیوں میں پائی جاتی ہے۔ مکھن اور گھی جانوروں سے حاصل ہونے والی خاص قسم کی فیٹس ہیں جو دودھ سے بنائی جاتی ہیں۔

24.1 فوری جانچ

- 1۔ پروٹینز کون سے دو افعال انجام دیتے ہیں؟
- 2۔ کیا دودھ فیٹ ہے، پروٹین ہے یا دونوں؟

24.1 غذائیت کی اہمیت (The Importance of Nutrition)

غذائیت خوراک میں موجود غذائی اجزاء کا مطالعہ ہے اور یہ کہ وہ کس طرح صحت مند جسم کو برقرار رکھتے ہیں۔ غذائی اجزاء خوراک کے وہ اجزاء ہیں جو صحت کو برقرار رکھنے اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے باقاعدگی سے درکار ہوتے ہیں۔ ایک صحت مند انسانی جسم کو درج ذیل غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔



1. کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates)

یہ انسانی جسم کے لیے توانائی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ یہ پروٹین کو موثر طریقے سے استعمال کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ایک صحت مند بالغ کو روزانہ 2000 کیلو ریز کی معیاری خوراک کے لیے 225 سے 325 گرام کاربوہائیڈریٹس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تاہم زیادہ سرگرمی والے افراد کو اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زیادہ کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

2. لپڈز (Lipids)

یہ بھی ضروری غذائی اجزاء ہیں۔ کیونکہ یہ ہمارے جسم کے لیے توانائی کے بڑے ذخائر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے اہم اعضا کے لیے انسولین اور حفاظت بھی فراہم کرتے ہیں۔ ایک بالغ کی روزانہ کی فیٹ کی مقدار تقریباً 44 سے 78 گرام کے درمیان ہوتی ہے۔

3. پروٹینز (Proteins)

یہ ہمارے جسم کو توانائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ نئے خلیات (cells) کی تعمیر اور زخمی خلیات کی مرمت میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک بالغ کو روزانہ 60 گرام پروٹین کا استعمال کرنا چاہیے۔

4. وٹامنز اور منرلز (Vitamins and Minerals)

یہ نشوونما (growth)، تولید (reproduction) اور جسم کے کام کرنے اور اسے برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ پھلوں، سبزیوں اور اناج سے بھرپور متوازن غذا جسم کو روزانہ درکار زیادہ تر وٹامنز اور منرلز مہیا کر سکتی ہے۔

صحت مند خوراک کی بنیادی باتیں (Basics of healthy eating)

صحت مند خوراک کی بنیادی باتیں درج ذیل ہیں:

- 1۔ پھل، سبزیاں، مکمل اناج اور صحت مند چکنائیاں سمیت مختلف قسم کی غذائیں استعمال کریں۔
- 2۔ ان میں وہ تمام غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ جن کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔
- 3۔ کم کھائیں اور خوب پانی پیئیں۔
- 4۔ سیر شدہ چکنائیاں، چینی اور سوڈیم کے استعمال میں کمی کریں۔
- 5۔ پراسیسڈ اور خراب معیار کی غذاؤں سے پرہیز کریں۔

صحت مند خوراک (Healthy Eating)

ایک صحت مند اور متوازن غذا درج ذیل کام سرانجام دیتی ہے۔

- 1۔ یہ دل کی بیماریاں، ذیابیطس، کچھ کینسرز (cancers) اور اوسٹیوپوروسس (osteoporosis) جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔
- 2۔ مناسب غذائیت صحت مند نشوونما (growth) کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے اور جسمانی وزن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔
- 3۔ متوازن غذا، دماغی کارکردگی پر مثبت اثر ڈالتی ہے اور مضبوط مدافعتی نظام کو سہارا دیتی ہے۔

24.2 فوری جانچ 1۔ متوازن غذا کیا ہے؟ 2۔ کوئی سے تین غذائی اجزاء کے نام بتائیں۔





24.2 کاربوہائڈریٹس (Carbohydrates)

کاربوہائڈریٹس زمین میں فطری طور پر سب سے زیادہ مقدار میں پائے جانے والے مرکبات ہیں۔ ان میں کاربن، ہائڈروجن اور آکسیجن کے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ کچھ کاربوہائڈریٹس کے ٹھوس ذائقے کی وجہ سے انہیں عام طور پر شوگرز کہا جاتا ہے۔ متعدد ہائڈروکسل گروپس کے علاوہ ان میں ایلڈی ہائڈ اور کیٹون فنکشنل گروپس بھی شامل ہوتے ہیں۔

کاربوہائڈریٹس کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر تین گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے (مونو میرک، اولیگو میرک اور پولی میرک کاربوہائڈریٹس)۔ گلوکوز سب سے زیادہ پایا جانے والا کاربوہائڈریٹ ہے اور اسے انگور کی شکر (Grape sugar) یا ڈیکسٹروز (Dextrose) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انگور جیسے پھلوں میں، شہد میں اور پودوں کے رس میں پایا جاتا ہے۔ یہ تمام جانوروں کے لیے توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے اور اس لیے خون اور پیشاب میں بھی موجود ہوتا ہے۔


فروکٹوز ایک اور کاربوہائڈریٹ ہے جو ٹھوس پھلوں کے رس اور شہد میں پایا جاتا ہے۔

گلوکوز اور فروکٹوز دونوں کا مالیکیولر فارمولا ایک ہی ہے۔ $C_6H_{12}O_6$


ان کے اوپن چین سٹرکچر یہاں دکھائے گئے ہیں۔

دلچسپ معلومات

ایسی سفیم (Acesulfame) پوٹاشیم حالت میں منظور ہونے والا محاس کا جزو ہے۔ یہ سافٹ ڈرنکس میں استعمال ہوتا ہے۔



فروکٹوز (کیٹون شوگر)



گلوکوز (ایلڈی ہائڈ شوگر)

سکروز، لیکٹوز اور مالتوز دیگر اہم کاربوہائڈریٹس ہیں۔ ان تمام کاربوہائڈریٹس کا مالیکیولر فارمولا ایک جیسا ہے۔ $C_{12}H_{22}O_{11}$ ۔

سکروز گنے اور چغندر میں پایا جاتا ہے۔ مالتوز ذیل روٹی اور دیگر اناج میں پایا جاتا ہے۔ جبکہ لیکٹوز دودھ میں موجود ہوتا ہے۔

دلچسپ معلومات

لیکٹوز بیکری مصنوعات اور کمرشل دودھ میں استعمال ہوتا ہے۔ جو زیادہ تر بچوں کے استعمال میں آتا ہے۔ سکروز کے برعکس یہ ایک ریڈیو سٹب شوگر ہے۔

نشاستہ اور سیلولوز دو اہم پولیمرک کاربوہائڈریٹس کی مثالیں ہیں۔ ان کا مشترکہ فارمولا $(C_6H_{10}O_5)_n$ ہے۔ نشاستہ آلو، چاول اور

دالوں میں پایا جاتا ہے۔ جبکہ سیلولوز لکڑی، کپاس وغیرہ جیسے پودوں کے مادوں میں پایا جاتا ہے۔





24.3 فوری جانچ

- ۱۔ نشاستہ کے کوئی سے دو ذرائع کے نام لکھیں۔
- ۲۔ کیا تمام کاربوہائڈریٹس ہماری صحت کے لیے یکساں طور پر فائدہ مند ہوتے ہیں؟


دلچسپ معلومات

گلائیوجن ایک کاربوہائڈریٹ ہے۔ جو جانوروں میں توانائی ذخیرہ کرنے کا وہی کام کرتا ہے جو پودوں میں نشاستہ کرتا ہے۔


24.3 پروٹینز (Proteins)

پروٹینز بہت بڑے مالیکیولز ہیں، جن میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن اور سلفر کے ایٹم موجود ہوتے ہیں۔ انسانی جسم میں ہزاروں قسم کے پروٹینز پائے جاتے ہیں جو مختلف افعال سرانجام دیتے ہیں۔ کچھ پروٹینز ریشے دار ہوتے ہیں جو پٹھوں، بالوں، ناخنوں، جلد اور کینکولٹوز میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارمونز اور انزائمز بھی پروٹین ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسولین ایک ہارمون ہے جو خون میں شوگر کی مقدار کو قابو میں رکھتا ہے۔ انزائمز وہ کیمیکل ہیں جو جسم میں ہونے والے بائیو کیمیکل ری ایکشنز کی رفتار کو تیز کرتے ہیں۔ ہیموگلوبن جو خون میں آکسیجن کے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے وہ بھی ایک پروٹین ہے۔

اپنے وسیع افعال کے باوجود تمام پروٹینز امائنو ایسڈز نامی چھوٹے مالیکیولز کے آپس میں جڑنے سے بنتے ہیں۔ ایک امائنو ایسڈ کے دو فنکشنل گروپس ہوتے ہیں۔ ایک کاربوکسل گروپ (COOH) اور ایک امائنو گروپ (NH_2)۔ سب سے سادہ امائنو ایسڈ (amino acid) گلائیسین (glycine) کہلاتا ہے اور اس کا فارمولہ یہ ہے:



اگرچہ انسانی جسم میں موجود پروٹینز کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ لیکن وہ سب صرف تین امائنو ایسڈز کے آپس میں جڑنے سے بنتے ہیں۔ وہ بنیادی ری ایکشن جو پروٹینز کی لمبی چینز کی تشکیل کا سبب بنتا ہے۔ اس میں ایک جیسے یا مختلف امائنو ایسڈز کے دو مالیکیولز کے ری ایکشن سے پانی کا اخراج ہوتا ہے۔




اس ری ایکشن کے نتیجے میں بننے والا مالیکیول ایک پیپٹائڈ کہلاتا ہے اور اس میں ایک پیپٹائڈ لنکج ہوتا ہے۔ یہ پیپٹائڈ مالیکیول اپنے دونوں سروں پر ایک کاربوکسل گروپ اور ایک امائنو گروپ رکھتا ہے۔ یہ مزید امائنو ایسڈز کے ساتھ ری ایکشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے





تاکہ بالآخر ایک ایسی چین بن سکے۔ جو کئی امانو ایڈز مالکیولز پر مشتمل ہوتی ہے جسے پولی پیپٹائڈ کہتے ہیں۔ یہ پولی پیپٹائڈ چین مرکز اور مل کھا کر ایک تھری ڈائمینشنل ساخت اختیار (3-D Structure) کر لیتی ہے۔ جیسا کہ شکل نمبر 24.1 میں دکھایا گیا ہے۔



پروٹینز میں پیچیدہ تبدیلیاں اس وقت رونما ہوتی ہیں۔ جب انہیں حرارت دی جائے، پی ایچ (pH) میں تبدیلی کی جائے یا ان پر آکسیڈائزنگ اور ریڈیوسنگ ایجنٹس حملہ کریں۔ اس عمل کو پروٹین کی ڈی نیچریشن (denaturation) کہا جاتا ہے۔ ایک عام مثال انڈے کو تھپکا یا اُبلانا ہے جس میں انڈے کی سفیدی والے پروٹین ایلمینٹ کی ڈی نیچریشن وقوع پذیر ہوتی ہے۔

دلچسپ معلومات

فوری جانچ 24.4

- ۱۔ ہارمونکس چیز سے بنتے ہیں؟
- ۲۔ پروٹین کی ڈی نیچریشن سے کیا مراد ہے؟

ہر وہ شخص چاہے بچہ ہو یا بالغ پروٹین کی ضرورت رکھتا ہے۔ بچوں کو بڑھنے کے لیے زیادہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ بڑوں کو روزمرہ کی جسمانی کمپائی سرگرمیوں میں ضائع ہونے والی پروٹین کو پورا کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔

24.4 لیپڈز (Lipids)


زیادہ تر لیپڈز سادہ مرکبات فٹی ایسڈز سے مل کر بنتے ہیں جو ان کے بنیادی اجزاء ہیں۔ فٹی ایسڈز کاربن ایسٹرو کی ایسی چین والے کاربوکسیک ایسڈ ہیں۔ جن میں عام طور پر 12 سے 28 کاربن ہوتے ہیں۔ چند عام فٹی ایسڈز اور ان کے ذرائع ٹیبل 24.1 میں دیے گئے ہیں۔

ٹیبل 24.1: کچھ سادہ فٹی ایسڈ

فٹی ایسڈز	ماخذ	فارمولہ
لورک ایسڈ (Lauric acid)	ناریل کا تیل	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{COOH}$
سٹیرک ایسڈ (Stearic acid)	حیوانی چربی	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COOH}$
پالمٹک ایسڈ (Palmitic acid)	پام آئل	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOH}$
اولیک ایسڈ (Oleic acid)	زیتون کا تیل	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$

فٹی ایسڈز گلیسرول نامی الکوحل کے ساتھ مل کر ٹرائی ایسٹر بناتا ہے، جو ایک چربی ہے۔ مثال کے طور پر اسٹیرک ایسڈ (stearic acid) گلیسرول کے ساتھ مل کر ٹرائی اسٹیرن بناتا ہے جو ایک چربی ہے۔ گلیسرول کے ٹرائی ایسٹر کو ٹرائی گلیسر ایسڈ بھی کہا جاتا ہے۔





جانوروں کی چربی زیادہ تر ایڈپوزٹو یعنی چربی والے خلیات میں پائی جاتی ہے۔ جبکہ سبزیوں کے تیل عام طور پر پودوں کے بیجوں اور جڑوں میں موجود ہوتے ہیں۔ لپڈز جانداروں میں توانائی کے بھرپور ذریعہ کے طور پر کام کرتے ہیں۔

24.5 خوری جانچ

۲۔ آن سپرورنڈینٹی ایسڈ کیا ہوتے ہیں؟

۱۔ لپڈز کا ہمارے جسم میں کیا کردار ہے؟

دلچسپ معلومات

صافین کم از کم 600 قبل مسیح سے استعمال ہو رہے ہیں جو کھڑی کی راکھ کے عرق اور کھڑی کی چربی کو اُبال کر تیار کیا جاتا تھا۔ صافین کی صفائی کی خصوصیات اٹھارویں صدی تک عام نہیں ہوئیں۔ کیمیائی طور پر صافین لمبی زنجیری والے فیٹی ایسڈز (Fatty acids) کے سوڈیم سائلز کے مرکب ہوتے ہیں۔ جو جانوروں کی چربی کی ہائڈرولیسز سے بنتے ہیں۔ یہ ہائڈرولیسز الگلی کی موجودگی میں کیا جاتا ہے۔

24.5 وٹامنز (Vitamins)

یہ نامیاتی مرکبات ہیں جو توانائی فراہم کرنے یا جسم کی تعمیر (جیسے کاربوہائڈریٹس، لپڈز اور پروٹین) کا براہ راست کام نہیں کرتے۔ تاہم یہ جسم کی صحت برقرار رکھنے اور گتھ کے لیے ضروری ہیں۔ یہ کمپاؤنڈز جسم میں ہونے والے حیاتیاتی کیمیائی عمل میں بطور کینالٹ کردار ادا کرتے ہیں۔ چونکہ پہلا دریافت ہونے والا کمپاؤنڈ ایک امائن (amine) تھا۔ اس لیے انہیں وائٹل امائنز یا وٹامنز کہا گیا۔ وقت کے ساتھ سائنس دان انسانوں کے لیے ضروری 13 وٹامنز کی شناخت کر چکے ہیں۔

وٹامنز کی اہمیت (Importance of Vitamins)

وٹامن اے: دودھ، انڈے، مچھلی اور جگر میں پایا جاتا ہے اور اس کی کمی سے رات کا اندھا پن اور جلد خشک ہو جاتی ہے۔
وٹامن ڈی: مکھن اور مچھلی کے تیل سے حاصل ہوتا ہے۔ ہماری جلد سورج کی روشنی میں خود بھی وٹامن ڈی بنا سکتی ہے۔ یہ وٹامن، دانتوں اور ہڈیوں کی نشوونما کے لیے ضروری ہے اور اس کی کمی سے ریکٹس (rickets) یعنی ہڈیوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔
وٹامن سی: جسے اسکوربک ایسڈ کہا جاتا ہے، ترش پھلوں، سبز مرچ اور ٹماٹروں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی کمی سے جسم میں سکروی (scurvy) کا مرض پیدا ہوتا ہے۔





وٹامن B₁ اور B₂ قدرتی طور پر عام پائے جاتے ہیں۔ یہ سرخ گوشت، تھن، خشک میوہ جات اور سبزیوں میں پائے جاتے ہیں۔
وٹامن B₁ کی کمی سے تھکن اور ڈپریشن ہوتا ہے جب کہ وٹامن B₂ کی کمی ہونٹوں کی سوزش، جلن اور آنکھوں کی خشکی کا باعث بنتی ہے۔

24.6 خوری جانچ

۱۔ لیموں میں کونسا وٹامن ہوتا ہے؟
۲۔ ہمارے جسم میں وٹامنز اور کاربوہائیڈریٹس کے کردار کا موازنہ کریں۔

24.6 نیوکلیک ایسڈ (Nucleic acid)

کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، لیپڈز اور پانی کے ساتھ مل کر جانداروں کے 99 فیصد حصے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ باقی ایک فیصد 1% میں وہ اہم کمپاؤنڈز جن میں دو نیوکلیک ایسڈز (DNA) ڈی آکسی رائبونیوکلیک ایسڈ اور (RNA) رائبونیوکلیک ایسڈ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ کمپاؤنڈز زندگی کی نشوونما، بقا اور تمام جانداروں کی تولید کے ذمہ دار ہیں۔

ڈی این اے (DNA) اور آراین اے (RNA) دونوں کیمیائی طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مگر یہ جسم میں مختلف کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈی این اے (DNA) کے مالیکیوز RNA کے مالیکیوز سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ڈی این اے (DNA) کا مالیکیوز لرماس 660 Da تک ہو سکتا ہے۔ اگر ان کو پھیلا یا جائے تو ان کی لمبائی 12 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ یہ زیادہ تر سیل کے نیوکلیس میں پائے جاتے ہیں۔ آراین اے (RNA) کے مالیکیوز زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کا مالیکیوز لرماس تقریباً 340 Da تک ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر نیوکلیس کے باہر پائے جاتے ہیں۔

ڈی این اے کا کام معلومات ذخیرہ کرنا اور مناسب وقت پر آراین اے تک پہنچانا ہے۔ آراین اے کا کام ان معلومات کو پڑھنا، سمجھنا اور ان کی مدد سے پروٹین بنانا ہے۔

24.7 خوری جانچ

۱۔ آراین اے کا کیا کام ہے؟
۲۔ ڈی این اے اور آراین اے میں بنیادی فرق کیا ہے؟

دلچسپ معلومات

پولمرز کا مالیکیوز لرماس اکثر لیٹین یا لیٹن ڈائن پونس میں لکھا جاتا ہے۔

مشق

A کثیر الانتخابی سوالات:

صحیح جواب پر (✓) کریں۔

(i) فروکٹوز میں کون سا قشطل گروپ موجود ہے:

- (الف) ہائیڈروکسل اور ایلڈی ہائیڈ
(ب) ہائیڈروکسل اور کیٹون
(ج) ہائیڈروکسل اور ایٹر
(د) ہائیڈروکسل اور ااماٹڈ

(ii) چربی میں کون سا قشطل گروپ موجود ہوتا ہے؟

- (الف) کاربوکسلک گروپ (ب) ایٹر گروپ
(ج) کاربوائل گروپ (د) ہائیڈروکسل گروپ





(iii) پروٹین ہمارے جسم میں کون سا کام سرانجام نہیں دیتے؟

(الف) یہ کیمیائی پیغام رسانی کے طور پر کام کرتے ہیں۔

(ب) یہ توانائی سے بھرپور ایندھن کے ذخیرے کے طور پر کام کرتے ہیں۔

(ج) یہ جینیاتی معلومات محفوظ کرتے ہیں۔

(د) یہ بائیو کیمیکل ری ایکشنز میں بطور کینکٹو کام کرتے ہیں۔

(iv) کون سے فنکشنل گروپس ری ایکشن کر کے پروٹین کے اندر پیپٹائیڈ لیج بناتے ہیں؟

(الف) کاربوکسلیک گروپ اور ہائیڈروکسل گروپ (ب) کاربوکسلیک گروپ اور امائنو گروپ

(ج) ہائیڈروکسل گروپ اور امائنو گروپ (د) امائنو گروپ اور امائنو گروپ

(v) کس کی کمی سے تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے؟

(الف) وٹامن اے (ب) وٹامن سی (ج) وٹامن ڈی (د) وٹامن بی ۱۲

B مختصر جوابی سوالات:

24.1 گلوکوز اور فروکٹوز کے درمیان کیا فرق ہے؟

24.2 پروٹین کی ڈی نیچریشن کے لیے کوئی سی دو مثالیں بیان کریں۔

24.3 وٹامن ڈی کے ذرائع بیان کریں۔

24.4 ہمارے جسم میں انزائمز کیا کردار ادا کرتے ہیں؟

24.5 تیل اور چربی سے کون سی صنعتی مصنوعات حاصل ہوتی ہیں؟

24.6 خون جمانے میں کون سا وٹامن مددگار ثابت ہوتا ہے؟

C تعمیری فکر پر مبنی سوالات:

24.1 ڈی۔ این۔ اے (DNA) کا کیا کردار ہے؟

24.2 ہمارے جسم میں پروٹینز کے ذریعے ادا کیے جانے والے تین اہم کام لکھیں۔

24.3 فیٹی ایسڈز، لپڈز کے لیے تعمیری بلاکس کا کام بالکل ایسے کرتے ہیں، جیسے امائنو ایسڈز، پروٹینز کے لیے۔ اس حقیقت پر تبصرہ کریں۔

24.4 وٹامن ڈی کے ذرائع بیان کریں۔ اس کی کمی سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟

24.5 دو پولیمرک کاربائیڈریٹس کے نام تحریر کریں۔





تفصیلی سوالات:

D

- 24.1 فروکٹوز، مالٹوز اور لیکٹوز کو حاصل کرنے کے ذرائع بیان کریں۔
- 24.2 گلوکوز اور فروکٹوز کی اوپن چین ساخت تشکیل دیں۔
- 24.3 ہینٹا میڈکس بنا لیں۔ پولی ہینٹا میڈکس کی ساخت تفصیلاً بیان کریں۔
- 24.4 ڈی۔ این۔ اے اور آر۔ این۔ اے کسے کہتے ہیں؟
- 24.5 ہمارے جسم میں کاربوہائڈریٹس، پروٹینز اور لپڈز کی طرف سے ادا کیے گئے کردار کا موازنہ کریں۔

WebVersion of PECTAA Textbook
Not for Sale



اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ:

- تعریف کریں کہ پولیمرز بہت بڑے مالکیولز ہیں جو بہت سے چھوٹے مالکیولز بڑے سے بنتے ہیں جن کو مونومرز کہتے ہیں۔
- ایڈیشن اور کنڈینسیشن پولیمرز میں ڈیمرائی جانے والی اکائیوں اور پائے جانے والے بانڈز کی شناخت کریں۔
- ایڈیشن اور کنڈینسیشن پولیمرائزیشن میں فرق واضح کریں۔
- وضاحت کریں کہ پلاسٹکس، پولیمرز سے بنے ہوتے ہیں۔
- بیان کریں کہ پلاسٹکس کے خواص کس طرح ان کو ضائع کرنے کے راستے میں حائل ہوتے ہیں۔
- پلاسٹکس سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی چیلنجز کی وضاحت کریں۔ جن میں درج ذیل باتیں شامل ہوں:
- (الف) ملبریا کوڑے کو تلف کرنے کی جگہ۔
- (ب) سمندروں میں فضلے کا جمع ہونا۔
- (ج) جلنے سے ذہریلی گیسوں کا پیدا ہونا۔
- درج ذیل کی ساخت کی وضاحت کریں۔
- (الف) نائیلون جو ایک پولیمرائز ہے۔
- (ب) پی ای ٹی (PET) ایک پولی ایسٹر ہے۔ پی ای ٹی کا پورا نام، پولی ایتھیلین تیرا فٹھیلٹ، کی ضرورت نہیں۔
- اس بات کی وضاحت کہ پی ای ٹی کو مونومرز میں واپس تبدیل کیا جاسکتا ہے اور پھر دوبارہ پولیمرائز بھی کیا جاسکتا ہے۔

پولیمرز یا میکرو مالکیولز (Polymers or macromolecules) انتہائی بڑے مالکیولز ہوتے ہیں جو سادہ مالکیولز کی ایک بڑی تعداد کو جوڑ کر بنائے جاتے ہیں۔ سادہ مالکیولز کو مونومرز کہا جاتا ہے۔ ایک مونومر سے پولیمر بننے کے عمل کو پولیمرائزیشن کہتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور نیوکلیک ایسڈ قدرتی طور پر پائے جانے والے پولیمرز کی روزمرہ کی مثالیں ہیں۔ جبکہ پلاسٹک، مصنوعی فائبرز اور قدرتی ربڑ، انسان ساختہ پولیمرز کی مثالیں ہیں۔ دنیا بھر میں جو سب سے اہم تبدیلی ہوئی ہے۔ ان میں سے دھاتوں، لکڑی اور کپاس کی جگہ آہستہ آہستہ انسان ساختہ مصنوعی پولیمرز کا استعمال ہے۔ پولیمرز ہماری روزمرہ کی زندگی میں اپنی پائیداری، پک، گرمی اور کیمیکلز کے خلاف مزاحمت کی وجہ سے اہم ہیں۔ یہ خصوصیات انہیں وسیع پیمانے پر استعمال کے لیے مفید بناتی ہے۔

25.1 پولیمرز کی اقسام (Types of Polymers)

پولیمرز کی دو اہم اقسام ہیں:


الف۔ ایڈیشن پولیمرز (Addition Polymers) ب۔ کنڈینسیشن پولیمرز (Condensation Polymers)



الف۔ ایڈیشن پولیمرز (Addition Polymers)

ایڈیشن پولیمرز اس وقت بنتے ہیں جب ڈبل بانڈز پر مشتمل مونومر مالیکیولز ایک بہت بڑا مالیکیول بنانے کے لیے کوویلنٹ بانڈ کے ذریعے آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اتھین (Ethene) کے مالیکیولز کی ایک بڑی تعداد ایک بہت بڑا مالیکیول بنانے کے لیے آپس میں مل کر ایک پولی اتھین یا پولی اتھالین بناتی ہے۔ اس عمل کے دوران اتھین میں موجود $C = C$ ڈبل بانڈ ٹوٹ کر اتھین کے مالیکیولز کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ پولیمرائزیشن ری ایکشنز عام طور پر زیادہ دباؤ اور کسی کیتالسٹ کی موجودگی میں ہوتے ہیں۔

ایڈیشن پولیمرائزیشن میں کوئی بھی دوسرا چھوٹا مالیکیول اور باقی پروڈکٹ نہیں بنتا۔




25.1 ثوری جانچ

- ایک ایسے تجارتی پروڈکٹ کی مثال دیں جو پولی اتھین کے استعمال سے بنتا ہے۔
- معمولی پولیمرز کی تین خصوصیات لکھیں۔


ب۔ کنڈینسیشن پولیمرز (Condensation Polymers)

ایک کنڈینسیشن پولیمر تبا بنتا ہے جب دو مالیکیولز جن میں دو مختلف فنکشنل گروپس موجود ہوں۔ آپس میں ری ایکشن کر کے چھوٹے مالیکیول جیسا کہ پانی، امونیا اور ہائڈروجن کلورائیڈ خارج کرتے ہیں۔ یہ ری ایکشن تیزاب یا اساس کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اتھین ڈائیول ایک کاربوکسلک ایسڈ یعنی ٹیرتھلیک ایسڈ کے ساتھ ری ایکشن کر کے ایک پولیمر بناتا ہے جسے پولی اتھیلین ٹیرتھلیٹ (PET) (Polyethylene Terephthalate) کہا جاتا ہے۔ ڈائی کاربوکسلک ایسڈ میں موجود کاربوکسل گروپ ڈائیول (diol) کے ہائڈروکسل گروپ کے ساتھ ری ایکشن کر کے ایک ایسڈ لیٹج بناتا ہے۔



اس پروڈکٹ کو ریپیٹ یونٹ کہا جاتا ہے۔ چونکہ ریپیٹ یونٹ کے دونوں سروں پر فنکشنل گروپ موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے پولیمرائزیشن کا عمل دونوں سروں پر جاری رہتا ہے اور ایک بڑا مالیکیول بنتا ہے، جسے درج ذیل سٹرکچر سے ظاہر کیا گیا ہے۔





PET کو کیمیائی طور پر توڑ کر اس کو ری سائیکل کیا جاسکتا ہے۔ کیمیائی ری سائیکلنگ پولیمر کو آکسیجن کی عدم موجودگی میں گرم کر کے کی

جاتی ہے۔



دلچسپ معلومات

پولیمرز کی خصوصیات کو ان کی کیمیائی ساخت اور ترکیب کے حفاظت کنٹرول کے ذریعے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ جس سے وہ مخصوص استعمال کے لیے موزوں ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ نان سٹک کوٹنگ مٹھلون میں ان کا استعمال۔

(Differences between Addition and Condensation Polymerizations)

ایڈیشن اور کنڈینسیشن پولیمرائزیشن کے درمیان فرق

کنڈینسیشن پولیمرائزیشن	ایڈیشن پولیمرائزیشن
اس میں ایک ہی مونومر استعمال ہوتا ہے جس میں ڈبل یا ٹریپل بانڈ کے پولیمرائزیشن دو مختلف مونومرز کے درمیان ہوتی ہے۔ مونومرز کے مابین لڑ میں ہر سرے پر دو فنکشنل گروپس موجود ہوتے ہیں۔	اس میں ایک ہی مونومر استعمال ہوتا ہے جس میں ڈبل یا ٹریپل بانڈ کے پولیمرائزیشن دو مختلف مونومرز کے درمیان ہوتی ہے۔ مونومرز کے مابین لڑ میں ہر سرے پر دو فنکشنل گروپس موجود ہوتے ہیں۔
اس میں ایک ایڈیشن ری ایکشن ہوتا ہے اور صرف ایک ہی کنڈینسیشن ری ایکشن کے دوران ایک چھوٹا مالیکیول مثلاً پانی یا پروڈکٹ بنتا ہے۔	اس میں ایک ایڈیشن ری ایکشن ہوتا ہے اور صرف ایک ہی کنڈینسیشن ری ایکشن کے دوران ایک چھوٹا مالیکیول مثلاً پانی یا پروڈکٹ بنتا ہے۔
بننے والے پولیمر کا مالیکیولر ماس استعمال ہونے والے تمام مونومرز کے مالیکیولر ماس کو جمع کر کے معلوم نہیں کیا جاسکتا۔	بننے والے پولیمر کا مالیکیولر ماس استعمال ہونے والے تمام مونومرز کے مالیکیولر ماس کو جمع کر کے معلوم کیا جاسکتا ہے۔
اس میں بننے والا پولیمر مخصوص قسم کی لنک رکھتا ہے۔ مثلاً ایسٹر لنک یا امائیڈ لنک۔	اس پولیمر میں صرف سنگل بانڈز ہوتے ہیں۔
ایڈیشن پولیمرز کی مثالیں: پولی ایسٹر، پیکالاٹ وغیرہ۔	ایڈیشن پولیمرز کی مثالیں: پولی اسٹائرن، پولی وینائل کلورائیڈ (PVC) وغیرہ۔

25.2 پولیمر سے مونومر کی ساخت (Structure of Monomers from Polymers)

ایڈیشن پولیمر (Addition Polymer)

1۔ ایڈیشن پولیمر کی ساخت لکھیں۔ $\left[\text{CH}_2 - \text{CH}_2 \right]_n$





۲۔ پولیمر میں ریپیٹ یونٹ کی نشاندہی کریں۔


بریکٹس اور دونوں اطراف کے بڑھائے گئے بانڈز اور سیسکریپٹ کو ہٹا دیں۔ سنگل بانڈ کو ڈبل بانڈ میں تبدیل کریں۔



کنڈینسیشن پولیمر (Condensation Polymer)



مثال 25.1:

۱۔ کنڈینسیشن پولیمر پولیستر کی ساخت لکھیں۔



۲۔ پولیمر میں ریپیٹنگ یونٹس کی نشان دہی کریں۔ بریکٹس، دونوں اطراف کے بڑھائے گئے بانڈز اور n کو ہٹا دیں۔ ایسٹر لکچ میں

CO اور O کے درمیان سے بانڈ توڑ دیں۔ ڈائی کاربوکسلک ایسڈ کے دونوں سروں پر OH لگائیں۔ ڈائی اول کے دونوں سروں پر H لگائیں۔






مثال 25.2:

۱۔ کنڈینسیشن پولیمر، پولی امانڈ کی سٹرکچر (Structure) لکھیں۔



۲۔ پولیمر میں ریپیٹنگ یونٹس کی نشاندہی کریں۔ بریکٹس میں بڑھائے گئے بانڈز اور n کو ہٹا دیں۔ امانڈ لکچ میں CO اور NH کے

درمیان سے بانڈ توڑ دیں۔ ڈائی کاربوکسلک ایسڈ کے دونوں سروں پر OH لگائیں۔ ڈائی امائن مونومر کے دونوں سروں پر H لگائیں۔



فوری جانچ 25.2

۲۔ ایک پولی امانڈ لکچ کی ساخت لکھیں۔

۱۔ آپ ڈرم ریپیٹنگ یونٹ سے کیا مراد لیتے ہیں؟

دلچسپ معلومات

مونومرز کی قسم اور تناسب کو تبدیل کر کے کیا دان ایسے پولیمرز بنا سکتے ہیں جو مصنوعی خصوصیات جیسے پک، طاقت اور حرارتی استحکام رکھتے ہوں تاکہ وہ مخصوص اطلاقی ضروریات پر پورا اتر سکیں۔





25.3 پلاسٹکس (Plastics)

ایٹھائیلین (ethylene)، پروپائیلین (propylene) اور سٹائرین (styrene) جیسے مونومرز کی پولیمرائزیشن سے بالترتیب پولی ایتھیلین، پولی پروپیلین اور پولی اسٹائرین حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تمام پولیمرز مرکبات کی مثالیں ہیں، جنہیں پلاسٹک کہا جاتا ہے۔ یہ پلاسٹک ہر قسم کے کیری ہوم فوڈ کنٹینرز مثلاً کھانے کے کنٹینرز، سافٹ ڈرنک کی بوتلیں، پانی کی بوتلیں، جوس کی بوتلیں وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ شاپنگ بیگ، کچن کا سامان، بالٹیوں، میزوں، کرسیوں، کھانے کے ریپر، کپ اور پلیٹس وغیرہ بنانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔

پلاسٹک ہلکے وزن کے، لچکدار اور پائیدار ہوتے ہیں۔ انہیں آسانی سے کسی بھی مطلوبہ شکل کے ٹھوس اشیاء میں ڈھالا جاسکتا ہے۔ ان تمام خصوصیات کی وجہ سے ہماری روزمرہ کی زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں ان کا وسیع استعمال ہوا ہے۔ بیسویں صدی کے اوائل سے ہر سال لاکھوں ٹن پلاسٹک تیار کیا جاتا ہے۔



فصل 25.1 پلاسٹک کی مصنوعات

25.4 پلاسٹک کے بُرے اثرات (Adverse Effects of Plastics)

دوسرے مواد کے برعکس، پلاسٹک حیاتی طور پر گھٹتے سڑتے نہیں ہیں۔ جب پلاسٹک سے بنی اشیاء کو ضائع کر دیا جاتا ہے تو انہیں ختم ہونے میں 1000 سال (ہزار سال) تک لگ سکتے ہیں۔ اس حقیقت سے ماحول میں پلاسٹک کی بھاری مقدار کے جمع ہونے کو جنم دیا ہے جس سے وسیع پیمانے پر ماحولیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

پلاسٹک کی آلودگی زمین، ہوا اور پانی کے تمام ذخیروں، دریاؤں، تالابوں، جھیلوں اور سمندروں میں تقریباً ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ یہ آلودگی ایک انتہائی تشویشناک سطح تک پہنچ چکی ہے اور صحت کے سنگین مسائل کا سبب بن چکی ہے۔

ضائع شدہ پلاسٹک کی اقسام جنہیں ہم کوڑے دان میں ڈالتے ہیں۔ انہیں جلانے، زمین میں دفن کرنے یا نالیوں میں پھینکنے کے ذریعے ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ جہاں سے وہ اپنا راستہ دریاؤں اور سمندروں تک بنا لیتے ہیں۔ جس سے ایک خطرناک ماحولیاتی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔



فصل 25.2: پلاسٹک کی آلودگی





پولیمرز کو مختلف تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے 3D پرنٹ کہا جاسکتا ہے۔ ان تکنیکوں میں تھری ڈائمنشنل (3D) اشیاء بنانے کے لیے پولیمر مواد کو تہہ در تہہ (layer-by-layer) جمانا شامل ہے۔





مشق

A کثیر الانتخابی سوالات:






صحیح جواب پر (✓) کریں۔

(i) درج ذیل میں سے کون سا پولیمر، مصنوعی پولیمر ہے؟

- (الف) نشاستہ/سٹارچ (ب) سیلولوز
(ج) جانوروں کی چربی (د) پولی ایسٹر
(ii) ایسٹرکےج کی نشاندہی کریں:



(iii) درج ذیل پولیمر کے مونومر کا سٹرکچر کون سا ہے؟



(iv) درج ذیل پولیمرز میں سے کس کو ری سائیکل کیا جاسکتا ہے؟

- (الف) پی۔ای۔ٹی (ب) پولی سٹائیرین (ج) پی۔وی۔سی (د) ایپوکسی

(v) درج ذیل میں سے کون سا پولیمر بائیوڈی گریڈ ایسٹیل ہے؟

- (الف) پولی امائڈ (ب) پولی ایسٹر (ج) سٹارچ (د) پی۔ای۔ٹی (PET)

(vi) درج ذیل میں سے کون سا پولیمر، کنڈنسیشن پولیمرائزیشن سے حاصل ہوتا ہے؟

- (الف) پولی وینائیل کلورائیڈ (ب) پولی سٹائیرین

- (ج) پولی امائڈ (د) پولی ایتھین





B مختصر جوابی سوالات:

- 25.1 ایڈیشن پولیمرز اور کنڈنسیشن پولیمرز کی دو دو مثالیں لکھیں۔
- 25.2 پولیمرز ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند ہیں؟
- 25.3 کیا قدرتی پولیمرز ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں؟ وضاحت سے وجہ لکھیں۔
- 25.4 درج ذیل پولیمرز کے سٹرکچر لکھیں۔
- (الف) پولی پروپائی لین (Polypropylene) (ب) پولی سٹائیرین (Polystyrene)

C تعمیری فکر پر مبنی سوالات:

- 25.1 پلاسٹک سے بنی فالتو اشیاء کو جلانا کیوں نقصان دہ ہے؟
- 25.2 کیوں ضائع شدہ مصنوعی (پلاسٹک کی) اشیاء کو سمندر میں تلف کرنا مناسب نہیں ہے؟
- 25.3 ایڈیشن پولیمرائزیشن میں کینالکٹ کے کردار کی وضاحت کریں۔
- 25.4 درج ذیل ایڈیشن پولیمرز سے مونومرز اخذ کریں۔



D تفصیلی سوالات:

- 25.1 پی۔ای۔ٹی (PET) کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ کیا آپ اس پولیمر کو ری سائیکل کر سکتے ہیں؟
- 25.2 ایڈیشن اور کنڈنسیشن پولیمرائزیشن کے درمیان فرق واضح کریں۔
- 25.3 مصنوعی پولیمر کے ماحول پر اثرات بیان کریں۔

